






```
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                  CGC THESIS RESULTS SUMMARY                      ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝

ANALYSIS A: CMB + BAO + Growth + H0 (Primary Estimation)
──────────────────────────────────────────────────────────
  μ = 0.4113 ± 0.0440
  Detection: 9.4σ
  H0 tension resolution: 49.5%
  Lyα enhancement: 135.8% (EXCEEDS 7.5% systematic)

ANALYSIS B: CMB + BAO + Growth + H0 + Lyman-α (Joint Fit)
──────────────────────────────────────────────────────────
  μ = 0.0449 ± 0.0186
  Detection: 2.4σ
  H0 tension resolution: 5.4%
  Lyα enhancement: 6.5% (WITHIN 7.5% systematic) ✓

KEY INSIGHT:
────────────
  Lyman-α data CONSTRAINS μ by factor of 9.1x
  This reduces H0 tension resolution from 49% to 5%
  BUT ensures CGC predictions are consistent with Lyα observations

THESIS PRESENTATION:
────────────────────
  • Present BOTH analyses transparently
  • Discuss Lyα as FALSIFIABILITY test (strength!)
  • CGC passes this test with constrained parameters
```