

توزیع‌های نمونه‌ای

- آمار و احتمالات مهندسی -

مدرس: مشکانی فراهانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۳ مرداد ۱۴۰۱

جامعه‌ی آماری

در هر مطالعه‌ی آماری با مجموعه‌ای از افراد یا اشیاء که در یک یا چند صفت با یکدیگر مشترک هستند، سروکار داریم و هدف از مطالعه کسب اطلاعات درباره‌ی آن‌ها است. این مجموعه را **جامعه‌ی آماری** یا به اختصار جامعه می‌گویند.

نمونه: نمونه زیر مجموعه‌ای از جامعه است.

هدف ما از انتخاب نمونه‌ی تصادفی دستیابی به اطلاعاتی درباره‌ی پارامترهای مجهول جامعه‌ی آماری است.

برای مثال، فرض کنید بخواهیم از میان افرادی که در آمریکا قهوه مصرف می‌کنند، نسبت کسانی که نوع خاصی از قهوه را ترجیح می‌دهند، به دست آوریم. غیرممکن است که هر آمریکایی که قهوه می‌نوشد را برای محاسبه‌ی پارامتر p مورد پرسش قرار دهیم. به جای آن نمونه‌ی تصادفی بزرگی انتخاب کرده و \hat{p} نسبت مصرف‌کنندگان قهوه‌ی مورد نظر در این نمونه محاسبه می‌شود. حال برای استنباط درباره‌ی p از مقدار \hat{p} استفاده می‌کنیم.

چند تعریف

متغیر تصادفی X نمایان گر یک جامعه است؛ به طوری که این متغیر تصادفی دارای توزیع احتمال $f_X(x)$ است.

نمونه تصادفی: یک نمونه تصادفی به اندازه n از این جامعه عبارتست از جمع آوری n متغیر تصادفی مستقل X_n, \dots, X_2, X_1 که هر کدام دارای توزیع احتمال $f_X(x)$ هستند. این تابع به پارامتر مجهول θ بستگی دارد.

آماره: هر ویژگی یک جامعه را پارامتر و ویژگی متناظر آن در نمونه را آماره گویند. یک آماره تابعی از نمونه تصادفی است که به پارامتر مجهول بستگی ندارد.

نکته: مقدار آماره از یک نمونه به نمونه دیگر تغییر می کند، اما مقدار پارامتر جامعه همواره ثابت است.

توزیع نمونه ای: آماره تابعی از نمونه تصادفی بوده و خود نیز یک متغیر تصادفی است. توزیع احتمال آماره را توزیع نمونه ای گویند.

نمادها

○ μ : میانگین جامعه

● \bar{X} : میانگین نمونه

○ σ^2 : واریانس جامعه

● S^2 : واریانس نمونه

○ σ : انحراف معیار جامعه

● S : انحراف معیار نمونه

● ○ n : حجم نمونه

توزیع نمونه‌ای میانگین نمونه

توزیع نمونه‌ای میانگین نمونه \bar{X}

فرض کنید از جامعه‌ای با میانگین μ و واریانس σ^2 نمونه تصادفی X_1, X_2, \dots, X_n به اندازه n انتخاب کرده باشیم. به علت مستقل و هم‌توزیع بودن X_1, X_2, \dots, X_n داریم:

$$E(X_1) = E(X_2) = \dots = E(X_n) = \mu$$

$$Var(X_1) = Var(X_2) = \dots = Var(X_n) = \sigma^2$$

می‌خواهیم توزیع نمونه‌ای $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$ میانگین نمونه را به دست آوریم:

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n} E(X_1 + \dots + X_n) = \frac{1}{n} \times n\mu = \mu$$

$$\begin{aligned} Var(\bar{X}) &= Var\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} Var(X_1 + \dots + X_n) \\ &= \frac{1}{n^2} \times n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

یادآوری یک قضیه

اگر X_1, X_2, \dots, X_n متغیرهای تصادفی مستقل باشند و $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ برای $i = 1, \dots, n$ قرار دهیم

$$Y = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_n X_n = \sum_{i=1}^n a_i X_i$$

در این صورت

$$Y = \sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N \left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2 \right)$$

توزیع نمونه‌ای میانگین نمونه \bar{X}

حال می‌خواهیم بررسی کنیم که متغیر تصادفی \bar{X} از چه تابع چگالی تبعیت می‌کند. دو حالت را در نظر می‌گیریم (۱- جامعه با توزیع نرمال و ۲- جامعه با توزیع غیر نرمال):

۱- اگر جامعه دارای توزیع نرمال با میانگین μ و واریانس σ^2 باشد:
چون \bar{X} ترکیب خطی از متغیرهای تصادفی نرمال مستقل است، طبق قضیه صفحه قبل داریم:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

نکته: با افزایش حجم نمونه واریانس \bar{X} کاهش می‌یابد.

قضیه حد مرکزی

فرض کنید X_1, X_2, \dots دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی هم‌توزیع با میانگین μ و واریانس σ^2 متناهی باشند به قسمی که هر تعداد متناهی از این متغیرهای تصادفی از یکدیگر مستقل باشند. در این صورت توزیع حدی $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ موقعی که $n \rightarrow \infty$ توزیع نرمال استاندارد است.

تقریب نرمال برای توزیع نمونه‌ای \bar{X} معمولاً وقتی که $n \geq 30$ باشد، یک تقریب مناسب است.

توزیع نمونه‌ای میانگین نمونه \bar{X}

۲- اگر جامعه دارای توزیع نرمال نباشد:

اگر چه توزیع \bar{X} به توزیع جامعه نمونه‌گیری شده وابسته است، ولی طبق قضیه‌ی حد مرکزی با افزایش n توزیع نمونه‌ای \bar{X} به توزیع نرمال نزدیک می‌شود.

بنابراین طبق قضیه حد مرکزی وقتی اندازه نمونه n افزایش یابد، توزیع میانگین نمونه \bar{X} یک نمونه تصادفی که از هر جامعه‌ای گرفته شده باشد، توزیع نرمال با میانگین μ و واریانس $\frac{\sigma^2}{n}$ است.

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \implies Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

مثال ۱

یک شرکت تولیدی لاستیک اتومبیل، لاستیک‌هایی تولید می‌کند که طول عمر این لاستیک‌ها دارای توزیع نرمال با میانگین ۲۴ ماه و انحراف معیار ۲ ماه است. احتمال اینکه در یک نمونه‌ی ۲۵ تایی از لاستیک‌ها، میانگین طول عمر کمتر از ۲۵ ماه باشد، چه قدر است؟

راه حل:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu = 24, \frac{\sigma^2}{n} = \frac{2^2}{25}\right)$$

$$P(\bar{X} < 25) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{25 - 24}{\frac{2}{5}}\right) = P(Z < 2/5) = 0.9938$$

مثال ۲

یک آسانسور طوری طراحی شده که حد ظرفیت بار آن ۵۰۰۰ کیلوگرم باشد. ادعا می‌شود که این آسانسور گنجایش ۵۰ نفر را دارد. اگر وزن تمام کسانی که از این آسانسور استفاده می‌کنند دارای میانگین ۹۵ کیلوگرم و انحراف معیار ۱۲ کیلوگرم باشد، احتمال اینکه وزن یک گروه تصادفی ۵۰ نفری از حد ظرفیت آسانسور تجاوز کند چه قدر است؟

راه حل: چون حجم نمونه بیشتر از ۳۰ است، پس طبق قضیه‌ی حد مرکزی داریم:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu = 95, \frac{\sigma^2}{n} = \frac{12^2}{50}\right)$$

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{50} X_i > 5000\right) &= P(\bar{X} > 100) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > \frac{100 - 95}{\frac{12}{\sqrt{50}}}\right) \\ &= P(Z > 2/95) = 1 - P(Z \leq 2/95) = 1 - 0/9984 = 0/0016 \end{aligned}$$

مثال ۳

عرض یک شکاف که بر یک قطعه از آلیاژ آلومینیوم که با ریخته‌گری تولید می‌شود، توزیع نرمال با میانگین $۰/۹$ و انحراف معیار $۰/۰۲$ است. حدود مشخصات طراحی عبارتند از $۰/۹ \pm a$ اینچ. هر ساعت نمونه‌هایی ۵ تایی از آلیاژ ریخته‌گری گرفته شده و میانگین آن محاسبه می‌شود. حدود را طوری تعیین کنید که درصد میانگین‌های نمونه که خارج از حدود قرار می‌گیرند، معادل $۰/۲۷$ درصد باشد.

راه‌حل:

$$\bar{X} \sim N \left(\mu = ۰/۹, \frac{\sigma^2}{n} = \frac{(۰/۰۲)^2}{۵} \right)$$

$$P(۰/۹ - a \leq \bar{X} \leq ۰/۹ + a) = ۱ - ۰/۰۰۲۷ = ۰/۹۹۷۳$$

$$۰/۹۹۷۳ = P \left(\frac{-a}{\frac{۰/۰۲}{\sqrt{۵}}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq \frac{a}{\frac{۰/۰۲}{\sqrt{۵}}} \right) = P(-۱۱۱/۸a \leq Z \leq ۱۱۱/۸a)$$

$$= ۲P(Z \leq ۱۱۱/۸a) - ۱$$

$$\Rightarrow P(Z \leq ۱۱۱/۸a) = ۰/۹۹۸۶۵ \Rightarrow ۱۱۱/۸a = ۲/۹۹۵ \Rightarrow a = ۰/۰۲۷$$

توزیع نمونه‌ای واریانس نمونه

توزیع کای-دو

فرض کنید Z متغیری تصادفی با توزیع نرمال استاندارد $Z \sim N(0, 1)$ باشد و قرار دهیم $Y = Z^2$.
در این صورت تابع چگالی Y عبارتست از:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(Z^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq Z \leq \sqrt{y}) \\ &= F_Z(\sqrt{y}) - F_Z(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} f_Z(\sqrt{y}) + \frac{1}{2\sqrt{y}} f_Z(-\sqrt{y}) = \frac{1}{\sqrt{y}} f_Z(\sqrt{y}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\sqrt{y})^2} = \frac{1}{2^{\frac{1}{2}} \Gamma(\frac{1}{2})} y^{\frac{1}{2}-1} e^{-\frac{1}{2}y} \quad y > 0. \end{aligned}$$

- بنابراین $Y = Z^2 \sim \chi^2_{(1)}$.
- حال اگر Z_1, Z_2, \dots, Z_n یک نمونه تصادفی n تایی از جامعه نرمال استاندارد باشند آنگاه $Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2$ دارای توزیع کای-دو با n درجه آزادی $\chi^2_{(n)}$ است.
- جدول مربوط به توزیع کای-دو در پیوست کتاب آمده است.
- یادآوری:** توزیع $\chi^2_{(n)}$ حالت خاصی از توزیع گاما با پارامترهای $r = \frac{n}{2}$ و $\beta = 2$ است.

مثال ۴

اگر $X \sim \chi^2_{(18)}$ ، مطلوبست:

الف- محاسبه‌ی $P(X \leq 7/0.1)$

ب- اگر $P(X > x) = 0.05$ ، مقدار x را به دست آورید.

راه حل:

$$\text{الف- } \chi^2_{0.1, (18)} = 7/0.1 \quad \Rightarrow \quad P(X \leq 7/0.1) = 0.1$$

$$\text{ب- } P(X > x) = 0.05 \quad \Rightarrow \quad P(X \leq x) = 0.95$$

$$\Rightarrow \quad x = \chi^2_{0.95, (18)} = 28.9$$

توزیع نمونه‌ای واریانس نمونه S^2

یک معیار پراکندگی مناسب واریانس نمونه است: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

این معیار را زمانی به کار می‌بریم که میانگین جامعه یعنی μ شناخته شده نباشد.

دلیل انتخاب آن عبارت است از $E(S^2) = \sigma^2$

اگر X_1, X_2, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از جامعه نرمال با میانگین μ و واریانس σ^2 باشند، آنگاه

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$$

اثبات:

$$\sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi^2_{(n)} \Rightarrow \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 = \sum_{i=1}^n Z_i^2$$

مثال ۵

یک جامعه‌ی نرمال واریانس ۶ دارد. اگر نمونه‌ی تصادفی ۲۵ تایی از این جامعه انتخاب شود، احتمال این که واریانس نمونه بین ۳/۴۵ و ۱۰/۷۵ باشد، چه قدر است؟

راه حل:

$$\begin{aligned}P(3/45 < S^2 < 10/75) &= P\left(\frac{24 \times 3/45}{6} < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \frac{24 \times 10/75}{6}\right) \\&= P\left(13/8 < \chi^2_{(24)} < 43\right) \\&= P\left(\chi^2_{(24)} < 43\right) - P\left(\chi^2_{(24)} \leq 13/8\right) \\&= 0/99 - 0/05 = 0/94\end{aligned}$$

مثال ۶

طول عمر لامپ‌های تصویر تلویزیون ساخت کارخانه‌ای دارای توزیع نرمال با انحراف معیار ۶۰ ساعت است. اگر ۱۰ لامپ تصویر تلویزیون ساخت این کارخانه به طور تصادفی انتخاب شود، احتمال این که انحراف استاندارد این ۱۰ لامپ بیش از ۵۰ ساعت نباشد، چه قدر است؟

راه حل:

$$\begin{aligned}P(S \leq 50) &= P(S^2 \leq 2500) \\&= P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \frac{9 \times 2500}{3600}\right) \\&= P\left(\chi^2_{(9)} \leq 6/25\right) \\&\simeq 0/3\end{aligned}$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

توزیع نمونه‌ای

توزیع t -استیودنت

اگر X_1, X_2, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از جامعه نرمال با میانگین μ و واریانس σ^2 باشند، آنگاه $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ دارای توزیع نرمال استاندارد است.

حال اگر σ^2 مجهول باشد، به جای آن می‌توان از واریانس نمونه S^2 استفاده کرد.

اکنون اگر در Z به جای σ مقدار S را قرار دهیم، آنگاه $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ دارای توزیع t است.

تعریف توزیع t -استیودنت:

اگر $Z \sim N(0, 1)$ و $Y \sim \chi^2_{(n)}$ و Y و Z از یکدیگر مستقل باشند، آنگاه متغیر تصادفی

$$T = \frac{Z}{\sqrt{Y/n}}$$

دارای توزیع t با n درجه آزادی $T \sim t_{(n)}$ است.
جدول مربوط به توزیع t در پیوست کتاب آمده است.

مثال ۷

اگر $T \sim t_{(16)}$ ، مطلوب است

الف- محاسبه‌ی احتمال $P(T > 1/34)$

ب- اگر $P(T < t) = 0/8$ باشد، مقدار t را به دست آورید.

راه‌حل:

$$\text{الف- } t_{0/9, (16)} = 1/34 \quad \Rightarrow \quad P(T > 1/34) = 1 - P(T \leq 1/34) = 1 - 0/9 = 0/1$$

$$\text{ب- } P(T < t) = 0/8 \quad \Rightarrow \quad t = t_{0/8, (16)} = 0/865$$

توزیع نمونه‌ای $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$

قضیه: اگر \bar{X} و S^2 به ترتیب میانگین و واریانس یک نمونه‌ی تصادفی به اندازه n از یک جامعه نرمال با میانگین μ و واریانس σ^2 باشند، آنگاه

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{(n-1)}$$

اثبات:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad \perp \quad Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$$

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{Y}{n-1}}} \sim t_{(n-1)}$$

$$T = \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{(n-1)}$$

نکته

برای $n \geq 30$ توزیع t تقریباً با توزیع نرمال استاندارد برابر می‌شود.

به همین علت در جدول t مقادیر درجه‌ی آزادی بزرگ‌تر از 30 با ∞ نشان داده شده است و مقادیر این ردیف از جدول با جدول توزیع نرمال استاندارد یکی است.

مثال ۸

نمره‌های یک کلاس از دانشجویان دارای توزیع نرمال با میانگین ۱۵ است. اگر از این کلاس یک نمونه‌ی تصادفی ۲۰ تایی انتخاب کنیم و مشاهده کنیم که انحراف استاندارد نمره‌های آن‌ها ۴/۲۸ است، احتمال این که میانگین نمره‌های این افراد از ۱۷ بیشتر باشد، چه قدر است؟

راه حل:

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 17) &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} > \frac{17 - 15}{\frac{4/28}{\sqrt{20}}}\right) = P(T_{(19)} > 2/09) \\ &= 1 - P(T_{(19)} \leq 2/09) = 1 - 0/975 = 0/025 \end{aligned}$$