

بسم الله الرحمن الرحيم



تمرینات سری اول : حد و پیوستگی

۲۵ آبان ۱۳۹۹



سوال ۱

حدود زیر را در صورت وجود محاسبه کنید.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} \quad (۱)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{4} \cos x - 1}{1 - \tan^4 x} \quad (۲)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x - \frac{\pi}{4})}{1 - 2 \cos x} \quad (۳)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)(1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x}) \cdots (1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^n} \quad (۴)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} \quad (۵)$$



قسمت الف) از تغییر متغیر $t = 1 + x$ استفاده می‌کنیم. بنابراین اگر $x \rightarrow 0$ ، آنگاه داریم:

$$\begin{aligned}
 L &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\sqrt[n]{t} - 1}{t - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\sqrt[n]{t} - 1}{(\sqrt[n]{t} - 1)(\sqrt[n]{t^{n-1}} + \sqrt[n]{t^{n-2}} + \sqrt[n]{t^{n-3}} + \dots + 1)} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt[n]{t^{n-1}} + \sqrt[n]{t^{n-2}} + \sqrt[n]{t^{n-3}} + \dots + 1} = \frac{1}{n}.
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2}\cos x - 1}{1 - \tan^2 x} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2}\cos x - 1}{1 - \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\sqrt{2}\cos x - 1)\cos^2 x}{\cos^2 x - \sin^2 x} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\sqrt{2}\cos x - 1)\cos^2 x}{2\cos^2 x - 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\sqrt{2}\cos x - 1)\cos^2 x}{(\sqrt{2}\cos x - 1)(\sqrt{2}\cos x + 1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 x}{\sqrt{2}\cos x + 1} = \frac{1}{4}
\end{aligned}$$



قسمت ج) از تغییر متغیر $t = x - \frac{\pi}{3}$ استفاده می‌کنیم، وقتی $x \rightarrow 0$ داریم $t \rightarrow -\frac{\pi}{3}$.

$$\begin{aligned}
 L &= \lim_{t \rightarrow -\frac{\pi}{3}} \frac{\sin t}{1 - 2\cos(t + \frac{\pi}{3})} = \lim_{t \rightarrow -\frac{\pi}{3}} \frac{\sin t}{1 - 2(\cos t \cos \frac{\pi}{3} - \sin t \sin \frac{\pi}{3})} \\
 &= \lim_{t \rightarrow -\frac{\pi}{3}} \frac{\sin t}{1 - 2(\frac{1}{2}\cos t - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin t)} = \lim_{t \rightarrow -\frac{\pi}{3}} \frac{\sin t}{1 - \cos t + \sqrt{3}\sin t} \\
 &= \lim_{t \rightarrow -\frac{\pi}{3}} \frac{\sin t}{1 - (1 - 2\sin^2 \frac{t}{2}) + 2\sqrt{3}\sin \frac{t}{2}\cos \frac{t}{2}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow -\frac{\pi}{3}} \frac{\sin t}{2\sin \frac{t}{2}(\sin \frac{t}{2} + \sqrt{3}\cos \frac{t}{2})} = \lim_{t \rightarrow -\frac{\pi}{3}} \frac{2\sin \frac{t}{2}\cos \frac{t}{2}}{2\sin \frac{t}{2}(\sin \frac{t}{2} + \sqrt{3}\cos \frac{t}{2})} \\
 &= \lim_{t \rightarrow -\frac{\pi}{3}} \frac{\cos \frac{t}{2}}{\sin \frac{t}{2} + \sqrt{3}\cos \frac{t}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 L &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)(1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x}) \dots (1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^n} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)(1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x}) \dots (1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^n} \\
 &\times \frac{(1+\sqrt{x})(1+\sqrt{x}+\sqrt{x^2}) \dots (1+\sqrt[n]{x}+\sqrt[n]{x^2}+\dots+\sqrt[n]{x^{n-1}})}{(1+\sqrt{x})(1+\sqrt{x}+\sqrt{x^2}) \dots (1+\sqrt[n]{x}+\sqrt[n]{x^2}+\dots+\sqrt[n]{x^{n-1}})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)[(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})][(1-\sqrt[3]{x})(1+\sqrt{x}+\sqrt{x^2})] \dots [(1-\sqrt[n]{x})(1+\sqrt[n]{x}+\sqrt[n]{x^2}+\dots+\sqrt[n]{x^{n-1}})]}{(1-x)^n(1+\sqrt{x})(1+\sqrt{x}+\sqrt{x^2}) \dots (1+\sqrt[n]{x}+\sqrt[n]{x^2}+\dots+\sqrt[n]{x^{n-1}})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)^n}{(1-x)^n(1+\sqrt{x})(1+\sqrt{x}+\sqrt{x^2}) \dots (1+\sqrt[n]{x}+\sqrt[n]{x^2}+\dots+\sqrt[n]{x^{n-1}})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(1+\sqrt{x})(1+\sqrt{x}+\sqrt{x^2}) \dots (1+\sqrt[n]{x}+\sqrt[n]{x^2}+\dots+\sqrt[n]{x^{n-1}})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2 \times 3 \times \dots \times n} = \frac{1}{n!}.
 \end{aligned}$$



قسمت ۵)

رابطه‌ی زیر برای هر $x \neq 0$ برقرار است:

$$-|x| \leq x \sin \frac{1}{x} \leq |x|.$$

در نتیجه چون

$$\lim_{x \rightarrow 0} -|x| = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0,$$

با استفاده از قضیه فشردگی (ساندویچ) داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$



سوال ۲

فرض کنید تابع f در نقطه $x = a$ پیوسته باشد.

الف) نشان دهید اگر $f(a) > 0$ تابع f در یک همسایگی $x = a$ مثبت است.

ب) نشان دهید اگر $f(a) < 0$ تابع f در یک همسایگی $x = a$ منفی است.



حل) از آن جا که تابع f در نقطه $x = a$ پیوسته است، طبق تعریف داریم:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad s.t. \quad \forall x; |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon.$$

حال اگر طبق فرض (الف) داشته باشیم $f(a) > 0$ ، قرار می دهیم $\epsilon := \frac{f(a)}{2}$ ، در نتیجه طبق تعریف بالا $\delta > 0$ وجود دارد که برای هر x که در رابطه $|x - a| < \delta$ صدق می کند، داریم:

$$|f(x) - f(a)| < \frac{f(a)}{2} \quad (۱)$$

بنابراین می توان نتیجه گرفت:

$$\frac{f(a)}{2} < f(x) < \frac{3f(a)}{2}.$$

آنگاه نتیجه می شود در همسایگی به شعاع $\delta > 0$ از $x = a$ ، طبق رابطه (۱) تابع $f(x)$ مثبت است



از طرفی اگر طبق فرض (ب) داشته باشیم $f(a) < 0$ ، قرار می‌دهیم $\epsilon := -\frac{f(a)}{2}$ ، در نتیجه به طور مشابه طبق تعریف پیوستگی $\delta > 0$ وجود دارد که برای هر x که در رابطه $|x - a| < \delta$ صدق می‌کند، داریم:

$$|f(x) - f(a)| < -\frac{f(a)}{2} \quad (2)$$

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت:

$$\frac{3f(a)}{2} < f(x) < \frac{f(a)}{2}.$$

آنگاه نتیجه می‌شود در همسایگی به شعاع $\delta > 0$ از $x = a$ ، طبق رابطه (2) تابع $f(x)$ منفی است.



سوال ۳

نقاط ناپیوستگی تابع زیر را بررسی کنید.

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in Q \\ -x^2, & x \notin Q \end{cases}$$



حل) برای حل این سوال از این نکته استفاده می‌کنیم که پیوستگی تابع $f(x)$ در نقطه $x = a$ معادل با این است که برای هر دنباله دلخواه $\{a_n\}$ که $a_n \rightarrow a$ داشته باشیم $f(a_n) \rightarrow f(a)$. حال ادعا می‌کنیم تابع f با ضابطه تعریف شده در سوال، در نقطه $x = 0$ پیوسته است. زیرا اگر $\{a_n\}$ دنباله‌ای دلخواه از اعداد گویا یا اصم باشد که $a_n \rightarrow 0$ ، آنگاه a_n^2 و $-a_n^2$ نیز به سمت صفر میل می‌کند. در نتیجه تابع $f(x)$ در صفر پیوسته است.

اکنون ادعا می‌کنیم تابع f در هیچ نقطه‌ی دیگری غیر از صفر پیوسته نیست. نقطه دلخواه $a_0 \in \mathbb{Q}$ را در نظر گرفته و فرض کنیم دنباله $\{a_n\}$ به صورت $a_n := a_0 + \frac{1}{\sqrt{2}n}$ تعریف شود. در این صورت $a_n \in \mathbb{Q}'$ برای هر n و به علاوه $a_n \rightarrow a_0$ اما داریم

$$f(a_n) = -(a_0 + \frac{1}{\sqrt{2}n})^2 = -(a_0^2 + \frac{1}{2n^2} + 2\frac{a_0}{\sqrt{2}n})$$

در نتیجه $f(a_n) \rightarrow -a_0^2$ از طرفی طبق ضابطه، $f(a_0) = a_0^2$ پس نتیجه می‌شود $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \neq f(a_0)$ بنابراین تابع f در اعداد گویا پیوسته نیست.



حال نقطه دلخواه $b_0 \in Q'$ در نظر می‌گیریم. دنباله $b_n := \frac{[nb_0]}{n}$ را تعریف می‌کنیم. برای هر n داریم $b_n \in Q$ و هم‌چنین $b_n \rightarrow b_0$. زیرا برای $n \neq 0$ داریم:

$$b_0 - \frac{1}{n} \leq [b_0] \leq b_0 \implies nb_0 - 1 \leq [nb_0] \leq nb_0 \implies b_0 - \frac{1}{n} \leq \frac{[nb_0]}{n} \leq b_0.$$

از طرفی چون

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_0 - \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_0 = b_0,$$

بنابراین طبق قضیه فشردگی داریم:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[nb_0]}{n} = b_0.$$

اما به این دلیل که $b_n \in Q$ در نتیجه $\left(\frac{[nb_0]}{n}\right)^2 = b_n^2 = f(b_n)$ پس $b_n^2 \rightarrow b_0^2$. اما طبق ضابطه تابع می‌دانیم $f(b_0) = -b_0^2$ که نتیجه می‌دهد

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \neq f(b_0).$$

پس تابع f در نقاط گنگ هم پیوسته نیست. پس ادعای موردنظر درست است و تابع f فقط در صفر پیوسته است.



سوال ۴

فرض کنید $f(x) = \frac{x^3}{4} - \sin \pi x + 3$. آیا نقطه $x_0 \in (-2, 2)$ وجود دارد بطوریکه $f(x_0) = \frac{7}{3}$ ؟



حل) تابع مورد نظر روی بازه‌ی داده شده پیوسته است و $f(2) = 5$ و $f(-2) = 1$ و در نتیجه

$$f(-2) < \frac{7}{3} < f(2)$$

حال با استفاده از قضیه مقدار میانی برای تابع پیوسته‌ی f روی بازه $(-2, 2)$ نتیجه می‌گیریم که نقطه‌ای مثل $x_0 \in (-2, 2)$ وجود دارد که $f(x_0) = \frac{7}{3}$.

یادآوری (قضیه مقدار میانی): اگر تابع $f(x)$ بر بازه $[a, b]$ پیوسته و s عددی بین $f(a)$ و $f(b)$ باشد، آنگاه عددی مانند c متعلق به $[a, b]$ هست به طوری که $f(c) = s$.



سوال ۵

فرض کنید $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی پیوسته باشد به طوری که برای همه $x \in (0, 1)$ داریم $f(x)^2 = 1$. ثابت کنید $f = 1$ یا $f = -1$.



حل) طبق فرض سوال داریم:

$$\forall x \in (0, 1), f(x)^2 = 1 \rightarrow f(x) = \pm 1 \quad (3)$$

حال باید نشان دهیم که مقدار تابع f در بازه $(0, 1)$ یا $+1$ یا -1 است. فرض خلف می‌کنیم که تابع f در جاهایی از بازه $(0, 1)$ برابر -1 و در جاهای دیگری برابر $+1$ شود یعنی:

$$\exists y_1 \in (0, 1) \text{ s.t. } f(y_1) = -1, \exists y_2 \in (0, 1) \text{ s.t. } f(y_2) = +1 \quad (4)$$

از (3) و (4) می‌توان نتیجه گرفت طبق قضیه مقدار میانی یک z بین y_1 و y_2 وجود دارد به‌طوری‌که $f(z) = 0$ و این با فرض $\forall x \in (0, 1) f(x)^2 = 1$ تناقض دارد. پس فرض خلف باطل و حکم درست است.



سوال ۶

فرض کنید $a \in \mathbb{R}$. با بیان قضایا به طور دقیق ثابت کنید عدد حقیقی مانند x_0 هست به طوری که :

$$x_0^3 + ax_0 + \sin x_0 = 1$$



حل) تابع $f(x) = x^3 + ax + \sin x - 1$ روی \mathbb{R} تابعی پیوسته است، همچنین:

$$f(0) = -1 < 0,$$

از طرفی $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، یعنی برای هر $M > 0$ ، N ای مثبت موجود است که برای هر $x > N$ ، $f(x) > M$ ، مثلاً برای $M = 1$ ، N ای موجود است که در بازه $(N, +\infty)$ ، $f(x) > M = 1$ ؛ پس $f(N+1) > 0$. لذا بنابر قضیه مقدار میانی یا حالت خاص آن بولتزانو عددی چون x_0 در بازه $[0, N+1]$ موجود است که $f(x_0) = 0$ یعنی $x_0^3 + ax_0 + \sin x_0 - 1 = 0$.



سوال ۷

فرض کنید $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f توابعی پیوسته باشند و به ازای هر $q \in \mathbb{Q}$ داشته باشید $f(q) = g(q)$.
نشان دهید به ازای هر $x \in \mathbb{R}$ داریم $f(x) = g(x)$.



حل) به ازای هر $r \in \mathbb{R}$ دنباله‌ای در \mathbb{Q} وجود دارد که به r میل می‌کند. مثلاً

$$a_n = \frac{[nr]}{n}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = r$$

طبق فرض به ازای هر n داریم:

$$f(a_n) = g(a_n) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n)$$

می‌دانیم f و g هردو پیوسته اند، بنابراین داریم:

$$f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) = g\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) \longrightarrow f(r) = g(r).$$



سوال ۸

تابع f در فاصله $[0, \frac{\pi}{4}]$ پیوسته است و به ازای هر x در این فاصله داریم $0 \leq f(x) \leq 1$ ثابت کنید حداقل یک $x_0 \in [0, \frac{\pi}{4}]$ وجود دارد که $f(x_0) = \sin x_0$.



حل) یک تابع کمکی به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\forall x \in [0, \frac{\pi}{4}], g(x) = f(x) - \sin(x)$$

تابع $g(x)$ تابعی پیوسته است زیرا تفاضل دو تابع پیوسته است و داریم:

$$g(0) = f(0) - \sin(0) = 0 - 0 = 0$$

$$g(\frac{\pi}{4}) = f(\frac{\pi}{4}) - \sin(\frac{\pi}{4}) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$$

اگر $g(0) = 0$ یا $g(\frac{\pi}{4}) = 0$ آنگاه کافی است $x_0 = 0$ یا $x_0 = \frac{\pi}{4}$ اختیار کنیم.
در غیر اینصورت داریم:

$$g(0) > 0, g(\frac{\pi}{4}) < 0 \rightarrow g(0)g(\frac{\pi}{4}) < 0$$

لذا بنا بر قضیه بولتزانو $x_0 \in [0, \frac{\pi}{4}]$ وجود دارد به طوری که $g(x_0) = 0$ و در نتیجه داریم:

$$f(x_0) = \sin x_0$$



سوال ۹

فرض کنید که $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ پیوسته باشد. ثابت کنید عددی مانند c در بازه $[0, 1]$ وجود دارد که $f(c) = c$.



حل) یک تابع کمکی به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\forall x \in [0, 1], g(x) = f(x) - x$$

تابع $g(x)$ تابعی پیوسته است زیرا تفاضل دو تابع پیوسته است و داریم:

$$x = 0 \rightarrow g(0) = f(0) \xrightarrow[\substack{\forall x \in [0, 1] \\ 0 \leq f(x) \leq 1}]{\quad} 0 \leq g(0) \leq 1$$

$$x = 1 \rightarrow g(1) = f(1) - 1 \xrightarrow[\substack{\forall x \in [0, 1] \\ 0 \leq f(x) \leq 1}]{\quad} -1 \leq g(1) \leq 0$$

اگر $g(0) = 0$ یا $g(1) = 0$ آنگاه کافی است $c = 0$ یا $c = 1$ اختیار کنیم.
در غیر اینصورت داریم:

$$g(0) > 0, g(1) < 0 \implies g(0)g(1) < 0$$

لذا بنا بر قضیه بولتزانو $c \in [0, 1]$ وجود دارد به طوری که $g(c) = 0$ و در نتیجه داریم:

$$f(c) = c$$



سوال ۱۰

فرض کنید $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ برای هر $x, y \in \mathbb{R}$ در رابطه $f(x + y) = f(x) + f(y)$ صدق کند. نشان دهید:

۱. $f(nx) = nf(x)$ برای هر $x \in \mathbb{R}$ و $n \in \mathbb{N}$.

۲. f

در یک نقطه پیوسته است اگر و فقط اگر در \mathbb{R} پیوسته باشد.

۳. f پیوسته است اگر و فقط اگر برای عددی مانند $m \in \mathbb{R}$ ، $f(x) = mx$.



حل قسمت الف)

با توجه به شرط $f(x + y) = f(x) + f(y)$ داریم:

$$f(\circ) = f(\circ + \circ) = f(\circ) + f(\circ)$$

بنابراین $f(\circ) = \circ$ و همچنین:

$$f(a + (-a)) = f(\circ) = \circ$$

بنابراین:

$$f(a + (-a)) = f(a) + f(-a)$$

در نتیجه

$$f(-a) = -f(a)$$

داریم:

$$f(nx) = f(x + \dots + x) = f(x) + f(x + \dots + x) = f(x) + \dots + f(x)$$

بنابراین

$$f(nx) = nf(x)$$



حل قسمت ب)

واضح است که اگر f در \mathbb{R} پیوسته باشد، در نقطه‌ای مانند $x \in \mathbb{R}$ نیز پیوسته است.
برعکس فرض کنیم تابع f در نقطه‌ای مانند $x_0 \in \mathbb{R}$ پیوسته باشد، نشان می‌دهیم در هر نقطه دلخواه مانند $y \in \mathbb{R}$ نیز تابع f پیوسته است. باید نشان دهیم $\lim_{x \rightarrow y} f(x) = f(y)$.

می‌دانیم تابع f در x_0 پیوسته است هرگاه $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. این معادل است با

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0) \text{ بنابراین}$$

$$\lim_{x \rightarrow y} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(y + h)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} f(y + h + x_0 - x_0)$$

$$\stackrel{\text{فرض سوال}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} (f(y) + f(x_0 + h - x_0))$$

$$\stackrel{\text{قسمت الف}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} (f(y) + f(x_0 + h) - f(x_0))$$

$$= f(y) + \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) - f(x_0)$$

$$= f(y) + f(x_0) - f(x_0) = f(y)$$



حل قسمت ج)
فرض کنیم f پیوسته باشد و $f(1) = m$. در این صورت برای هر $n \in \mathbb{Z}^+$ داریم:

$$f(n) = f(n \times 1) \stackrel{\text{قسمت الف}}{=} n f(1) = mn$$

به ازای $n \in \mathbb{Z}^-$ داریم:

$$f(n) = f(-n \times -1) \stackrel{\text{قسمت الف}}{=} -n \times f(-1) \stackrel{\text{قسمت الف}}{=} -n \times (-f(1)) = mn$$

به ازای هر $x \in \mathbb{Q}$ ، $x = \frac{p}{q}$ ، که $p \in \mathbb{Z}$ و $q \in \mathbb{N}$. بنابراین:

$$f(p) = f(qx) \stackrel{\text{قسمت الف}}{=} q f(x) = mp$$

بنابراین $f(x) = m \frac{p}{q} = mx$

برای هر $r \in \mathbb{R}$ دنباله‌ای از اعداد گویا مانند $(x_n) = (\frac{[rn]}{n})$ وجود دارد که $x_n \rightarrow r$ بنابراین

$$f(r) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) \stackrel{\text{پیوستگی}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} mx_n = mr.$$



سوال ۱۱

فرض کنید $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی پیوسته باشد و $a \in \mathbb{R}$ وجود داشته باشد بطوری که $f(f(a)) = a$ ثابت کنید $c \in \mathbb{R}$ وجود دارد بطوری که $f(c) = c$.



حل) اگر $f(a) = a$ باشد که مسئله حل است، در غیر این صورت تابع کمکی $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ با ضابطه $g(x) = f(x) - x$ تعریف می‌کنیم. با توجه به پیوستگی f ، تابع g نیز پیوسته است. در این صورت

$$\begin{aligned}g(a) &= f(a) - a \\g(f(a)) &= f(f(a)) - f(a) = a - f(a)\end{aligned}$$

می‌بینیم که $g(a)$ و $g(f(a))$ مختلف‌العلامت هستند. بنابراین طبق قضیه مقدار میانی c ای وجود دارد که $g(c) = 0$. بنابراین

$$f(c) = c$$



سوال ۱۲

فرض کنید $n \in \mathbb{N}$ و $f(x) = x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \dots + a_0$ ، $a_i \in \mathbb{R}$. نشان دهید وجود دارد $y \in \mathbb{R}$ ، به طوری که به ازای هر $x \in \mathbb{R}$ ، $f(x) \geq f(y)$.



حل) واضح است که

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

قرار می‌دهیم $M_1 = M_2 = |f(\circ)| + 1 = |a_\circ| + 1$ در این صورت

$$M_1 : \exists N_1 \quad \forall x \geq N_1 \Rightarrow f(x) > |f(\circ)| + 1 > f(\circ)$$

$$M_2 : \exists N_2 \quad \forall x \leq -N_2 \Rightarrow f(x) > |f(\circ)| + 1 > f(\circ)$$

بنابراین تابع $f : [-N_2, N_1] \rightarrow \mathbb{R}$ پیوسته است و طبق قضیه اکسترمم می‌نیمم خود را در این بازه می‌پذیرد، یعنی $y \in [-N_2, N_1]$ وجود دارد که برای هر $x \in [-N_2, N_1]$ داریم

$$f(y) \leq f(x)$$

به ویژه $f(y) \leq f(\circ)$. همچنین برای هر $x \geq N_1$ و $x \leq -N_2$ داریم $f(x) > f(\circ)$. پس $f(y) \leq f(x)$ یعنی برای هر $x \in \mathbb{R}$ داریم:

$$f(y) \leq f(x)$$



سوال ۱۳

فرض کنید f تابعی پیوسته روی بازه $[a, b]$ باشد و $f(a) = f(b)$. اگر $n \in \mathbb{N}$ ، نشان دهید عددی مانند $c \in [a, b - \frac{b-a}{n}]$ وجود دارد که $f(c) = f(c + \frac{b-a}{n})$.



حل) تعریف می‌کنیم $g(x) = f(x) - f(x + \frac{b-a}{n})$ دامنه تابع g برابر $[a, b - \frac{b-a}{n}]$ است. نقاط زیر را در نظر می‌گیریم:

$$x_k = a + (\frac{b-a}{n})k, \quad k = 0, 1, \dots, n-1, n.$$

تعریف می‌کنیم $g(x) = f(x) - f(x + \frac{b-a}{n})$. دامنه تابع g برابر $[a, b - \frac{b-a}{n}]$ است. نقاط زیر را در نظر می‌گیریم:

$$x_k = a + (\frac{b-a}{n})k, \quad k = 0, 1, \dots, n-1, n.$$

در این صورت داریم:

$$\sum_{k=0}^{n-1} g(x_k) = g(x_0) + g(x_1) + \dots + g(x_{n-1})$$

$$= \{f(a) - f(a + \frac{b-a}{n})\} + \{f(a + \frac{b-a}{n}) - f(a + 2(\frac{b-a}{n}))\} \\ + \dots + \{f(a + (n-1)(\frac{b-a}{n})) - f(a + n(\frac{b-a}{n}))\}$$



با توجه $f(a + n(\frac{b-a}{n})) = f(b)$ داریم $f(a) = f(b)$ بنابراین

$$g(x_0) + g(x_1) + \dots + g(x_{n-1}) = f(a) - f(b) = 0$$

بنابراین دو حالت رخ می دهد.

حالت اول: اگر x_j ای وجود داشته باشد که $g(x_j) = 0$ که آنگاه $c = x_j$ جواب مسئله خواهد بود.
حالت دوم: چون مجموع فوق صفر است، لذا تمام جملات آن نمی توانند هم علامت باشند. بنابراین $x_i \neq x_j$ که $i \neq j$ وجود دارد که

$$g(x_i)g(x_j) < 0$$

بنابراین طبق قضیه مقدار میانی عدد c بین x_i و x_j هست که $g(c) = 0$ و در نتیجه

$$f(c) = f(c + \frac{b-a}{n})$$



سوال ۱۴

فرض کنید n عددی طبیعی و $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی پیوسته باشد و $f(0) = f(1)$. نشان دهید $a, b \in [0, 1]$ وجود دارند به طوری که $b - a = \frac{1}{n}$ و $f(a) = f(b)$.



حل) تابع کمکی $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ با ضابطه $g(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$ تعریف می‌کنیم. با توجه به پیوستگی f و چون تفاضل و ترکیب دو تابع پیوسته، پیوسته است، بنابراین $g(x)$ تابعی پیوسته است. داریم

$$\begin{aligned} g(0) &= f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0) \\ g\left(\frac{1}{n}\right) &= f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) \\ &\vdots \\ g\left(\frac{n-1}{n}\right) &= f(1) - f\left(\frac{n-1}{n}\right) \end{aligned}$$

اگر مقادیر فوق را با هم جمع کنیم، داریم

$$g(0) + g\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + g\left(\frac{n-1}{n}\right) = f(1) - f(0)$$

چون طبق فرض سوال $f(1) = f(0)$



بنابراین

$$g(0) + g\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + g\left(\frac{n-1}{n}\right) = 0.$$

چون مجموع فوق صفر است، لذا تمام جملات آن نمی‌توانند هم علامت باشند. بنابراین $0 \leq i, j \leq n-1$ وجود دارند که $i \neq j$ به طوری که $g\left(\frac{i}{n}\right) \geq 0$ و $g\left(\frac{j}{n}\right) \leq 0$. بنابراین

$$g\left(\frac{i}{n}\right)g\left(\frac{j}{n}\right) < 0.$$

بنابراین طبق قضیه مقدار میانی عدد c بین $\frac{i}{n}$ و $\frac{j}{n}$ هست که $g(c) = 0$. بنابراین

$$f\left(c + \frac{1}{n}\right) = f(c)$$

کافی است قرار دهیم

$$b = c + \frac{1}{n} \text{ و } a = c$$



با تشکر از توجه شما

