




អង្គការថែទាំសុខភាពក្រសួងកម្ពុជា (រ៉ាក់)
REPRODUCTIVE HEALTH ASSOCIATION OF CAMBODIA (RHAC)

ភាពពេញវ័យ

និងការមក

រដូវ



១. ភាពពេញវ័យ និងការប្រែប្រួលរបស់យុវវ័យ

ទាំងក្មេងស្រី និង ក្មេងប្រុស នៅពេលឈានដល់វ័យជំទង់ រាងកាយ របស់គេចាប់ផ្តើមផលិតអ័រម៉ូន ដែលនាំឱ្យមានការប្រែប្រួលខាង រាងកាយ និងអារម្មណ៍ ដែលការប្រែប្រួលនេះហៅថា **ភាពពេញវ័យ**។



ក. ការប្រែប្រួលរាងកាយ



ក្មេងស្រី ភាពពេញវ័យ
អាចកើតមាននៅចន្លោះ
អាយុ ៩ ដល់ ១៣ឆ្នាំ



ក្មេងប្រុស ភាពពេញវ័យ
អាចកើតមាននៅចន្លោះ
អាយុ ១០ ដល់១៤ឆ្នាំ

ខ. ការប្រែប្រួលអារម្មណ៍ និងអាកប្បកិរិយា



អារម្មណ៍ស្រងះស្រងោច
ច្របូកច្របល់



ទាមទារការចាប់អារម្មណ៍
ពីអ្នកដទៃ

មានភាពខ្មាសអៀនច្រើន



ចូលចិត្តតុបតែងខ្លួន



អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ភេទ
ផ្ទុយគ្នាឬដូចគ្នា



ឆាប់ខឹងឆាប់សប្បាយនិងរំភើប

២. អំពីរដូវរបស់ក្មេងស្រី



វិជ្ជា គឺជាការហូរឈាមលាយទ្រុំនឹងការបេះធ្លាក់នៃស្រទាប់ស្តើងៗខាងក្នុងនៃស្បូន ដែលហូរចេញតាមទ្វារមាស ប្រសិនបើគ្មានការបង្កកំណើត។ ជាទូទៅ ក្មេងស្រីអាចធ្លាក់ឈាមរដូវដំបូងនៅអាយុពី៩ឆ្នាំ ទៅ១៧ឆ្នាំ និងអាចអស់រដូវវិញនៅចន្លោះ ៤៥-៥៥ឆ្នាំ ទៅតាមស្ថានភាពសុខភាពមនុស្សម្នាក់ៗ។



- រដូវរដូវមានរយៈពេលចន្លោះពី២១ថ្ងៃ ទៅ៣៥ថ្ងៃម្តង ឬជាមធ្យម២៨ថ្ងៃ
- ការធ្លាក់ឈាមរដូវអាចមានរយៈពេលពី៣ទៅ៥ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ
- ឈាមរដូវធ្លាក់ច្រើននៅថ្ងៃទី១ឬទី២ ហើយកាន់តែតិចទៅៗ រហូតដល់អស់រដូវ



ប្រសិនបើក្មេងស្រីបានរួមភេទមិនបានការពារ ការបាត់រដូវអាចមានន័យថា នាងមានផ្ទៃពោះ។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះ ការប្រែប្រួល ឬការបាត់រដូវ អាចមកពីនាងមានអារម្មណ៍តានតឹងចុញចប់ ស្តួមពេក របបអាហារ និងធ្វើដំណើរច្រើនពេក។



៣. ការស្វែងយល់និងការគណនាវដ្តីរដូវ

ការយល់ដឹងពីវដ្តរដូវ សំខាន់ណាស់ចំពោះក្មេងស្រី ដើម្បីកំណត់បានពីភាព
ទៀងទាត់នៃរដូវ ជួយក្នុងការតាមដាន និងត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់ការ
មករដូវនៅខែបន្ទាប់។



ដើម្បីគណនាវដ្តីរដូវ៖

- ក្មេងស្រីត្រូវកំណត់ចំណាំថ្ងៃដំបូងដែលគាត់មករដូវ
(កត់ត្រាក្នុងសៀវភៅ ប្រតិទិនឬទូរស័ព្ទ)
- បើវដ្តរដូវមានរយៈពេល២៨ថ្ងៃ ក្មេងស្រីអាចរាប់
២៨ថ្ងៃបន្ថែម ដើម្បីដឹងពីថ្ងៃនៃការមករដូវក្នុងខែ
បន្ទាប់។

ចំណាំ៖

ចន្លោះពី២១ទៅ៣៥ថ្ងៃ ក្មេងស្រីអាចមានរដូវម្តង ដូច្នេះ
ការគណនាតាមដានក្នុងរយៈពេល២-៣ខែ ដើម្បីអាច
កំណត់បានថាវដ្តីរដូវរបស់គេមានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ។



៤. សញ្ញាមុន និងអំឡុងពេលមករដូវ

មុនពេលមករដូវជាដំបូងរាល់ខែ ក្នុងរយៈពេល២ឬ៣ថ្ងៃ
ក្មេងស្រីខ្លះអាចមានការប្រែប្រួលអារម្មណ៍ដូចជា៖



ឆាប់ខឹង



មួម៉ៅ



មិនសប្បាយចិត្ត



ឈឺចាប់តិចៗ



ដើមទ្រូងឡើងធំ



ប៉ុន្តែក្មេងស្រីខ្លះមិនមានអាការទាំងអស់នេះទេ



អំឡុងពេលមករដូវ ក្មេងស្រីខ្លះមិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទេ
តែក្មេងស្រីខ្លះអាចមានការឈឺចាប់នៅក្រោមផ្ចិត និងចង្កេះ។

ប្រសិនបើក្មេងស្រី មានការឈឺចាប់ខ្លាំង នាងអាចលេបថ្នាំ
បំបាត់ការឈឺចាប់បាន ឬទៅពិភាក្សា ជាមួយម្តាយ បងប្អូន
ស្រីសាច់ញាតិ គ្រូ ឬគ្រូពេទ្យ ដើម្បីសុំយោបល់បាន។



អង្គការថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា

អង្គការរ៉ាក់ធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវភេទ សុខភាពបន្តពូជដល់ស្ត្រី យុវវ័យ កម្មកររោងចក្រ និងក្រុមងាយរងគ្រោះនានា ដូចជាស្ត្រីធ្វើការក្នុងសេវាកំសាន្ត បុរស ស្រឡាញ់បុរស និងអ្នកប្លែងភេទនិងយេនឌ័រ។ រ៉ាក់ធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងក្រសួង សុខាភិបាល ក្រសួងផែនការ ព្រមទាំងសាលារៀន សាកលវិទ្យាល័យ រោងចក្រ សហគ្រាស និងជាមួយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្តាខេត្តដើម្បីចូលរួម ពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈ លើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាល សាធារណៈ និងឯកជន និងពង្រឹងការអប់រំរឿងផ្លូវភេទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់យុវវ័យ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរ៉ាក់ សូមចូលគេហទំព័រ www.rhac.org.kh បណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក RHAC Social Page និង RHAC YouTube។ ប្រសិនបើមានចម្ងល់ផ្នែក សុខភាព ឬសេវាគ្លីនិក សូមទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖

ទូរស័ព្ទ	010 812 812 / 089 333 990 / 088 7 107 107
អ៊ីម៉ែល	info@rhac.org.kh
គេហទំព័រ	www.rhac.org.kh
ហ្វេសប៊ុក	RHAC Social Page
យូទួប	RHAC រ៉ាក់



៥. ការគ្រប់គ្រងអនាម័យ និងការថែទាំខ្លួនពេលមានរដូវ

ការរក្សាអនាម័យ និងការថែទាំខ្លួនពេលមករដូវ មានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ក្មេងស្រី និងជាអ្វីដែលពួកគេគួរតែយល់ដឹង និងអនុវត្ត។

សកម្មភាពដែលគួរធ្វើអំឡុងពេលមករដូវ៖

លាងសម្អាតប្រដាប់ភេទជាមួយទឹកស្អាតឱ្យបាន
យ៉ាងហោចណាស់ **២ ប្រាំដង** ក្នុងមួយថ្ងៃ។



ត្រូវផ្លាស់ប្តូរសំឡីអនាម័យឱ្យបាន **៣ ទៅ ៤ ម៉ោងម្តង**
ឬញឹកជាងនេះទៅតាមបរិមាណនៃឈាមរដូវរបស់ខ្លួន និង
គួរដាក់សំឡីអនាម័យតាមខ្លួនជានិច្ច។ ករណីប្រើប្រាស់
ក្រណាត់សំពត់ ត្រូវបោកគក់សម្អាតជាមួយទឹក និងសាប៊ូ
ហើយហាលឱ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃ ដើម្បីសម្លាប់មេរោគ។

ក្មេងស្រីគួរតែហាត់ប្រាណ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាព
តានតឹង និងការឈឺចាប់ពេលមករដូវ ព្រមទាំងគេង
និងផឹកទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។



បរិភោគអាហារដែលមានជាតិដែក ដែល
មាននៅក្នុងសាច់ ស៊ុត បន្លែ ដើម្បីសុខភាព។

៦. វិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ពេលមករដូវ

ពេលខ្លះ ការមករដូវអាចបង្កភាពឈឺចាប់ដល់ក្មេងស្រី ដូច្នេះ
នាងអាចអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់។

- ក្មេងស្រីអាចច្រកទឹកក្ដៅឧណ្ហៗក្នុង
ដប ហើយយកមកស្ងួតពោះបាន



- ព្យាយាមញ្ជាំទឹកក្ដៅឧណ្ហៗ



- ហាត់ប្រាណ និងធ្វើ
ឱ្យរាងកាយមានភាព



- លេបថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់
តាមវេជ្ជបញ្ជា



៧. សម្ភារទ្រាប់ពេលមករដូវ

សម្ភារទ្រាប់ពេលមករដូវមានច្រើនដូចជា៖ សំឡី
អនាម័យ ឆ្នុកធ្វើពីសំឡី (*tampon*) ពែងរដូវ និង
ក្រណាត់អនាម័យ ហើយក្មេងស្រីមានជម្រើសក្នុង
ការប្រើប្រាស់សម្ភារទាំងនេះសមស្របតាមតម្រូវការ
និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ពួកគេ។




សំឡីអនាម័យមានច្រើនប្រភេទ តែគេនិយមប្រើប្រាស់ **៣ប្រភេទ** ខាងក្រោម៖

ប្រភេទធម្មតា៖ ប្រើសម្រាប់អ្នកមករដូវក្នុងបរិមាណ
ធម្មតា និងភាគច្រើនប្រើប្រាស់ សម្រាប់ពេលថ្ងៃ។




ប្រភេទក្រាស់៖ ប្រើសម្រាប់អ្នកមករដូវក្នុងបរិមាណ
ច្រើន និងពេលខ្លះប្រើប្រាស់សម្រាប់ ពេលយប់។

ប្រភេទស្លើង៖ ប្រើសម្រាប់អ្នកដែលជិតអស់រដូវ
ហើយរដូវមកក្នុងបរិមាណតិចតួចបំផុត ឬប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។




៨. របៀបប្រើប្រាស់សំឡីអនាម័យ៖

ហែកកញ្ចប់សំឡីអនាម័យ និងដកយក
បន្ទះសំឡីមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់។



បកក្រដាសដែលបិទលើផ្នែកស្អិត
ខាងក្រោយនៃសំឡីអនាម័យ រួចបិទ
ជាប់នឹងខោទ្រនាប់

បកក្រដាសដែលបិទលើស្លាបនៃសំឡី
អនាម័យ រួចបិទទៅនឹងផ្នែកខាងក្រោមនៃ
ខោទ្រនាប់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការលេចធ្លាយ និង
ធានាឱ្យវានៅជាប់ក្នុងទីតាំងបានល្អជាងមុន



សំឡីអនាម័យដែលប្រើប្រាស់រួច ត្រូវឱ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេល
បោះចោល ដើម្បីការពារការផ្ទុកនិងមិនល្អ និងបង្កឱ្យមេរោគ
សាយភាយ។

៩. សញ្ញាមួយចំនួនដែលអ្នកគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយ



ពេលខ្លះការមករដូវអាចមានភាពមិនប្រក្រតីនិងមានការប្រែប្រួល។ អ្នកគួរតែទៅប្រឹក្សានិងស្វែងរកជំនួយនៅពេលដែលមានភាពខុសប្រក្រតីកើតមានដូចជា៖



ខួបឈាមរដូវខ្លីជាង២១ថ្ងៃ ឬលើសពី ៣៥ថ្ងៃ

រយៈពេលធ្លាក់ឈាមរដូវលើសពី ៧ថ្ងៃ

ធ្លាក់ឈាមរដូវមិនទៀងទាត់ ឬរាំងរដូវ

បរិមាណឈាមរដូវមកតិចពេក ឬច្រើនពេកខុសប្រក្រតី

ឈឺចាប់ក្នុងពោះខ្លាំងពេលមករដូវ

មានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងខ្លាំង

ឆាប់មករដូវពេក មុនអាយុ៩ឆ្នាំ
ឬក្រោយមករដូវពេកលើសអាយុ១៨ឆ្នាំ។



១០. កន្លែងដែលក្មេងស្រីអាចរកស្វែងជំនួយ និងប្រឹក្សាអំពីរដូវ

