

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យ និងការថែទាំខ្លួនពេលមានរដូវ

ការក្សាអនាម័យ និងការថែទាំខ្លួនពេលមករដូវ មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្មេងស្រី និងជាអ្វីដែលពួកគេគួរតែយល់ដឹង និងអនុវត្ត។

សកម្មភាពដែលគួរធ្វើអំឡុងពេលមករដូវ៖

លាងសម្អាតប្រដាប់ភេទជាមួយទឹកស្អាតឱ្យបាន យ៉ាងហោចណាស់ **២ ឬ ៣ ដង** ក្នុងមួយថ្ងៃ។



ត្រូវផ្លាស់ប្តូរសំឡីអនាម័យឱ្យបាន **៣ ដង ឬ ៤ ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ** ឬញឹកជាងនេះទៅតាមបរិមាណនៃ ឈាមរដូវរបស់ខ្លួន និងគួរដាក់សំឡីអនាម័យតាមខ្លួនជានិច្ច។ ករណីប្រើប្រាស់ ក្រណាត់សំពត់ ត្រូវបោកគក់សម្អាតជាមួយទឹកនិងសាប៊ូ ហើយហាលឱ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃ ដើម្បី សម្លាប់មេរោគ។

ក្មេងស្រីគួរតែហាត់ប្រាណ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹង និង ការឈឺចាប់ពេលមករដូវ ព្រមទាំងគេង និងជីកទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។




ត្រូវបរិភោគអាហារដែលមានជាតិដែក ដែលមាននៅក្នុងសាច់ ស៊ូត បន្លែ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្លេកស្លាំង និងល្អសម្រាប់សុខភាព។

វិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ពេលមករដូវ

ពេលខ្លះ ការមករដូវអាចបង្កភាពឈឺចាប់ដល់ក្មេងស្រី ដូច្នេះនាង អាចអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់។




ព្យាយាមញ៉ាំទឹកក្តៅឧណ្ហៗ



ក្មេងស្រីអាចច្រកទឹកក្តៅឧណ្ហៗក្នុងដប ហើយយក មកស្អុំពោះបាន



ហាត់ប្រាណ និងធ្វើឱ្យរាងកាយមានភាពសកម្ម




លេបថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់តាមវេជ្ជបញ្ជា។



សញ្ញាមុនមករដូវ និងការគណនាវដ្តរដូវ

មុនពេលមករដូវជាទៀងរាល់ខែក្នុងរយៈពេល២ឬ៣ថ្ងៃ ក្មេងស្រីខ្លះអាចមានការប្រែប្រួលអារម្មណ៍ដូចជា មិនសប្បាយចិត្ត ម្ល៉េម៉ៅ ឆាប់ខឹង ងើមទ្រូងឡើងធំ ឬឈឺចាប់តិចៗ ហើយក្មេងស្រីខ្លះមិនមានអាការទាំងអស់នេះទេ។




អំឡុងពេលមករដូវ ក្មេងស្រីខ្លះមិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទេ តែក្មេងស្រីខ្លះអាចមានការឈឺចាប់នៅក្រោមផ្ចិត និងចង្កេះ។ ប្រសិនបើក្មេងស្រីមានការឈឺចាប់ខ្លាំង នាងអាចលេបថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់តាមវេជ្ជបញ្ជា ឬទៅពិភាក្សា ជាមួយម្តាយបងប្អូនស្រី សាច់ញាតិ គ្រូ ឬគ្រូពេទ្យ ដើម្បីសុំយោបល់បាន។

ការយល់ដឹងពីវដ្តរដូវ សំខាន់ណាស់ចំពោះក្មេងស្រី ដើម្បីកំណត់បានពីភាពទៀងទាត់នៃរដូវ ជួយក្នុងការតាមដាន និងត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់ការមករដូវនៅខែបន្ទាប់។


របៀបគណនាវដ្តរដូវ៖

១. ក្មេងស្រីត្រូវកំណត់ចំណាំថ្ងៃដំបូងដែលគាត់មករដូវ (កត់ត្រាក្នុងសៀវភៅ ប្រតិទិន ឬទូរស័ព្ទ)

២. បើវដ្តរដូវមានរយៈពេល២៨ថ្ងៃ ក្មេងស្រីអាចរាប់ ២៨ថ្ងៃបន្ថែម ដើម្បីដឹងពីថ្ងៃនៃការមករដូវក្នុងខែបន្ទាប់។



ចំណាំ៖ ចន្លោះពី២១ទៅ៣៥ថ្ងៃ ក្មេងស្រីអាចមានរដូវម្តង ដូច្នេះការគណនាតាមដានក្នុងរយៈពេល២-៣ខែ ដើម្បីអាចកំណត់បានថាវដ្តរដូវរបស់គេមានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ។



អំពីរដូវរបស់ក្មេងស្រី

ប្រឹក្សាបន្ថែម៖

010 812 812

089 333 990

088 7 107 107

រដូវ គឺជាការហូរឈាមលាយឡំនឹងការបេះធ្លាក់នៃស្រទាប់ស្មើងៗខាងក្នុងនៃស្បូន ដែលហូរចេញតាមទ្វារមាស ប្រសិនបើគ្មានការបង្កកំណើត។ ក្មេងស្រីអាចធ្លាក់ឈាមរដូវដំបូងនៅអាយុពី៩ឆ្នាំ ទៅ១៧ឆ្នាំ និងអាចអស់រដូវវិញនៅចន្លោះ ៤៥-៥៥ឆ្នាំ ទៅតាមស្ថានភាពសុខភាពមនុស្សម្នាក់ៗ។



ការមករដូវមានន័យថា ក្មេងស្រីចាប់ផ្តើមពេញវ័យ និងអាចមានផ្ទៃពោះបាន ប្រសិនបើមានការរួមភេទជាមួយបុរសដោយមិនបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើត។ តែនេះមិនមែនមានន័យថាក្មេងស្រីគួរតែមានផ្ទៃពោះវ័យក្មេងឡើយ ព្រោះក្មេងស្រីមិនទាន់បានបញ្ចប់ការលូតលាស់នៅឡើយ ដែលអាចប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ក្មេងស្រីនិងទារកក្នុងផ្ទៃ។

ជាធម្មតា រដូវរដូវមានរយៈពេលចន្លោះពី២១ថ្ងៃ ទៅ៣៥ថ្ងៃម្តង ឬជាមធ្យម២៨ថ្ងៃ ហើយជាទូទៅការធ្លាក់ឈាមរដូវអាចមានរយៈពេលពី៣ទៅ៥ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ។ ឈាមរដូវធ្លាក់ច្រើននៅថ្ងៃទី១ ឬទី២ ហើយបន្ទាប់មកកាន់តែតិចទៅៗរហូតដល់អស់រដូវ។ ប្រសិនបើក្មេងស្រីបាត់រដូវ នោះអាចមានន័យថានាងមានផ្ទៃពោះ បើនាងបានរួមភេទមិនបានការពារ។ ប៉ុន្តែ ករណីមួយចំនួនក៏ធ្វើឱ្យក្មេងស្រីមានការប្រែប្រួល ឬបាត់រដូវផងដែរ ដូចជាពេលនាងមានអារម្មណ៍តានតឹង ធុញចប់ ស្តម្ភពេក របបអាហារ និងធ្វើដំណើរច្រើនពេក។




www.rhac.org.kh



RHAC Social Page




RHAC វីតី




RHAC

របៀបប្រើប្រាស់សំឡីអនាម័យ៖




ហែកកញ្ចប់សំឡីអនាម័យនិងដក
យកបន្ទះសំឡីមួយសម្រាប់
ប្រើប្រាស់

បកក្រដាសដែលបិទលើផ្នែកស្អិត
ខាងក្រោយនៃសំឡីអនាម័យ រួចបិទ
ជាប់នឹងខោទ្រនាប់



3



បកក្រដាសដែលបិទលើស្លាបនៃសំឡី
អនាម័យ រួចបិទទៅនឹងផ្នែកខាងក្រោមនៃ
ខោទ្រនាប់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការលេចធ្លាយ និង
ធានាឱ្យវានៅជាប់ក្នុងទីតាំងបានល្អជាងមុន

សំឡីអនាម័យដែលប្រើប្រាស់រួច ត្រូវ
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលបោះចោល
ដើម្បីការពារការជុំក្លិនមិនល្អ និងបង្ក
ឱ្យមេរោគសាយភាយ។



សញ្ញាមួយចំនួនដែលអ្នកគួរតែទៅ ពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ

ប្រឹក្សាបន្ថែម៖

010 812 812

089 333 990

088 7 107 107

ពេលខ្លះការមករដូវអាចមានភាពមិនប្រក្រតី និងមានការប្រែប្រួល។
អ្នកគួរតែទៅប្រឹក្សា និងស្វែងរកជំនួយនៅពេលដែលមានភាពខុស
ប្រក្រតីកើតមានដូចជា៖



ខួបឈាមរដូវខ្លីជាង២១ថ្ងៃ ឬលើសពី ៣៥ថ្ងៃ

រយៈពេលធ្លាក់ឈាមរដូវលើសពី ៧ថ្ងៃ

ធ្លាក់ឈាមរដូវមិនទៀងទាត់ ឬរាំងរដូវ

បរិមាណឈាមរដូវមកតិចពេក ឬច្រើនពេកខុសប្រក្រតី

ឈឺចាប់ក្នុងពោះខ្លាំងពេលមករដូវ

មានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងខ្លាំង

ឆាប់មករដូវពេក មុនអាយុ៩ឆ្នាំ
ឬក្រោយមករដូវពេកលើសអាយុ១៨ឆ្នាំ។



កន្លែងដែលក្មេងស្រីអាចរកស្វែងជំនួយ



ម្តាយឪពុក សាច់ញាតិ មិត្តភក្តិ គ្រូឬមនុស្សដែលក្មេងស្រី

ស្វែងរកការប្រឹក្សាតាមអនឡាញ ឬប្រឹក្សាតាម

មណ្ឌលសុខភាព ឬមន្ទីរពេទ្យ

គ្លីនិកភ័ក់