УЧЕБНОЕПОСОБИЕ · ОСЕНЬ2 0 2 6

Math I

Недели 1–4

Все вопросы и все формулы из каждого файла курса и назначенных разделов учебника — числовые системы, нотация, комплексные числа; функции; пределы и законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотика и символы Ландау — каждая задача с полным пошаговым решением. Составлено для самостоятельной работы и подготовки к Test 1

Ташкентский технологический университет · Осень 2026

Источники: конспекты курса, лекции, *ISA*, практические занятия; OpenStax Calculus 1

БАНКВОПРОСОВ · КАТАЛОГФОРМУЛ · ПОЛНЫЕРЕШЕНИЯ · ОСЕНЬ 2026

Содержание

1 Карта курса и как пользоваться документом 2

2 Неделя 1 — Числовые системы, нотация, комплексные числа (Math I) 2

2.1 Math I: Каталог формул недели 1 2

2.2 Math I: Практическое занятие недели 1 — вопросы и полные решения 5

3 Неделя 2 — Функции (Math I) 12

3.1 Math I: Каталог формул недели 2 12

3.2 Math I: Практическое занятие недели 2 (функции) — вопросы и полные решения 13

3.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 2 — вопросы и полные решения 16

4 Неделя 3 — Пределы (Math I) 18

4.1 Math I: Каталог формул недели 3 18

4.2 Math I: ISA недели 3 — вопросы и полные решения 19

4.3 Math I: Практическое занятие недели 3 (инженерные пределы) — вопросы и полные решения 21

4.4 Math I: назначенные упражнения учебника (OpenStax §2.2, пункты 46–54 и 60–64) 23

5 Неделя 4 — Пределы II: законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотика, символы Ландау (Math I) 24

5.1 Каталог формул недели 4 24

5.2 OpenStax §2.3, контрольные задачи 2.11–2.20 — вопросы и полные решения 27

5.3 OpenStax §2.3, упражнения 83–130 — вопросы и полные решения . . 28

5.4 Разобранные примеры конспекта недели 4 — вопросы и полные решения 34

6 Дополнения из учебников — дополнительные упражнения обязательного чтения с полными решениями 36

6.1 OpenStax §1.2 (Базовые классы функций) — избранные упражнения решены 36

6.2 OpenStax §1.5 (Экспоненциальные и логарифмические функции) — избранные упражнения решены 37

6.3 OpenStax §2.2 — табличные упражнения (42–45) решены 39

6.1 OpenStax §1.2 Базовые классы функций) — избранные упражнения решены 36
6.2 OpenStax §1.5 Экспоненциальные и логарифмические функции) — избранные упражнения решены 37
6.3 OpenStax §2.2 — табличные упражнения (42–45) решены 39

1. Карта курса и как пользоваться документом

Настоящий документ — полное самостоятельное пособие к первым четырём неделям курса Math I первого семестра осень 2026). Он составлен вручную по каждому релевантному источнику из папки course-files/ репозитория курса: недельные конспекты (Notes), презентации лекций, листы упражнений практических занятий, задания для самостоятельной работы (ISA) и назначенные разделы учебника OpenStax Calculus Volume 1. Задачи воспроизведены дословно; решения — полные, по шагам, с проверками.

Неделя	Math I
1	Числовые множества $N \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R \subseteq C$; позиционные системы; научная и инженерная нотация; комплексные числа
2	Функции: классы, область определения/значений, симметрия, композиция, обратные функции; экспоненциальные и логарифмические функции (§1.2, §1.5)
3	Пределы: интуитивное понятие, односторонние и бесконечные пределы, асимптоты, точное ε–δ определение (§2.2, §2.5)
4	Пределы II: законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, теорема о двух милиционерах, асимптотическая эквивалентность, символы Ландау O и o(§2.3)

Нотация. Степени и индексы записаны через ^{} и _: $x^2, a_{11}, f^{(-1)}$. Множества записаны стандартно: $N \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R \subseteq C$. Производная обозначается $f'(x)$ или dy/dx.

2. Неделя 1 — Числовые системы, нотация, комплексные числа (Math I)

2.1. Math I: Каталог формул недели 1

2.1.1 Числовые множества и позиционные системы

Вложение стандартных числовых множеств — первый структурный факт курса, и каждое последующее упражнение на классификацию на него опирается. Рациональные числа — это в точности дроби с целыми числителем и знаменателем, а иррациональные числа — действительные числа, не являющиеся рациональными. $N \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R \subseteq C, R\ Q = \{x \in R : x/ \in Q\}$ иррациональные)$(1) q \in Q \Longleftrightarrow q = a$

$a \in Z, b \in Z, b \neq 0, d(a,b) = |a-b|$ расстояние в $R)(2)$

Позиционная система счисления с основанием b записывает число через степени основания; одно и то же число допускает много записей, но его значение не зависит от представления. Перевод между основаниями опирается на разложение ниже и на последовательное деление для обратного направления).

$$X_n(a_n a_{n-1}...a_1 a_0)_b = \Sigma \frac{n}{k=0} a_k b^k,$$
$$0 \leq a_k \leq b-1, (3)$$

$13_{10} = 1101_2 = 15_8 = D_{16}, A = 10, B = 11, \ldots, F = 15(hex-$цифры). (4)

Римские цифры непозиционны: $I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100$, поэтому $13 = XIII$; арифметика в таких системах непрактична, поэтому компьютеры используют двоичную систему: электроника надёжно различает два состояния низкое/высокое, выкл/вкл, 0/1).

2.1.2 Научная и инженерная нотация

Научная нотация выделяет порядок величины числа в коэффициент с одной ненулевой цифрой перед запятой и степень десяти; инженерная нотация требует, чтобы показатель был кратен трём, чтобы он стыковался с приставкой СИ.

научная: $z = a \times 10^n, 1 \leq |a| < 10, n \in Z, (5)$ инженерная: $z = a \times 10^3 k, 1 \leq |a| < 1000, k \in Z, (6)$

$$a \times 10^{m-n} = a \times 10^{m-n}(7)$$

$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = ab \times 10^{m+n}$, $b \times 10^{m-n}$, (7)

$$(a \times 10^n)^m = a^m \times 10^{nm}$$

слож./вычит.: сначала к общей степени десяти (8) Приставки СИ, используемые весь семестр:

Приставка	Символ	Степень
тера	T	10^{12}
гига	G	10^9
мега	M	10^6
кило	k	10^3
милли	m	10^{-3}
микро	μ	10^{-6}
нано	n	10^{-9}
пико	p	10^{-12}
фемто	f	10^{-15}

Регистр важен: 5 mW $= 5 \times 10^{-3}$ Вт, но $5MW = 5 \times 10^6$ Вт. Справочные значения, используемые в течение курса: $c = 2.99792458 \times 10^8$ м/с; $e = 1.602176634 \times 10^{-19}$ Кл; $N_A = 6.02214076 \times 10^{23}$ моль$^{-1}$; $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ Дж·с; 101325 Па $= 101.325$ кПа.

2.1.3 Комплексные числа

Неделя 1 завершается комплексными числами, которые возникают потому, что уравнение $x^2 + 1 = 0$ не имеет действительных решений. Мнимая единица, правило равенства, четыре арифметических действия и сопряжённое число — рабочие инструменты. $\surd$

$$i = \sqrt{-}1, i^2 = -1, z = a + bi, Re(z) = a, Im(z) = b,$$
$$(9)i^{n+4} = i^n (i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i),$$

$a + bi = c + di \Longleftrightarrow a = c$ и $b = d, (10)$

$$(z_1 + z_2) = (a + c) + (b + d)i,$$
$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i, (11)(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i,$$

$$(z_1)/(z_2) = (z_1 overline z_2)/(|z_2|^2)(z_2 \neq 0),$$
$$(12)\bar{z} = a - bi, z + \bar{z} = 2Re(z), z - \bar{z} = 2iIm(z), |z|^2 = a^2 +$$

$$b^2 = z\bar{z}, (13)|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, |z_1 z_2| = |z_1||z_2|,$$
$$|(z_1)/(z_2)| = (|z_1|)/(|z_2|), (14)|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

неравенство треугольника) (15)

$\tan\theta = bargz = \theta + 2k\pi, k \in Z$; $\mathrm{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$ гл. значение, a квадрант!)$(16)z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^i$, $r = |z|$, $a = r\cos\theta$, $b = r\sin\theta$, $(17)e^i = \cos\theta + i\sin\theta e^i + 1 = 0$, (Эйлер), (18)

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \cdot e^{i(_1 + \theta_2)},$$
$$\frac{z_1}{z_2} = (\frac{r_1}{r_2}) \cdot e^{i(_1 - \theta_2)}, (18)$$

(19)

$$z_1 z_2 \cdots z_n = r_1 r_2 \cdots r_n \cdot e^{i(_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)},$$
$$z^2 = r^2 \cdot e^{i2}(19)$$

$\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$ формула Муавра), (20)

$$z_k = r^{1/n}(\cos((\theta + 2k\pi)/(n)) + isin((\theta + 2k\pi)/(n))), k \in Z$$

$\cos + i\sin, k = 0, \ldots, n - 1, (21)nn$

$z^n = 1 \Rightarrow z_k = e^{2ik/n}, k = 0, \ldots, n - 1(n-$е корни из 1), (22)

$(22)_{\surd}$

$$z = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/(2a)$$

квадратная формула, верна и над C). (23) 2a Корни уравнения $z^n = w = re^i$ задаются формулой (21); n-е корни из единицы образуют правильный n-угольник на единичной окружности. Невещественные корни многочленов с действительными коэффициентами встречаются сопряжёнными парами, а по основной теореме алгебры многочлен степени n имеет в C ровно n корней с учётом кратности.

2.2. Math I: Практическое занятие недели 1 — вопросы и полные решения

1. Классифицируйте каждую десятичную дробь как конечную, периодическую или непериодическую и укажите, рационально ли соответствующее число: (1) 0.375; (2) 0.272727 . . .; (3) 1.101001000100001 . . .; (4) 3.14159265 . . .; (5) 0.123123123 . . .

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 1]

Решение. (1) 0.375 конечно, значит рационально: $0.375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$. (2) Блок 27 повторяется бесконечно, значит рационально; для чистого периодического блока ab $= \frac{ab}{99}$, поэтому $0.27 = 27_{99} = 3_{11}$. (3) Промежутки между последовательными единицами растут (1, 2, 3, . . . нулей), поэтому дробь никогда не станет периодической и не оборвётся: число иррационально. (4) Конечное число показанных цифр с многоточием не определяет число; если имелось в виду $\pi = 3.14159265\ldots$, оно бесконечно и непериодично, значит иррационально. (5) Блок 123 повторяется, значит рационально: $0.123 = \frac{123}{999} = \frac{41}{333}$. Принцип: конечные или в конечном счёте периодические десятичные дроби — это в точности рациональные числа.

2. Запишите каждое множество в интервальной нотации и изобразите на числовой прямой: (1) $\{x \in R : -3 \le x < 4\}$; (2) $\{x \in R : x = 3\}$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 2]

Решение. (1) Конец −3 включён квадратная скобка), 4 исключён круглая): [−3, 4); на прямой — закрашенная точка в −3 и выколотая в 4, участок между ними выделен. (2) Все действительные, кроме 3: $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$; на прямой закрашена вся ось с выколотой точкой 3. Бесконечность никогда не включается, поэтому всегда круглая скобка.

3. Запишите каждый интервал в виде неравенств: a. [−2, 5); b. $(-\infty, 4]$; c.$(1, \infty)$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 3]

Решение. a. $-2 \le x < 5$ левый конец включён, правый нет). b. $x \le 4$ неограниченно влево, правый конец включён). c. $x > 1$ строго больше, так как круглая скобка исключает 1). $\surd$

4. Классифицируйте как рациональное или иррациональное: a. $\sqrt{3}$; b. $\sqrt{25}$; c. $\sqrt{50}$; i. $(1 + \sqrt{5})(1 - \sqrt{5})$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 4]

Решение. a. $\sqrt{3}$ — не полный квадрат, значит $\sqrt{3}$ иррационально. b. $\sqrt{25} = 5 \in Z \subseteq Q$, рационально. c. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$; поскольку $\sqrt{2}$ иррационально, $5\sqrt{2}$ иррационально. i. Раскрываем: $(1+\sqrt{5})(1-\sqrt{5}) = 1-5 = -4$, рационально. Произведение сопряжённых всегда уничтожает радикал.

5. Даны $z_1 = 3+$ 2i и $z_2 = 1-$ 4i; вычислите $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$, z_1/z_2, записывая каждый ответ в виде $a+$ bi.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 5]

Решение. Сложение и вычитание действуют на действительную и мнимую части отдельно: $z_1 + z_2 = (3 + 1) + (2 - 4)i = 4-$ 2i; $z_1 - z_2 = (3 - 1) + (2 + 4)i = 2+$6i. В

произведении используем $i^2 = -1$ и правило $(a+bi)(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i$: $z_1 z_2 = (3\cdot 1 - 2\cdot(-4)) + (3\cdot(-4) + 2\cdot 1)i = (3+8) + (-12+2)i = 11-$ 10i. В частном умножаем числитель и знаменатель на сопряжённое к знаменателю:

$$(z_1)/(z_2) = ((3+2i)(1+4i))/((1-4i)(1+4i))$$
$$(3+12i+2i+8i^2)/(1+16) = ((3-8)+(12+$$

$$2)i)/17 = (-5+14i)/17 = -\frac{5}{17} + (\frac{14}{17})i.$$

6. Для чисел $3+$ **4i,** $-2+$ **5i, 6i,** -7 **найдите сопряжённое и модуль; проверьте** $z\bar{z} = |z|^2$**.** $\sqrt{a^2}+b^2$**.** $3+$ **4i:** $z = 3-$ **4i,** $|z| = 5$**,**

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 6]

Решение. Для $z = a+$ bi имеем $z = a-$ bi и $|z| =$

$$\sqrt{-}2+5i : z = -2-5i, |z| = 4+25 =$$

и $(3-4i)(3+4i) = 9+16 = 25 = 5^2$. 29, и

$$6i : \bar{z} = -6i, |z| = 6, (-6i)(6i) = -36i^2 = 36.$$

$(-2-5i)(-2+5i) = 4+25 = 29$. -7: $z = -7$ действительные числа сопряжены сами себе), $|z| = 7, (-7)(-7) = 49$. Все четыре проверки сходятся.

1

7. Выразите $1+i$ **в виде** $a+$ **bi.**

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 7]

Решение. Умножаем на сопряжённое к знаменателю:

$$1/(1+i) = (1-i)/((1+i)(1-i)) = (1-i)/2 = \frac{1}{2} - i/2$$

8. Решите над C**:** $x^2+9=0$**.**

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 8]

Решение. Перенося, получаем $x^2 = -9$, значит $x = \pm\sqrt{-}9 = \pm$3i. Оба решения — невещественные комплексные числа; действительных решений нет, потому что квадрат в R никогда не отрицателен.

9. Для $z = 2+$ **3i на комплексной плоскости определите действительную часть, мнимую часть, модуль и квадрант. Что меняется для 2 − 3i?**

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 9]

Решение. Точка (2, 3) лежит в первом квадранте: $Re(z) = 2, Im(z) = 3, \sqrt{}$

$$|z| = \sqrt{2^2+3^2} = \sqrt{13}$$

$|z| = 13$. Для $z = 2-$ 3i точка $(2, -3)$ — зеркальное отражение относительно действительной оси: действительная часть и модуль не меняются, мнимая часть меняет знак, и точка переходит в четвёртый квадрант.

10. Запишите $1+i$ **в тригонометрической форме** $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ **и показательной форме** $z = re^i, \theta$ **в радианах.**

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 10]

Решение. Здесь $r = |1+i| = \sqrt{1}+1 = \sqrt{2}$, обе координаты положительны, поэтому $\theta = arctan(\frac{1}{1}) = \pi/4$. Итак, $1+i = \sqrt{2}\cdot(\cos(\pi/4) + i\cdot\sin(\pi/4)) = \sqrt{2}\cdot e^{i/4}$.

11. С помощью формулы Муавра $[r(\cos\theta + i\sin\theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i\sin\theta)$ **вычислите** $(\sqrt{3}+i)^4$**; проверьте алгебраически.**

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 11]

Решение. Сначала переводим: $r = |3+i| = \sqrt{3+1} = 2$, $\theta = arctan(1/\sqrt{3}) = \pi/6$. По Муавру,

$$(\sqrt{3}+i)^4 = 2^4(\cos(4arctan(1/\sqrt{3})) + i\sin(4arctan(1/\sqrt{3})))$$
$$16(\cos(4\pi/6) + i\sin(4\pi/6)) =$$

$$16(\cos(2\pi/3) + i\sin(2\pi/3)) = 16(-\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3}{2}}i) = -8 + 8\sqrt{3}i.$$

Проверка алгеброй:

$$(\sqrt{3}+i)^2 = 3 + 2\sqrt{3}i + i^2 = 2 + 2\sqrt{3}i;$$

возводя снова в квадрат,

$$(2+2\sqrt{3}i)^2 = 4 + 8\sqrt{3}i + 12i^2 = -8 + 8\sqrt{3}i.$$

Оба способа согласуются.

12. Найдите все решения $z^3 = -8$ **и изобразите их на комплексной плоскости.**

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 12]

Решение. Пишем $-8 = 8e^{i(+2k)}$. Кубические корни имеют модуль $8^{1/3} = 2$ и аргументы $(\pi + 2k\pi)/3, k = 0, 1, 2$.

$$z_0 = 2e^{i/3} = 1 + \sqrt{3}i,$$
$$z_1 = 2e^{i} = -2, z_2 = 2e^{i5/3} = 1 - \sqrt{3}i.$$

Геометрически это три равноудалённые точки на окружности радиуса 2 с центром в начале координат углы $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$); отметим, что $z_1 = -2$ — единственное действительное решение, что согласуется с $(-2)^3 = -8$.

13. Для каждого числа укажите наименьшее множество из N, Z, Q, R, C**, которому оно принадлежит:** $\sqrt{0}$, -7, $\frac{5}{8}$, 3.25, 16, 7, $\sqrt{-9}$, π, π^2, i, $4-$ **3i.**

[Источник: Неделя $1, ISA$, задание 2]

Решение. $0 \in N$ по соглашению курса) $\Rightarrow$ наименьшее множество N. $-7 \in Z$. 5/8 и $3.25 = \frac{13}{4}$ лежат в Q конечные десятичные дроби). $\sqrt{16} = 4 \in N$. $\sqrt{7}$ иррационально (7 — не полный квадрат) $\Rightarrow R$. $-\sqrt{9} = -3 \in Z$. π и π^2 иррациональны $\Rightarrow R$ возведение в квадрат не делает иррациональное рациональным). i и $4 - 3$i невещественны $\Rightarrow$ только C.

14. Верно или неверно? Исправьте каждое неверное утверждение: $(1)N \subseteq Z$**;** $(2)Z \subseteq Q$**;** $(3)R \subseteq Q$**;** $(4)Q \subseteq R$**;** $(5)R \subseteq C$**; (6) всякое целое число натуральное;**

(7) всякое рациональное число действительно; (8) всякое комплексное число действительно; (9) всякое действительное число можно записать как комплексное; (10) число не может быть одновременно рациональным и действительным. $\surd$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 3]

Решение. (1) Верно. (2) Верно. (3) Неверно — например, $2 \in R$, но $\sqrt{2}/ \in Q$; правильное включение $Q \subseteq R$. (4) Верно. (5) Верно. (6) Неверно — отрицательные целые, например -3, не натуральные. (7) Верно. (8) Неверно — например, i комплексное, но не действительное. (9) Верно — $a = a+$ 0i. (10) Неверно — каждое рациональное число действительно утверждение (4)), поэтому рациональные и то и другое.

15. Нарисуйте диаграмму вложенных множеств $N \subset Z \subset Q \subset R \subset C$ **и разместите** $\sqrt{5}, -2, \frac{2}{3}, 2, \pi, -$**4i,** $3+$ **2i в правильных областях.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 4]

Решение. Рисуем пять вложенных овалов с подписями N внутренний) до C внешний). Размещение: $5 \in N$; $-2 \in Z \quad N$; $\frac{2}{3} \in Q \quad Z$; $\sqrt{2}$ и $\pi \in R \quad Q$; $-$4i и $3+$ 2i $\in C \quad R$. Диаграмма наглядно показывает, что каждое новое множество лишь добавляет числа, ничего не удаляя.

16. Расположите в порядке возрастания: $-5, -2, -\frac{3}{2}, 0, 2, \frac{3}{2}, _{\overline{2}}$**; обоснуйте неочевидные сравнения.** $\surd$

$$(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9} < (\pi/2)^2$$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 5]

Решение. Квадраты дают порядок положительных величин: $\sqrt{\frac{3}{4}} = (\sqrt{3})/2 \approx 0.866$; так как $\pi/2 \approx 1.5708$ и $\frac{3}{2} = 1.5$, имеем $\frac{3}{2} < \pi/2$. Для отрицательных порядок обратный: $-\sqrt{5} \approx -2.236 < -2 < -\frac{3}{2}$. Итого: $-\sqrt{5} < -2 < -\frac{3}{2} < (\sqrt{3})/2 < \frac{3}{2} < \pi/2$.

$$-\sqrt{5} < -2 < -\frac{3}{2} < 0 < 2 < 3 < \pi/2$$

17. Запишите каждое множество в интервальной нотации: $(1) - 3 \leq x < 4$**;** $(2) x > 2$**;** $(3) x \leq -1$**;** $(4) -2 < x \leq 5$**;** $(5) \not= 3$**; затем изобразите каждое на прямой.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 6]

Решение. (1) $[-3, 4)$. $(2)(2, \infty)$. $(3)(-\infty, -1]$.$(4)(-2, 5]$.$(5)(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$. На прямой: закрашенные точки там, где конец включён $(\leq, \geq)$, выколотые там, где нет $(<, >)$, круглые скобки у бесконечностей и два луча для объединения в (5).

18. Запишите каждый интервал в виде неравенств: a**.** $[-2, 5)$**;** b**.** $(-\infty, 4]$; $c.(1, \infty)$; $d.(-3, 0] \cup [2, 6)$; $e.R \; [-1, 1]$.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 7]

Решение. a. $-2 \leq x < 5$. b. $x \leq 4$. c. $x > 1$. d. $-3 < x \leq 0$ или $2 \leq x < 6$. e. $x < -1$ или $x > 1$; эквивалентно $|x| > 1$. $\surd$

19. С $d(a, b) = |a - b|$**: вычислите** $d(3, 8), d(-2, 5), d(-4, -9), d(2, 8)$**; проверьте** $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$ **при** $a = -3, b = 2, c = 7$**.**

$$d(2, 8) = |2 - 82| = 2$$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 8]

Решение. $d(3,8)=|3-8|=5$; $d(-2,5)=7$; $d(-4,-9)=5$; $d(2,8)=|2-22|=2$. Проверка неравенства треугольника: $d(-3,7)=10, d(-3,2)+d(2,7)=5+5=10$, и действительно $10\le 10$ равенство, так как точки лежат на одной прямой по порядку). Формула $|a-b|$ — одномерный случай нормы из (28).

20. Определите, рационально или иррационально каждое число; обоснуйте: a**.** $\sqrt{49}$**;** b**.** $\sqrt{18}$**;** c**.** $\sqrt{3}+\sqrt{2}$**;** d**.** $\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}$**;** e**.** $\sqrt{2}+\sqrt{8}$**;** f**.** $(\sqrt{3})^2$**;** g**.** $(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})$**;** h**.** $\sqrt{12}$**.**

[Источник: Неделя $1, ISA$, задание 9]

Решение. a. $\sqrt{49}=7$ — рационально. b. $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ — иррационально. c. $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ — иррационально. d. $\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}=\sqrt{10}$ — иррационально. e. $\sqrt{2}+\sqrt{8}=\sqrt{2}+2\sqrt{2}=3\sqrt{2}$ — иррационально. f. $(\sqrt{3})^2=3$ — рационально. g. $(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})=1-2=-1$ — рационально произведение сопряжённых). h. $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ — иррационально. Практическое правило: упрощение раскрывает природу; произведения сопряжённых вида $(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b})$ всегда рациональны.

21. Даны $z_1=3+$ **2i,** $z_2=1-$ **4i; вычислите** z_1+z_2, z_1-z_2, z_1z_2, z_1/z_2**.**

[Источник: Неделя $1, ISA$, задание 10]

Решение. Совпадает с упражнением 5 практического занятия выше: $z_1+z_2=4-$ 2i, $z_1-z_2=2+$ 6i, $z_1z_2=11-$ 10i, и $z^1=-175+1417i$.

$$z_2=1-4i$$

22. Вычислите $i^2, i^3, i^4, i^5, i^{18}, i^{27}, i^{100}$**; опишите повторяющийся узор и метод, основанный на делении показателя на 4.**

[Источник: Неделя $1, ISA$, задание 11]

Решение. $i^2=-1$; $i^3=i^2i=-i$; $i^4=(i^2)^2=1$; $i^5=i$. Степени цикличны с периодом 4: $1, i, -1, -i, \ldots$ Для большого показателя делим на 4 с остатком r: $i^n=i^r$. Тогда $18=4\cdot4+2\Rightarrow i^{18}=i^2=-1$; $27=4\cdot6+3\Rightarrow i^{27}=i^3=-i$; $100=4\cdot25\Rightarrow i^{100}=i^0=1$.

23. Для $3+$ **4i,** $-2+$ **5i, 6i, −7: найдите сопряжённое и модуль, проверьте zz** $=|z|^2$**.**

[Источник: Неделя $1, ISA$, задание 12]

Решение. Те же вычисления, что в упражнении 6 практического занятия: $\sqrt{}$ сопряжённые $3-$ 4i, $-2-$ 5i, $-$6i, -7; модули 5, 29, 6, 7; в каждом случае zz $=a^2+b^2=|z|^2$ выполняется точно.

24. Выразите в виде $a+$ **bi:** a**.** $1/(1+i)$**;** b**.** $3+2/(2-i)$**;** c**.** $1+3/(4-i)$**;** d**.** $5/(2-i)$**.**

[Источник: Неделя $1, ISA$, задание 13]

Решение. В каждом случае умножаем числитель и знаменатель на сопряжённое к знаменателю. a.

$$(1+i)/(1-i)=(1+i)^2/((1-i)(1+i))=(1+2i+i^2)/(1-i^2)$$
$$(1+2i-1)/(1-(-1))=(2i)/2=i$$

$=i$. b.

$$(3+2i)/(2-i)=(3+2i)(2+i)/((2-i)(2+i))=(6+3i+4i+2i^2)/(4-i^2)$$
$$(6+7i-2)/(4-(-1))=(4+7i)/5$$

$=\frac{4}{5}+\frac{7}{5}i$. c.

$$(1+3i)/(4-i) = (1+3i)(4+i)/((4-i)(4+i)) = (4+i+12i+3i^2)/(16-i^2)$$
$$(4+13i-3)/(16-(-1)) = (1+13i)/17$$

$= \frac{1}{17} + \frac{13}{17}i$. *d.*

$$5i/(2-i) = 5i(2+i)/((2-i)(2+i)) = (10i+5i^2)/(4-i^2)$$
$$(10i-5)/(4-(-1)) = (-5+10i)/5$$

= -1+ 2i.

25. Решите над C, указав, какие решения действительны: *a.* $x^2+9=0$**;** *b.* x^2- **4x** $+13=0$**;** *c.* **2x**$^2+$ **4x** $+10=0$**;** *d.* $x^4-16=0$**.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 14]

Решение. *a.* $x = \pm$3i невещественные). *b.* Дискриминант $\Delta = (-4)^2 - 4\cdot 13 = 16-52 = -36$, $\sqrt{\Delta}$ = 6i; $x = (4 \pm 6i)/2 = 2\pm$ 3i невещественные). *c.* Делим на 2:

$$x = (-4 \pm \sqrt{4^2 - 4\cdot 2\cdot 10})/(2\cdot 2) = (-4 \pm \sqrt{-64})/4 = (-4 \pm 8i)/4 = -1 \pm 2i$$

x^2+ 2x $+5=0$: $\Delta = 4-20 = -16$, $\sqrt{\Delta}$ = 4i; $x = (-2 \pm 4i)/2 = -1\pm$ 2i невещественные).

d. $x^4 = 16$ даёт действительные решения $x = \pm 2$; над C полное множество — четыре корня четвёртой степени из 16: 2, −2, 2i, −2i все решения $(x^2-4)(x^2+4)=0$).

26. Для $2+$**3i,** $-1+$**4i, −3 − 2i,** $4-i$**: найдите действительную часть, мнимую часть, модуль, квадрант.** $\surd$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 15]

Решение. $2+$ 3i: (2, 3), модуль 13, квадрант I. $-1+$ 4i: (−1, 4), модуль 17, $\surd$ квадрант II. −3 − 2i: (−3, −2), модуль 13, квадрант III. $4-i$: (4, −1), модуль 17, квадрант IV. Заметьте, что модули разбиваются на пары, так как сопряжение сохраняет a^2+b^2.

27. Запишите в тригонометрической и показательной формах (θ **в радианах):** $(1)\sqrt{1}+i$**;** $(2)-1+i$**;** $(3)-3-i$**; (4) 2i; (5) −4.** $\surd$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 16]

Решение. $(1) r = 2, \theta = \pi/4$: 2e$^{i/4}$. $(2) r = 2$, квадрант II: $\theta = 3\pi/4$: 2e$^{i3/4}$. $(3) r = \sqrt{3+1} = 2$, квадрант III: опорный угол $arctan(1/\sqrt{3}) = \pi/6$, значит $\theta = \pi + \pi/6 = 7\pi/6$: 2e$^{i7/6}$. $(4) r = 2, \theta = \pi/2$: 2e$^{i/2}$. $(5) r = 4, \theta = \pi$: 4e^{i}. Каждый угол берётся из $\tan\theta = b/a$ с поправкой на квадрант, как и предупреждает (16). $\surd$

28. С помощью формулы Муавра вычислите $(1)(1+i)^6$**;** $(2)(3+i)^4$**;** $(3)(-1+3i)^5$**; один результат проверьте алгебраически.** $\surd$

$$(1+i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{i6/4} = 8e^{i3/2} = 8(0-i) = -8i.$$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 17]

Решение. $(1) 1+i = \sqrt{2}e^{i/4}$. Тогда $(1+i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{i6/4} = 8e^{i3/2} = 8(0-i) = -$8i. (2) Из упражнения 11 практического занятия: $(3+i)^4 =$ -8 + 8$\sqrt{3}i$. $(3) z = -1+$ 3i: модуль $|z| = \sqrt{1+3} = 2$; квадрант II, опорный угол $\pi/3$, значит $\theta = 2\pi/3$: $z =$ 2e$^{i2/3}$. Тогда $z^5 = 2^5 e^{i10/3} =$ 32e$^{i(10/3-2)} =$ 32e$^{i4/3} = 32(-\frac{1}{2} - i\sqrt{3}/2) = -16 - 16\sqrt{3}i$. Проверка (1) алгеброй: $(1+i)^2 =$ 2i, $(1+i)^4 = (2i)^2 = -4$, $(1+i)^6 = -4\cdot$ 2i $= -$8i. Совпадает.

29. Найдите все решения и изобразите их на комплексной плоскости: a**.** $z^3 = 1$**;** b**.** $z^4 = 1$**;** c**.** $z^3 = -8$**. Объясните, почему корни** n**-й степени равноудалены по окружности.** $\surd$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 18]

Решение. a. По (22): $z_k = e^{2ik/3}, k = 0, 1, 2$: 1, $-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$, $-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$. b. $z_k = e^{2ik/4}$: $1, i, -1, -i$. c. Из упражнения 12 практического занятия: $\sqrt{1}$+ 3i, −2, 1 − 3i. Во всех случаях корни имеют одинаковый модуль $r^{1/n}$ значит, лежат на одной окружности), а их аргументы отличаются ровно на $\frac{2}{n}$ полный оборот 2π разбит на n равных дуг) — именно поэтому они образуют вершины правильного n-угольника.

30. Величина электрического заряда $e = 0.000000000000000000001602176634$ **Кл. Запишите её в научной и в инженерной нотации.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 19]

Решение. Считаем 18 разрядов, чтобы первая ненулевая цифра оказалась перед запятой: $e = 1.602176634 \times 10^{-19}$ Кл научная). В инженерной нотации показатель должен быть кратен 3, поэтому сдвигаем на один разряд: $e = 160.2176634 \times 10^{-21}$ Кл $= 160.2176634$ зКл зептокулоны); на практике пишут $160.2176634 \times 10^{-21}$ Кл, поскольку из общих приставок СИ ниже 10^{-24} есть только зепто (10^{-21}).

31. Заполните таблицу приставок СИ: степени 10^{12}, 10^{6}, 10^{3}, 10^{-6}, 10^{-9}, 10^{-12} **с приставками/обозначениями.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 20]

Решение. 10^{12} тера (T); 10^{6} мега (M); 10^{3} кило (k); 10^{-6} микро (µ); 10^{-9} нано (n); 10^{-12} пико (p). Вместе с данными гига (G), милли (m), фемто (f), атто (a) эта таблица образует полную лестницу СИ.

32. Конспект недели 1, часть 2, аудиторные задачи: (1) запишите 0.00000824 в научной и инженерной нотации; (2) запишите 7.35×10^{8} **Гц в инженерной нотации; (3) запишите 0.0047 Ф с приставкой СИ.**

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 2]

Решение. $(1) 0.00000824 = 8.24 \times 10^{-6}$ научная); так как −6 кратно 3, это уже инженерная нотация, например 8.24 µA, если единица — ампер. $(2) 10^{8}$ не кратно 3; переписываем $7.35 \times 10^{8} = 735 \times 10^{6} = 735$ МГц. $(3) 0.0047 = 4.7 \times 10^{-3} = 4.7$ мФ.

33. Конспект недели 1, часть 3, аудиторные задачи: (1) нарисуйте диаграмму вложенных множеств $N \subset Z \subset Q \subset R \subset C$ **и разместите** $2026, -9, \frac{2}{3}, 10, \pi, -5\mathbf{i}, -2+2\mathbf{i}$**; (2) рационально или иррационально:** a**.** $\sqrt{49}, b$**.** $\sqrt{18}, c$**.** $\sqrt{3} + \sqrt{2}, d$**.** $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}, e$**.** $\sqrt{2} + \sqrt{8}, f$**.** $(\sqrt{5})^2$**.**

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 3]

Решение. $(1) 2026 \in N$; $-9 \in Z \setminus N$; $\frac{2}{3} \in Q \setminus Z$; 10 и $\pi \in R \setminus Q$; −5i и $-2+2\mathrm{i} \in C \setminus R$. $(2) a$. $\sqrt{49} = 7$ — рационально. b. $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ — иррационально. c. $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ — иррационально. d. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{10}$ — иррационально. e. $\sqrt{2} + \sqrt{8} = 3\sqrt{2}$ — иррационально. f. $(\sqrt{5})^2 = 5$ — рационально — та же логика, что в задании 9, которое это упражнение повторяет с другими числами.

34. Конспект недели 1, часть 3, аудиторные задачи: даны $z_1 = 2+3\mathbf{i}$**,** $z_2 = 1-5\mathbf{i}$**; вычислите** $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$, z_1 / z_2**.**

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 3]

Решение. $z_1 + z_2 = 3-2\mathrm{i}$; $z_1 - z_2 = 1+8\mathrm{i}$; произведение: $(2 \cdot 1 - 3 \cdot (-5)) + (2 \cdot (-5) + 3 \cdot 1)i = (2 + 15) + (-10 + 3)i = 17-7\mathrm{i}$; частное:

$$(z_1)/(z_2) = ((2+3i)(1+5i))/((1-5i)(1+5i))$$
$$(2+10i+3i+15i^2)/(1-(5i)^2) = (2+13i-15)/(1+$$

$$25) = (-13+13i)/26 = -\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i.$$

35. Объясните, почему $1+i3 = 2\cos\frac{}{3}+i\sin\pi =$ **2e**$^{i/3}$**. 3**

$$|1+i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2.$$

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 3]

Решение. Модуль равен $|1+i$ Точка (1, 3) лежит в $\sqrt{}$ первом квадранте, причём $\tan\theta = 3$, откуда $\theta = \pi/3$. Подставляя $r = 2, \theta = \pi/3$ в полярную форму (17), а затем в формулу Эйлера (18), получаем оба выписанных равенства.

3. Неделя 2 — Функции (Math I)

3.1. Math I: Каталог формул недели 2

3.1.1 Функции: определение, классы, симметрия, композиция,

обратные функции Функция сопоставляет каждому x из области определения ровно одно значение $f(x)$; тест вертикальной прямой выявляет отношения, этому не удовлетворяющие. Естественная область определения — наибольшее множество действительных входов, при которых формула имеет смысл; три стандартных препятствия: деление на нуль, корни чётной степени из отрицательных чисел и логарифмы неположительных чисел. $f : D \to R, x7 \to f(x)$; $D =$ область определения, range $f = \{f(x) : x \in D\}$, $(31)p1g(x) : g(x)\not= 0, g(x) : g(x) \geq 0, \log_b g(x) : g(x) > 0$. (32) Чётность и нечётность отражают симметрию относительно оси y и начала координат соответственно; композиция сцепляет функции; обратные существуют только у взаимно однозначных функций тест горизонтальной прямой) и находятся решением $y = f(x)$ относительно x.

чётная: $f(-x) = f(x)$, нечётная: $f(-x) = -f(x)$,

$$(f\circ g)(x) = f(g(x)), (f\circ g) \neq (g\circ f)\text{вообще}, (34)$$

f инъективна $\Leftarrow\Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$, $(35)f$ сюръективна $\Leftarrow\Rightarrow \forall y\exists x$: $f(x) = y$; биективная f обратима: $f^{-1}(f(x)) = x, f(f^{-1}(y)) = y$

$$f^{-1}(f(x)) = x, f(f^{-1}(y)) = y, (36)$$

и $(36)f^{-1}$: график $=$ зеркало графика f отн. $y = x$. (37) Классы функций из §1.2 (OpenStax): линейные, полиномиальные, рациональные, корневые алгебраические), экспоненциальные и логарифмические, тригонометрические трансцендентные). Каждый многочлен гладкий всюду, а каждая рациональная функция определена там, где её знаменатель отличен от нуля.

3.1.2 Экспоненциальные и логарифмические функции (§1.5,

гиперболические функции исключены) Экспонента и логарифм взаимно обратны; законы степеней и логарифмов превращают умножение в сложение и используются в каждой модели роста/распада курса.

$$b^x \cdot b^y = b^{x+y}, (b^x)^y = b^{xy},$$
$$b^{-x} = 1/b^x, b^0 = 1, b > 0, b^1 = b, (b^x)_y = b^{xy}, (38)$$

bx , $(38) \log_b x = y \Leftrightarrow b^y = x$,

$$x > 0, b > 0, b = 1, (39)x$$

$\log_b x^n = n \log_b x$, $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$, $\log_b y = \log_b x - \log_b y$, $(40) \log_b x = \ln x b^x = e^{xlnb}$, (41) переход к другому основанию), $\ln be^{lnx} = x, \ln 1 = 0, \ln e = 1$. (42) Модели роста и распада сравнивают $A(t) = A_0 a^t$ с $A_0 e^{kt}$ через константу скорости роста; время удвоения — эталонная величина. $A(t) = A_0 a^t = A_0 e^{kt}$, $k = \ln a$, $a > 1$: рост; $0 < a < 1$: распад, $(43) k = \ln 2 T_d = \ln 2 N(t) = N_0 2^{t/Td} = N_0 e^{kt}$, , k . (44)

$$N(t) = N_0 e^{-t} (\lambda = (\ln 2)/\tau)$$

Градусы и радианы переводятся через π рад $= 180^\circ$: $\theta_{rad} = \theta_{deg} \cdot \frac{}{180}$.

3.2. Math I: Практическое занятие недели 2 (функции) — вопросы и полные решения

1. Определите, задаёт ли каждое отношение y как функцию от x: a. $y =$ 3x −

$$x^2 + y^2 = 9.$$

2; b. Где уместно, решите относительно y и примените тест вертикальной прямой.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 1]

Решение. a. $y =$ 3x − 2 даёт ровно одно y для каждого x: функция прямая). $\sqrt{b}$. Решая, получаем $y = \pm 9 - x^2$: большинство x например $x = 0$) дают два значения $y = \pm 3$, поэтому вертикальная прямая пересекает окружность дважды; не функция.

2. Пусть $f(x) =$ 2x^2− 3x +1. Вычислите и упростите $f(0), f(-2), f(a), f(a+h)$ и $f(a+h) - f(a), \not{h} = 0$. h

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 2]

Решение. $f(0) = 1$; $f(-2) = 2(4) + 6 + 1 = 15$; $f(a) =$ 2a^2− 3a +1; $f(a+h) = 2(a+h)^2 - 3(a+h) + 1 =$ 2a^2+ 4ah + 2h^2− 3a − 3h +1. Разностное отношение:

$$(f(a+h) - f(a))/h = (4ah + 2h2 - 3h)/h = 4a + 2h - 3.$$

Это выражение предвосхищает производную недель 3–4 при $h \to 0$ оно стремится к 4a − 3).

$$:_{x2+9}; b.g(x) = \sqrt{5} - 2x.$$

3. Найдите естественную область определения: a**.** $f(x) = ^{x-1}$ **Запишите в интервальной нотации. Знаменатель** $x^2 + 9 \geq 9 > 0$ **никогда не обращается в нуль,**

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 3]

Решение.$_2a$. поэтому область — всё $R = (-\infty, \infty)$. b. Нужно 5 − 2x $\geq 0 \iff x \leq$: область $(-\infty, \frac{55}{2}]$.

4. Пусть $f(x) =$ **2x** $-3, g(x) = x^2 + 1$**. Найдите** $(f \circ g)(x)$ **и** $(g \circ f)(x)$**; равны ли они?**

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 4]

Решение. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x^2 + 1) - 3 =$ 2x$^2 -$ 1; $(g \circ f)(x) = g(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 1 =$ 4x$^2 -$ 12x $+10$. Они различны например, при $x = 0$: -1 против 10), что подтверждает: композиция в общем случае некоммутативна — сначала возвести в квадрат и потом сдвинуть не то же самое, что сдвинуть и потом возвести в квадрат.

5. Определите, чётна, нечётна или общего вида каждая функция: $|x| + 1$ **и** $\frac{x}{x2+1}$**; проверьте алгебраически и графически.**

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 5]

Решение. $f(x) = |x| + 1$: $f(-x) = |-x| + 1 = |x| + 1 = f(x)$ — чётная; график зеркально симметричен относительно оси y. $g(x) = \frac{x}{x2+1}$: $g(-x) = \frac{-x}{x2+1} = -g(x)$ — нечётная; график симметричен при повороте на 180° вокруг начала координат.

6. Классифицируйте каждую функцию как линейную, полиномиальную, рациональную, алгебраическую или трансцендентную функция может $\sqrt{x+1}x^2 + 1$**. принадлежать более чем одной категории):** $_{x2+4}$ **и**

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 6]

Решение.$^{x+1}$ — отношение многочленов, значит рациональная и

$$\sqrt{x^2 + 4}$$

$x^2 + 1$ — корень из многочлена, значит алгебраическая алгебраическая). не рациональная, так как не является отношением многочленов).

7. Температура в промышленной камере растёт линейно от $20^\circ C$ **при** $t = 0$ **до** $80^\circ C$ **при** $t = 15$ **мин. (1) Найдите** $T(t)$**; (2) интерпретируйте наклон и сдвиг; (3) найдите** $T(8)$**; (4) когда камера достигнет** $60^\circ C$**? (5) укажите физически разумную область определения.**

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 7]

Решение. (1) Наклон $m = (80 - 20)/(15 - 0) = \frac{60}{15} = 4$ °C/мин, значит $T(t) = 20+$ 4t. (2) Наклон — скорость нагрева: $+4$ градуса в минуту; сдвиг 20 — начальная температура. $(3)T(8) = 20 + 32 = 52$ °C. $(4)20+$ 4t $= 60$ при $t = 10$ минутах.

8. Для $p(x) = x^3 -$ **4x определите: область определения; пересечения с осями; симметрию; поведение на концах; точки неопределённости.**

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 8]

Решение. Область R многочлен). Пересечения: $p(0) = 0$; $x^3 -$ 4x $= x(x-2)(x+2) = 0$ даёт $x = -2, 0, 2$ — все на оси x через начало координат. Симметрия: $p(-x) = -x^3 +$4x $= -p(x)$ — нечётная. Поведение на концах: старший член x^3 с положительным коэффициентом, поэтому $p(x) \to +\infty$ при $x \to +\infty$ и $p(x) \to -\infty$ при $x \to -\infty$. Многочлен определён всюду: точек неопределённости нет.

9. Поставщик электроэнергии тарифицирует $C(E) = 0.10E$ **при** $0 \leq E \leq 200$ **и** $C(E) = 20 + 0.15(E - 200)$ **при** $E > 200$**, в кВт·ч. (1) Найдите** $C(150), C(200), C(350)$**;**

(2) изобразите; (3) непрерывна ли модель при $E = 200$? (4) смысл каждого наклона; (5) одно ограничение.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 9]

Решение. $(1) C(150) = 15$; $C(200) = 20$; $C(350) = 20 + 0.15 \cdot 150 = 42.5$ все в \$). (2) Два линейных куска: наклон 0.10 до 200, затем 0.15 — кусочно-линейный график с изломом в (200, 20). (3) Да: обе формулы дают 20 при $E = 200$, куски стыкуются без скачка. (4) Наклоны — предельные цены: 0.10\$/кВт·ч за первые 200 кВт·ч, 0.15\$/кВт·ч сверх. (5) Ограничение: скачок цены ровно на 200 кВт·ч стимулирует потребителя останавливаться чуть ниже границы; реальные тарифы меняются плавнее или блоками.

10. Найдите обратную к $f(x) =$ 4x − 7 и укажите области определения; проверьте $f(f^{-1}(x)) = x$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 10]

Решение. $y = 4x - 7 \Rightarrow x = (y + 7)/4$, поэтому $f^{-1}(x) = (x + 7)/4$ с областью определения R и множеством значений R. Проверка: $f(f^{-1}(x)) = 4 \cdot (x + 7)/4 - 7 = x + 7 - 7 = x$. Обе — прямые с наклоном графики симметричны относительно $y = x$).

11. Для каждой модели определите рост/распад и укажите начальное значение и коэффициент роста/распада: $A(t) = 500(1.08)^t$, $B(t) = 1200(0.85)^t$, $C(t) =$ 40e$^{0.03t}$, $D(t) =$ 200e$^{-0.4t}$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 11]

Решение. A: рост, начальное 500, коэффициент $1.08 (+8\%$ за период). B: распад, начальное 1200, коэффициент 0.85 (-15%). C: рост, начальное 40, непрерывная ставка $k = 0.03$. D: распад, начальное 200, непрерывная ставка $k = -0.4$. Знак k в e^{kt} или то, $a > 1$ ли в a^t, определяет направление.

12. Решите $2^{x+1} = 16$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 12]

Решение. $16 = 2^4$, поэтому $x + 1 = 4$ и $x = 3$. Эквивалентно можно взять $\log_2$ от обеих частей.)

13. Разряд батареи: $E(t) = E_0 e^{-0.025t}, t$ в часах. (1) Доля оставшейся энергии через 10 ч? (2) Когда остаётся 50%? (3) Когда остаётся 10%? (4) Почему ровно нуль недостижим?

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 13]

Решение. $(1) E(10)/E_0 = e^{-0.25} \approx 0.7788$: около 77.9%. $(2) e^{-0.025t} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \ln \frac{2}{0}.025 \approx 27.7$ ч.

$(3) e^{-0.025t} = 0.1 \Rightarrow t = \ln \frac{10}{0}.025 \approx 92$ ч.

$E_0 e^{-0.025t} \approx 92.1$ ч. (4) Экспонента строго положительна

при любом конечном t; она приближается к нулю только в пределе $t \to \infty$ — первое знакомство с пределами.

14. Рост популяции: $P(t) =$ 800e$^{0.35t}, t$ в часах. (1) Начальная популяция? (2) Через 5 ч? (3) Время удвоения? (4) Может ли модель оставаться реалистичной бесконечно долго?

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 14]

Решение.$_{0ln.35} (1) P(0) = 800$. $(2) P(5) = 800\text{e} \approx 800 \cdot 5.755 \approx 4603$. $(3) T = \approx 1.98$ ч. (4) Нет: экспоненциальный рост игнорирует истощение^2 питательных веществ и пространство; реально модель работает лишь вблизи старта культуры.

3.3. Math I: Задания для самостоятельной работы недели 2 — вопросы и полные решения

1. Определите, задаёт ли каждое отношение y как функцию от x: a. $y = 3x - 2$; b. $x^2 + y^2 = 9$; c. $y^2 = x + 1$; d. $x = y^3 - 2$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 2]

Решение. a. Функция. b. Не функция окружность: два y на каждое x). c. $y = \pm\sqrt{x}+1$: два значения при $x > -1$, не функция. d. Решаем относительно $\sqrt[3]{x}+2$; кубический корень единственен для каждого действительного y: $y = x$, поэтому это функция проходит тест вертикальной прямой, хотя и не проходит горизонтальный).

2. Для $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ вычислите $f(0), f(-2), f(a), f(a+h)$, . $h^{f(a+h)-f(a)}$

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 3]

Решение. Совпадает с упражнением 2 практического занятия: 1; 15; $2a^2 - 3a + 1$; $2a^2 + 4ah + 2h^2 - 3a - 3h + 1$; разностное отношение $= 4a + 2h - 3$.

$$(f(a+h) - f(a))/h = 4a + 2h - 3.$$

3. Найдите естественную область определения: a. $f(x) =^{x-1} q$

$$\sqrt{(x+2)/(x-1)}$$

c. $h(x) =_{x-4}$; d. $p(x) = \frac{x+2}{x-1}$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 4]

Решение. a. $(-\infty, \infty)$. b. $(-\infty, \frac{5}{2}]$.c. Нужно $x-1 \geq 0$ и $\not= 4$: $[1,4) \cup (4,\infty)$. d. Нужно $\frac{x+2}{x-1} \geq 0$ и $\not= 1$: критические точки -2 и 1; частное неотрицательно на $(-\infty, -2] \cup (1, \infty)$.

4. Найдите множество значений $f(x) = x^2 + 2$, $g(x) = -|x-1| + 4$, $h(x) = \sqrt{x} + 3 - 2$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 5]

Решение. $x^2 \geq 0 \Rightarrow f \geq 2$: множество значений $[2, \infty)$. $|x-1| \geq 0 \Rightarrow -|x-1| \leq 0 \Rightarrow g \leq 4$: $(-\infty, 4]$.$\sqrt{x} + 3 \geq 0 \Rightarrow h \geq -2 : [-2, \infty)$. Каждый ответ следует из экстремального значения внутренней функции.

5. Пусть $f(x) = x^2 - 1, g(x) = \sqrt{x} + 2$. Определите $f + g, f - g$, fg, f/g и каждую новую область определения.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 6]

Решение. $(f \pm g)(x) = x^2 - 1 \pm \sqrt{x} + 2$; $(fg)(x) = (x^2 - 1)\sqrt{x} + 2$; $(f/g)(x) =$

$$(f+g)(x) = x^2 + \sqrt{x} + 1; (f-g)(x) = x^2 - \sqrt{x} - 3;$$
$$(fg)(x) = (x^2-1)\sqrt{x} + 2; (\frac{f}{g})(x) = (x^2-1)/\sqrt{x} + 2.$$

$\sqrt{x+2}$. Области: $f + g, f - g$, fg: $x \geq -2$ пересечение R и $[-2, \infty)$), т.е. $[-2, \infty)$. Для f/g дополнительно $\sqrt{x} + 2 \not= 0$, т.е. $\not= -2$: $(-2, \infty)$.

6. Пусть $f(x) = 2x - 3, g(x) = x^2 + 1$. Найдите $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$, $(f \circ f)(x)$, $(g \circ g)(x)$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 7]

Решение. $(f \circ g)(x) = 2x^2 - 1$; $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 12x + 10$; $(f \circ f)(x) = 2(2x - 3) - 3 = 4x - 9$; $(g \circ g)(x) = (x^2 + 1)^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 2$. Первые два различны, поэтому композиция некоммутативна; последние два показывают, что самокомпозиция вполне законна.

7. Определите, чётна, нечётна или общего вида каждая функция: $x^4 -$ **2x**^{2}**;** $x^3 -$ **4x;** $x^3 + x^2$**;** $|x| + 1$**;** $\frac{x2}{x+1}$**.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 8]

Решение. $x^4 -$2x^2: только чётные степени — чётная. $x^3 -$4x: только нечётные $x^3 +$ x^2: смешанная — общего вида. степени — нечётная. $|x| + 1$: чётная

$$x^2/(x + 1)$$

упр. 5 практического). $g(-x) = x^2/(-x+1)$: числитель чётный, знаменатель меняет знак: $g(-x) \neq \pm g(x)$ — общего вида.

8. Классифицируйте: 3x − 7; $x^4 -$ **2x** $+1$**;** $^{x+1}x^2 + 1$**;** 2^x**;** $\sin x$**.** $_{x2+4}$**;**

$$(x^4 - 2x + 1)/(x + 1)$$

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 9]

Решение. 3x − 7: линейная многочлен). многочлен. $_{x2+4}$: $\sqrt{x^2} + 1$: алгебраическая корень). 2^x: экспоненциальная — рациональная. трансцендентная. $\sin x$: тригонометрическая — трансцендентная.

9. Линейная модель температуры из упражнения 10 практического занятия — все пять частей.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 10]

Решение. Та же модель и ответы, что в упражнении 7 практического занятия: $T(t) = 20+$ 4t; наклон = скорость нагрева $4^\circ C$/мин, сдвиг = начальные $20^\circ C$; $T(8) = 52^\circ C$; $60^\circ C$ при $t = 10$ мин; область [0, 15].

10. Для $p(x) = x^3 -$ **4x и** $r(x) = \frac{x+1}{x-1}$ **определите область определения, пересечения, симметрию, поведение на концах, точки неопределённости.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 12]

Решение. p: как в упражнении 8 практического занятия область R; пересечения −2, 0, 2; нечётная; $\pm\infty$ на концах; нет). r: область $\not= 1$, т.е. $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$. Пересечения: $r(0) = -1$; числитель обращается в нуль при $x = -1$. Симметрия: $r(-x) = (-x + 1)/(-x - 1) = (x - 1)/(x + 1) \neq \pm r(x)$ — общего вида. Поведение на концах: $r(x) \to 1$ при $x \to \pm\infty$ горизонтальная асимптота $y = 1$); $r(x) \to \pm\infty$ при $x \to 1$ вертикальная асимптота $x = 1$). Не определена только при $x = 1$.

11. Кусочный тариф на электричество из упражнения 9 практического занятия — все пять частей.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 13]

Решение. Те же ответы, что в упражнении 9 практического занятия: $C(150) = 15, C(200) = 20, C(350) = 42.5$; непрерывный ломаный график; наклоны — предельные цены; ограничение — разрыв стимула на границе 200 кВт·ч.

12. Переведите $30^\circ, 135^\circ, 300^\circ$ **в радианы и** $\frac{}{6}, \frac{5}{4}, \frac{7}{3}$ **в градусы.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 14]

Решение. Умножаем на $\pi/180$: $30^\circ = \frac{}{6}$; $135^\circ = \frac{3}{4}$; $300^\circ = \frac{5}{3}$. Умножаем на $180/\pi$: $\frac{}{6} = 30^\circ$; $\frac{5}{4} = 225^\circ$; $\frac{7}{3} = 420^\circ$.

13. Взаимно однозначна? *a.* $f(x) =$ **3x** $-5, x \in R$**;** *b.* $g(x) = x^2, x \in R$**;** *c.* $h(x) = x^2, x \geq 0$**;** *d.* $p(x) = \frac{1}{x}, \not= 0$**.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 15]

Решение. a. Да: непологая прямая проходит тест горизонтальной прямой. b. Нет: $g(-2) = g(2) = 4$. c. Да: на $[0, \infty)$ возведение в квадрат инъективно ограничение восстанавливает тест горизонтальной прямой). d. Да: $\frac{1}{x1} = \frac{1}{x2} \Rightarrow x_1 = x_2$.

14. Найдите обратные и их области определения: a**.** $f(x) =$ **4x − 7;** b**.** $g(x) = \frac{x+3}{2}$**;** c**.** $h(x) = x^2 + 1, x \geq 0$**;** d**.** $p(x) = \frac{2x+3}{x-1}, x \neq 1$**; проверьте композицией.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 16]

Решение. a. $f^{-1}(x) = (x + 7)/4$, область R упр. 10 практического). b. $y = (x + 3)/2 \Rightarrow$

$$y = (x + 1)^2 \Rightarrow x = \sqrt{y - 1}$$

$x =$ 2y − 3, значит $g^{-1}(x) =$ 2x − 3, область R. c. положительный корень, так как $x \geq 0$): $h^{-1}(x) = \sqrt{x - 1}$, область $[1, \infty)$. d. $y = (2x + 3)/(x - 1) \Rightarrow y(x - 1) =$ 2x $+3 \Rightarrow x(y-2) = y+3 \Rightarrow x = (y+3)/(y-2)$: $p^{-1}(x) = (x+3)/(x-2)$, область $x \neq 2$. Каждое удовлетворяет $f(f^{-1}(x)) = x$ по построению.

15. Классификация роста/распада для A, B, C, D **упражнение 11 практического занятия).**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 17]

Решение. То же: A рост $(a = 1.08), B$ распад $(a = 0.85), C$ рост $(k = 0.03), D$ распад $(k = -0.4)$.

16. Решите, сначала дав точные ответы: a**.** $2^{x+1} = 16$**;** b**.** $5^2x = 125$**;** c**.** $e^3x = 7$**;** d**.** $\mathbf{100e^{-0.2t} = 20}$**.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 18]

Решение. a. $x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$. b. 2x $= 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$. c. 3x $= \ln 7 \Rightarrow x = \ln^7 \approx 0.6486$. $3d$. $e^{-0.2t} = 0.2 \Rightarrow t = -^{ln0.2} = 5 \ln 5 \approx 8.047$. 0.2

17. Разряд батареи упражнение 13 практического занятия) — все четыре части.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 19]

Решение. То же: $e^{-0.25} \approx 77.9\%$ через 10 ч; 50% при $\frac{ln2}{0.025} \approx 27.7$ ч; 10% при $\frac{ln10}{0.025} \approx 92.1$ ч; экспонента не достигает нуля за конечное время.

18. Популяция бактерий упражнение 14 практического занятия) — все четыре части.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 20]

Решение. То же: $P_0 = 800$; $P(5) \approx 4603$; время удвоения $\frac{ln2}{0.35} \approx 1.98$ ч; чисто экспоненциальные модели проваливаются в долгосрочной перспективе ресурсы, пространство, отходы).

4. Неделя 3 — Пределы (Math I)

4.1. Math I: Каталог формул недели 3

4.1.1 Скорости изменения и две основополагающие задачи

Пределы входят в курс через два вопроса: как быстро меняется величина касательная/скорость) и как ведут себя значения функции вблизи точки. Средняя скорость на сжимающемся интервале определяет мгновенную.

$$(f(x) - f(a))/(x - a) = m_{sec}(51)$$

наклон секущей через $(a, f(a))), (51)x - a$

$v_{ave} = (s(t) - s(a))/(t - a)$ средняя скорость, v_{ave}). (59)

средняя скорость на $[a, t]), (52)t - af(a + h) - f(a)$

$\lim_{h\to 0}(f(a + h) - f(a))/h = f'(a)$ мгновенная скорость; определяется как предел) (53)

lim мгновенная скорость; определяется как предел)$(53)h \to 0h$

4.1.2 Понятие предела, односторонние и бесконечные пределы

Интуитивное определение (OpenStax §2.2) и его односторонние варианты — операционное сердце недели; двусторонний предел существует в точности тогда, когда совпадают два односторонних. ${}_x\lim_{\to a} f(x) = L \Leftrightarrow$ все $f(x)(x = a)$ приближаются к L при $x \to a$, $(54)_x \lim_{\to a-} f(x) = L$, ${}_x\lim_{\to a+} f(x) = L$ левый/правый пределы), $(55)_x \lim_{\to a} f(x) = L \Leftrightarrow_x \lim_{\to a-} f(x) = \lim_{x\to a+} f(x) = L$(критерий существования), $(56)_x \lim_{\to a-} f(x) = \pm\infty$, ${}_x\lim_{\to a+} f(x) = \pm\infty$, ${}_x\lim_{\to a} f(x) = \pm\infty$(бесконечные пределы), $(57)11\lim(x - a)n = -\infty$, $\lim(x - a)n = +\infty(n$ чётно); $(58)x \to a^- x \to a^+ 11\lim(x - a)_n = -\infty$, $\lim(x - a)_n = +\infty(n$ нечётно) : $x = a$ верт. асимптота. $(59)x \to a^- x \to a^+$ Прямая $x = a$ — вертикальная асимптота функции f, если в ней выполняется хотя бы один из односторонних бесконечных пределов (57).

4.1.3 Точное определение (§2.5, акцент лекции)

Определение ε–δ превращает «произвольно близко» в количественные расстояния; эквивалентные неравенства с модулями — рабочий инструмент.

$$\lim_{x} \to af(x) = L \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\exists\delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon,$$

$$(60)|f(x) - L| < \varepsilon \Leftrightarrow L - \varepsilon$$

$$< f(x) < L + \varepsilon, (61)0 < |x - a| < \delta \Leftrightarrow a - \delta < x < a + \delta x \neq a.(62)$$

4.1.4 Два стандартных предела, увиденных на этой неделе

$\sin x \lim = 1$ таблица 2.2 лекции: значения 0.9983, 0.99998, 0.9999998 . . .), $(63)x \to 0x_{x\to 0} \sin 111 \lim$ не существует колебание), $\lim x = -\infty, \lim x = +\infty$. (64)

$\lim_{x\to 0}(\sin x)/x = 1, \lim_{x\to 0}(\sin(1/x))$ не существует колебание), $\lim_{x\to 0-}(1/x) = -\infty, \lim_{x\to 0+}$

$$(1/x) = +\infty.(64)$$

4.2. Math I: ISA недели 3 — вопросы и полные решения

1. Изучите все задачи, упражнения и примеры, представленные в лекции и на практическом занятии; умейте отвечать быстро и без ошибок.
[Источник: Неделя $3, ISA$, задание 2]

Решение. Это указание по изучению, а не вычисление; соответствующий материал полностью решён в примерах лекции, в блоке практического занятия ниже упражнения 2–8) и в назначенных задачах учебника следующие пункты).

2. Для $f(x) = x^3$ оцените наклон касательной при $x = 1$, используя $m_{sec} = f(1 + h) - f(1)$

$$m_{sec} = 3 + 3h + h^2$$

слева и справа к одному и тому же числу?

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 3]

Решение. Здесь $f(1) = 1$ и $f(1+h) = (1+h)^3 = 1+$ 3h + 3h$^2 + h^3$, поэтому $m_{sec} = 3+$ 3h $+h^2$. Значения: $h = -0.1 \Rightarrow 2.71$; $-0.01 \Rightarrow 2.9701$; $-0.001 \Rightarrow 2.997$; $0.001 \Rightarrow 3.003$; $0.01 \Rightarrow 3.0301$; $0.1 \Rightarrow 3.31$. Обе стороны приближаются к 3; действительно $\lim_{h\to 0}(3 + 3h + h^2) = 3$ — точный наклон касательной производная 3x^2 при $x = 1$).

3. Решите задачи 46–49 и 60–64 из «Главы 1» список упражнений §2.2) Open- Stax Calculus 1.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 4]

Решение. Эти упражнения на чтение графиков выписаны и полностью решены ниже в §4.4; нумерация в листе курса относится именно к этому списку упражнений.

4. Регулятор температуры выдаёт $C(T) = 0$ **при** $T < 50$ **и** $C(T) = 10$ **при** $T \geq 50$ **вольты). Определите** $\lim_T \to 50 - C(T)$, $\lim_T \to 50 + C(T)$, $\lim_T \to 50 C(T)$**; интерпретируйте как операцию переключения.**

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 5]

Решение. Слева регулятор читает «выключенную» ветвь: $\lim_T \to 50 - C(T) = 0$. Справа — «включенную»: $\lim_T \to 50 + C(T) = 10$. Поскольку односторонние пределы различны, двусторонний предел не существует (56). Интерпретация: резкое переключение при $T = 50$ — выход скачет с 0 В на 10 В, именно так термостат командует нагревателем.

$$s(t) = 2t^2 + 3t (\text{м, с}).(1)$$

5. Положение робо-тележки: (1) Средняя скорость $s(2+h) - s(2)$

$$s(2+h) - s(2) = (2(2+h)^2 + 3(2+h)) - 14$$

(3) вычислите $\lim_{h\to 0}$**; (4) интерпретируйте.** h

$$s(3) - 14 = (27 - 14)/(14.72 - 14)$$

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 6]

Решение. $(1) s(2) = 14$. Значения: $h = 1$: $= 13$; $h = 0.1$: $=$

$$s(2+h) - s(2)/h = (14.07(2+h)^2 - 14)/(h) = (14.07(4 + 4h + h^2) - 14)/(h) =$$

$$(56.28 + 56.28h + 14.07h^2 - 14)/(h) = (42.28 + 56.28h + 14.07h^2)/(h)$$
$$42.28/h + 56.28 + 14.07h(9)$$

7.2; $h = 0.01$: $^{14.0702-14} = 7.02$; $h = -0.01$: $^{13.9302-14} = 6.98$. $(2) s(2+h) = 2(2+h)^2 + 3(2+$

$$s(2+h) - s(2) = 2(2+h)^2 + 3(2+h) - (2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2) = 8h + 2h^2, (2)$$

$h) = 8+ 8h + 2h^2 + 6+ 3h = 14+ 11h + 2h^2$, поэтому $^{s(2+h)-s(2)} = ^{11h+2h2} = 11+ 2h$. $(3) hh \lim_{h\to 0}(11 + 2h) = 11$ м/с. (4) Мгновенная скорость тележки при $t = 2$ с равна 11 м/с; средние приближаются к ней с обеих сторон.

6. У двух систем выходы $A(t) = (1.08)^t$ и $B(t) = e^{0.03t}$. (1) Вычислите $\lim_{t\to\infty} A(t)$ и $\lim_{t\to\infty} B(t)$; (2) перепишите $A(t)$ в виде e^{kt}; (3) какая растёт быстрее? $(4) B(t)$ вычислите $\lim_{t\to\infty} A(t)$}; (5) интерпретируйте.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 7]

Решение. (1) Оба основания больше 1, поэтому оба предела равны $+\infty$. $(2) A(t) = e^{tln1.08}$, причём $\ln 1.08 \approx 0.0770$, значит $A(t) = e^{0.0770t}$. $(3) A$ растёт быстрее, так как её постоянная скорости $0.0770 > 0.03$. $(4) \frac{B(t)}{A(t)} = e^{(0.03-0.0770)t} = e^{-0.047t} \to 0$ при $t \to \infty$. (5) Хотя обе расходятся, их отношение стремится к нулю: B становится пренебрежимой рядом с A — зародыш сравнения «малого o» недели 4.

4.3. Math I: Практическое занятие недели 3 (инженерные пределы) — вопросы и полные решения

Условия курса для этого занятия: показывать математическую процедуру; включать единицы; интерпретировать в инженерных терминах; указывать, когда предел не существует.

1. Решите задачи 50–54 списка упражнений §2.2 учебника.

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 1]

Решение. Выписаны и полностью решены ниже в §4.4 пункты 50–54).

2. Односторонние пределы: $f(x) = 2x+1$ при $x < 2, f(x) = 7-x$ при $x \geq 2$. Найдите $\lim_{x\to 2} -f, \lim_{x\to 2} +f, \lim_{x\to 2} f, f(2)$; объясните, существует ли двусторонний предел.

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 2]

Решение. Левая ветвь: $\lim_{x\to 2} -(2x + 1) = 5$. Правая ветвь: $\lim_{x\to 2} +(7 - x) = 5$. Они равны, значит по $(56) \lim_{x\to 2} f(x) = 5$. Заметим, $f(2) = 7 - 2 = 5$ тоже — значение функции совпадает с пределом, поэтому у графика нет разрыва при $x = 2$.

$$V(T) = (2500/T)MB, T \geq 50$$

3. Калибровка рядом с пропущенным измерением: $V(T) =$ мВ, $\mathscr{V} = 50T-50(T$ в $^\circ C)$. (1) Почему $V(50)$ не определено? (2) Оцените $\lim_T \to 50V(T)$; (3) как предел может заменить пропущенное калибровочное значение?

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 3]

Решение. (1) Формула делит на $T - 50$, что при $T = 50$ равно 0; у модели датчика просто нет значения там. (2) Раскладываем разность квадратов: $T^2 - 2500 = (T - 50)(T + 50)$, значит при $\mathscr{V} = 50, V(T) = T + 50$, и $\lim_T \to 50V(T) = 100$ мВ. (3) Предел описывает, что датчик бы показал при $50^\circ C$; заполнить калибровочную таблицу значением 100 мВ в этой точке оправдано, потому что выход приближается к этому значению с обеих сторон — это «устранимое» поведение, а не скачок.

4. Система с переключением: $V(t) = 2t +1$ при $t < 4$ и $V(t) = 12-t$ при $t \geq 4$ В). Определите односторонние пределы, двусторонний предел и $V(4)$; есть ли резкое изменение напряжения при $t = 4$?

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 4]

Решение. Слева: $\lim_{t\to 4} -(2t + 1) = 9$ В. Справа: $\lim_{t\to 4} +(12 - t) = 8$ В. $V(4) = 12 - 4 = 8$ В. Односторонние пределы различны, значит $\lim_{t\to 4} V(t)$ не существует: при $t = 4$

питание резко падает с 9 В до 8 В. Инженерный смысл: ступень 1 В может возбудить переходные процессы в управляемом устройстве; когда ступень вредна, применяют входные фильтры или логику мягкого старта.

5. Напряжение–деформация: $\sigma(\varepsilon) = 200000\varepsilon$ **при** $\varepsilon < 0.002$ **и** $\sigma(\varepsilon) = 400 + 10000(\varepsilon - 0.002)$ **при** $\varepsilon \geq 0.002$**(**σ **в МПа; область Гука, затем упрочнение). Найдите односторонние пределы при** $\varepsilon = 0.002$**; существует ли двусторонний предел? Предсказывает ли модель скачок? Изобразите график вблизи перехода.**

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 5]

Решение. Упругая сторона: $\lim_{\to 0.002} -200000\varepsilon = 200000(0.002) = 400$ МПа.

$$\lim_{\to 0.002} -\sigma(\varepsilon) = 200000(0.002) = 400\text{МПа};$$
$$\lim_{\to 0.002} +\sigma(\varepsilon) = 400 + 10000(0.002 - 0.002) =$$

400 МПа; $\lim_{\to 0.002} \sigma(\varepsilon) = 400$ МПа существует).

Пластическая сторона: $400+10000(\varepsilon-0.002) = 400$ МПа. Оба равны 400 МПа, значит двусторонний предел существует и равен 400 МПа; скачка нет — кусочная модель непрерывна в точке текучести, меняется лишь наклон с 200 000 до 10 000 МПа на единицу деформации). График — два прямых отрезка, встречающихся в (0.002, 400) с выраженным изломом: упругое нагружение, затем гораздо более пологая пластическая ветвь.

6. Долговременный отклик RC**-цепи:** $V(t) = V_s(1 - e^{-t/(RC)})$ **при** $V_s = 12$ **В,** $R = 10000, C = 100$ **мкФ. (1) Вычислите** $\lim_{t\to 0} +V(t)$**;** $(2)\lim_{t\to\infty} V(t)$**; (3) интерпретируйте оба физически.**

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 6]

Решение. (1) При $t = 0^+$ экспонента равна $e^0 = 1$, значит $V(0^+) = 12(1 - 1) = 0(2)$ При $t \to \infty, e^{-t/(RC)} \to 0$, В — изначально незаряженный конденсатор. значит $V \to V_s = 12$ В. (3) Конденсатор заряжается от 0 В к напряжению питания 12 В, приближаясь к нему асимптотически; постоянная времени $\tau = RC = 10^4 \cdot 10^{-4} = 1$ с задаёт темп около 63% заряда через 1 с, 99% через 5τ). Предельный язык «$V \to V_s$ при $t \to \infty$» — в точности то, как формулируют асимптотическую зарядку.

7. Установившаяся скорость: $v(t) = v_T(1 - e^{-kt}), v_T > 0, k > 0$**.** $(1)v(0)$**?** $(2)\lim_{t\to\infty} v(t)$**? (3) Почему эта модель реалистичнее неограниченного ускорения?**

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 7]

Решение. $(1)v(0) = v_T(1 - 1) = 0$: объект стартует из состояния покоя. $(2)e^{-kt} \to 0$, значит $v \to v_T$: скорость приближается к установившейся. (3) Сопротивление воздуха растёт со скоростью, пока не уравновесит гравитацию; после этого равнодействующая равна нулю, и скорость больше не может расти — падающее тело действительно приближается к конечному пределу, а не ускоряется вечно.

8. Скорость передачи данных: $R(n) =^{100} n$ **Мбит/с. (1) Вычислите** $n + 20R(10), R(100), R(1000)$**;** $(2)\lim_{n\to\infty} R(n)$**; (3) почему увеличение** n **в итоге даёт убывающие улучшения? (4) максимальная теоретическая скорость?**

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 8]

Решение. $(1)R(10) \approx 33.3$, $R(100) \approx 83.3$, $R(1000) \approx 98.0$ Мбит/с. (2) Деля на n: $R(n) = \frac{100}{1+20/n} \to 100$ Мбит/с. (3) Каждая дополнительная единица ресурса делится на всё большую базу, поэтому предельная выгода убывает — убывающая отдача. (4) Горизонтальная асимптота 100 Мбит/с — потолок модели: к нему приближаются, но не превосходят.

4.4. Math I: назначенные упражнения учебника (OpenStax §2.2, пункты 46–54 и 60–64)

Эти упражнения на чтение графиков используют четыре рисунка, напечатанные вместе с набором упражнений; нужные значения считываются с графиков, как в аудитории. Сначала формулировки, затем решения.

1. По первому графику $y = f(x)$ **решите:** $(46)\lim_{x\to 10} - f(x) = 0$**;** $(47)\lim_{x\to -2} + f(x) = 3$**;** $(48)\lim_{x\to -8} f(x) = f(-8)$**;** $(49)\lim_{x\to 6} f(x) = 5$ **— верно или неверно?**

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 46–49]

Решение. (46) Верно: при $x \to 10$ слева кривая спускается к закрашенной точке (10, 0), значит левый предел 0. (47) Верно: чуть правее -2 график находится на высоте 3 закрашенная точка $(-2, 3)$). (48) Неверно: вблизи $x = -8$ кривая приближается к открытому кружку на высоте -6, значит $\lim_{x\to -8} f(x) = -6$, тогда как $f(-8) = -3$ закрашенная точка); предел и значение могут не совпадать. (49) Неверно: слева кривая спускается к открытому кружку (6, 2), значит $\lim_{x\to 6} - = 2$, тогда как правая ветвь выходит из закрашенной точки (6, 5), значит $\lim_{x\to 6} + = 5$; односторонние пределы различны $\Rightarrow$ двусторонний предел не существует, поэтому он не может равняться 5.

2. Для кусочно-линейного графика прямая $y = x+1$ **до открытой точки (1, 2); закрашенная точка (1, 1); затем прямая** $y = 3-x$**), найдите** $(50)\lim_{x\to 1} - f$**;** $(51)\lim_{x\to 1} + f$**;** $(52)\lim_{x\to 1} f$**;** $(53)\lim_{x\to 2} f$**;** $(54) f(1)$**.**

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 50–54]

Решение. (50) Левая ветвь $y = x + 1 \to 2$. (51) Правая ветвь $y = 3 - x \to 2$. (52) Обе стороны равны 2, значит $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$ — даже при $f(1) = 1$; предел игнорирует саму точку. (53) При $x = 2$ живёт только правая ветвь: $3 - 2 = 1$. $(54) f(1) = 1$ закрашенная точка).

3. Для третьего графика слева: прямая, опускающаяся к открытой точке (0, 1); справа: кривая, поднимающаяся из закрашенной точки (0, −4) и пересекающая ноль вблизи $x = 2$**), найдите** $(55)\lim_{x\to 0} - f$**;** $(56)\lim_{x\to 0} + f$**;** $(57)\lim_{x\to 0} f$**;** $(58)\lim_{x\to 2} f$**.**

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 55–58]

Решение. (55) 1. (56) -4. (57) $1 \neq -4$, поэтому двусторонний предел не существует (56). (58) Правая ветвь проходит через ось при $x = 2$, значит предел 0.

4. Для четвёртого графика три куска: поднимающаяся прямая до открытой точки (−2, 0); опускающийся отрезок из закрашенной точки (−2, 2) через начало координат в (2, −2); поднимающаяся прямая из открытой точки (2, 2)), найдите $(59)\lim_{x\to -2} - f$**;** $(60)\lim_{x\to -2} + f$**;** $(61)\lim_{x\to -2} f$**;** $(62)\lim_{x\to 2} - f$**;** $(63)\lim_{x\to 2} + f$**;** $(64)\lim_{x\to 2} f$**.**

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 59–64]

Решение. (59) 0. (60) 2. (61) $0 \neq 2$: не существует. (62) -2. (63) 2. (64) $-2 \neq 2$: не существует. Оба стыка — настоящие скачки: никакое усреднение не исправит неравные односторонние пределы.

5. Неделя 4 — Пределы II: законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотика, символы Ландау (Math I)

Неделя 4 — ключевая неделя перед повторением к Test 1: она превращает предельный аппарат недели 3 в рабочий инструментарий. Обязательное чтение — OpenStax §2.3 Законы пределов), а конспект недели 4 проф. Неофотистоса обобщает общие свойства пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотическую эквивалентность и символы Ландау O и o. Эта часть перечисляет каждое уравнение из обоих источников, а затем решает каждое упражнение набора §2.3 пункты 83–130) и каждый разобранный вопрос конспекта.

5.1. Каталог формул недели 4

5.1.1 Общие свойства пределов конспект недели 4)

$\lim_x \to af(x) = L : f(x)$ сколь угодно близок к L при x, близком к $a(x = a)$; $(78)\lim_x \to af(x) = L \Leftrightarrow_x \lim_{\to a-} f(x) = \lim_{x\to a+} f(x) = L$ двусторонний критерий), (79) предел, когда он существует, единственен.

5.1.2 Законы пределов теорема 2.5 OpenStax)

Если $\lim_{x\to a} f(x) = L$ и $\lim_{x\to a} g(x) = M$ оба существуют) и c — константа, то: Сумма: $\lim_{x\to a}[f(x) + g(x)] = L + M$; Разность: $\lim_{x\to a}[f(x) - g(x)] = L - M$; (80) Постоянный множитель: $\lim_{x\to a} cf(x) =$ cL; Произведение: $\lim_{x\to a}[f(x)g(x)] = LM$; (81)

$$\text{Степень} : \lim_{x\to a}[f(x)]^n = L^n(n \in N); (82)$$

Частное: $\lim_{x\to a} f(x)/g(x) = L/M(M \neq 0)$. (81)

Корень: $\lim_{x\to a}(f(x))^{1/n} = L^{1/n}(n$ нечётно: любые L; n чётно: $L \geq 0)$. (83) Базовые: $\lim_{x\to a} x = a, \lim_{x\to a} c = c$. (84)

$$\lim_{x\to a} p(x) = p(a)(85)$$

Многочлены/рациональные: $\lim_{x\to a} p(x) = p(a)$, $\lim_{x\to a} p(x)/q(x) = p(a)/q(a)(q(a) \neq 0)$. (85) Если $f(x) = g(x)$ при всех $x \neq a$ вблизи a, то $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x)$ — «лицензия» на сокращение множителей перед подстановкой.

5.1.3 Теорема о двух милиционерах теорема 2.7 OpenStax)

$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ вблизи $a(x = a)$, $_x \lim_{\to a} f(x) = L = \lim_{x\to a} h(x) \Rightarrow_x \lim_{\to a} g(x) = L$. (86)

5.1.4 Стандартные пределы и выводимые тригонометрические пределы конспект недели 4)

$$\lim_{x\to 0}(e^x - 1)/x = 1, \lim_{x\to 0}(\sin x)/x = 1,$$
$$\lim_{x\to 0}(1 - \cos x)/x^2 = 1, \lim_{x\to 0}(\ln(1 + x))/x = 1,$$

$$\lim_{x\to 0} x^n e^x = 0 (n \in N), \lim_{x\to 0} (1+x)^{1/x} = e, (87)$$

$\sin x 1 - \cos x = 1 \lim = 1, \lim 2, \lim = 1, (87)$

$$\lim x \to 0 (e^x - 1)/x = 1, \lim x \to 0 \sin \frac{x}{x} = 1,$$
$$\lim x \to 0 (1 - \cos x)/x^2 = \frac{1}{2}, \lim x \to 0 \ln(1+x)/x = 1,$$

$$\lim x \to 0 (1+x)^(1/x) = e, \lim x \to 0 x^n/e^x = 0 (n \in N). (87)$$

$\ln(1+x)x^n$

$$\lim_{x\to 0} (1+x)^{1/x} = e, (88)$$

$\lim = 1, \lim \lim e_x = 0 (n \in N)$. (88)

$$\lim x \to 0 (\sin x)/x = 1, \lim x \to 0 (1 - \cos x)/x^2 = 1,$$
$$\lim x \to 0 (e^x - 1)/x = 1, \lim x \to 0 \ln(1+x)/x = 1,$$

$$\lim x \to 0 (1+x)^{1/x} = e, \lim x \to \infty x^n/e^x = 0 (n \in N). (88)$$

Углы в тригонометрических пределах должны быть в радианах. Приспособление (87) заменой, например sin 5x sin 5x $\sin \theta 1 - \cos \theta \lim = 5 \lim = 5, \lim = 1 \Longrightarrow \lim = 0$ сопряжённое). $x \to 0 x x \to 0$ 5x $\theta \to 0 \theta\theta \to 0 \theta (89)$

5.1.5 Неопределённости конспект недели 4)

0∞

$$0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$$

(90) Слово «неопределённость» не означает, что предел не существует; оно означает, что требуется дополнительный анализ. Одна и та же начальная форма может разрешиться по-разному:

$$\lim(x \to \infty) \frac{x}{x}^2, \lim(x \to \infty) x^2/x, \lim(x \to \infty) \frac{x}{x} (90)$$

$\lim x = 1, \lim x = 0, \lim x_2$ не существует конечного нет), (91)

$$\lim(x \to 0)(\sin x)/x = 1, \lim(x \to 0)(1 - \cos x)/x = 0, \lim(x \to 0)(\sin(1/x)) \text{не существует}$$

конечного нет), (91)

тогда как $\lim \frac{x2-1}{x\to 1} = 2$ после разложения на множители. Инструменты $x - 1$ разрешения: разложение на множители, рационализация, стандартные пределы, асимптотическая эквивалентность, замена переменной, алгебраическая перегруппировка, теорема о двух милиционерах, разложения Тейлора и позднее) правило Лопиталя.

5.1.6 Асимптотическая эквивалентность конспект недели 4)

$f(x)$

$$f(x) \sim g(x)(x \to a) \Leftrightarrow \lim_{x \to a} f(x)/g(x) = 1,$$
$$(92) f(x) \sim g(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x)(1 + \varepsilon(x)), \varepsilon(x) \to 0,$$

$$(93) f \sim g \Leftrightarrow f = g + o(g).(94)$$

$$x^2/2, 1 - \cos x \sim x^2/2, e^x - 1 \sim x, (95)$$

При $x \to 0$: $\sin x \sim x, \tan x \sim x, 2, (95)$

$$(1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x(96)$$

$\ln(1+x) \sim x, (\alpha$ константа). $(96) \sin(0.01)$ Численно ≈ 0.999983 иллюстрирует «близко, но не равно». На 0.01 бесконечности доминирует член высшей степени:

$$(2x^3 + x)/(5x^2 - 1) \sim (2x^3)/(5x^2) = (\frac{2}{5})x(x \to \infty), (97)$$

Эквивалентности можно умножать и делить, но не добавлять в общем случае.

5.1.7 Символы Ландау: большое Oи малое oконспект недели 4)

$f(x) = O(g(x))(x \to a) \Leftrightarrow |f(x)|/|g(x)|$ остаётся ограниченной вблизи $a, (98)$

$$f(x) = o(g(x))(x \to a) \Leftrightarrow f(x)/g(x) \to 0 \text{при} x \to a, (99)$$

$$(99) f = o(g) ==> f = O(g); f = O(g) ==> f = o(g).(100) x2 = o(x), x3 = o(x2)$$

$(x \to 0)$; (101)

$$x = o(x^2), x^{10} = o(e^x)(x \to \infty).(102)$$

$(x \to \infty)$. (102)

$$3x = O(x) 3x \neq o(x)(x \to 0) \text{поскольку} (3x)/x = 3.(103) x^2/2 e^x = 1 + x + o(x);$$
$$e^x = 1 + x + x^2/2$$

$$+o(x^2). \sin x = x + o(x)(x \to 0); (104)$$

$\sin x = x + o(x)(x \to 0)$; (104)

$$2x^2 + 3x + 1 = 2x^2 + O(x)(104)$$

$(x \to \infty)$. (105) Словами: большое O означает, что f имеет не выше порядок величины g; малое o означает, что f становится пренебрежимой по сравнению с g. Осторожно: $f = O(g)$ не уравнение в обычном смысле — $O(g)$ обозначает целый класс функций.

5.2. OpenStax §2.3, контрольные задачи 2.11-2.20 — вопросы и полные решения

1. С помощью законов пределов вычислите $\lim_{x\to -3}(2x-1)\sqrt{x}+4$**, указывая закон на каждом шаге.**

[Источник: OpenStax §2.3, контрольная 2.11]

Решение. Оба предела множителей существуют, поэтому применим закон произведения: $\lim(2x-1)=2(-3)-1=-7$ сумма, разность, базовые пределы); $\lim\sqrt{x}+4=\sqrt{-}3+4=1$ закон корня). Произведение: $-7\cdot 1=-7$.

2. Вычислите $\lim_{x\to -2}(3x^3-2x+7)$**.**

[Источник: Контрольная 2.12]

Решение. Прямая подстановка оправдана (85): $3(-8)-2(-2)+7=-24+4+7=-13$.

3. Вычислите $\lim_{x\to -3}(x^2+4x+3)/(x^2-9)$**.**

[Источник: Контрольная 2.13]

Решение. Форма 0/0. Раскладываем оба: $(x^2+4x+3)/(x^2-9)=((x+1)(x+3))/((x+3)(x-3))=(x+1)/(x-3)$ при $x\neq -3$. Предел: $(-3+1)/(-3-3)=(-2)/(-6)=\frac{1}{3}$.

4. Вычислите $\lim_{x\to 5}(\sqrt{x-1}-2)/(x-5)$**.**

[Источник: Контрольная 2.14]

Решение. Форма 0/0. Умножаем на сопряжённое $\sqrt{x-1}+2$:

$$(\sqrt{x-1}-2)/(x-5)=(x-1-4)/((x-5)(\sqrt{x-1}+2))$$
$$1/(\sqrt{x-1}+2)(x\neq 5)$$

значит предел равен $1/(\sqrt{5-1}+2)=\frac{1}{4}$.

$$\lim_{x\to 5}(x-5)$$

5. Вычислите $\lim_{x\to -3}(1/(x+2)+1)/(x+3)$**.**

[Источник: Контрольная 2.15]

Решение. Упрощаем сложную дробь: $1/(x+2)+1=(x+3)/(x+2)$, поэтому выражение равно $(x+3)/((x+2)(x+3))=1/(x+2)$ при $x\neq -3$. Предел: $1/(-3+2)=-1$.

6. Вычислите $\lim\frac{1}{x\to 3x-3}-4$**.**

$$1/(x-3)-1/(x+1)$$

[Источник: Контрольная 2.16]

Решение. Раскладываем x^2- 2x $-3=(x-3)(x+1)$ и приводим:

$$1/(x-3)-4/((x-3)(x+1))=((x+1)-4)/((x-3)(x+1))$$
$$(x-3)/((x-3)(x+1))=1/(x+1)$$

$$(x\neq 3),$$

значит предел 1/4.

7. Кусочная контрольная: $f(x) = x^2 - x$ **при** $x \le 3$ **и** $f(x) = x + 4$ **при** $x > 3$**; вычислите односторонние пределы в стыке.**

[Источник: Контрольная 2.17]

Решение. Слева параболическая ветвь даёт $\lim_{x\to 3-} f(x) = 9$; справа прямая даёт $\lim_{x\to 3} +(x+4) = 7$. Неравны, значит $\lim_{x\to 3} f(x)$ не существует.

8. Вычислите limx$\to 1\frac{x+2}{(x-1)}2$ **метод примера 2.23).**

[Источник: Контрольная 2.18]

Решение. Числитель $\to 3$ ненулевой), знаменатель $\to 0^+$ с обеих сторон квадрат), поэтому отношение $\to +\infty$: бесконечный предел, и $x = 1$ — вертикальная асимптота.

9. С помощью теоремы о двух милиционерах вычислите $\lim_{x\to 0} x^2 \sin^1 \cdot_x$

[Источник: Контрольная 2.19]

Решение. Так как $-1 \le \sin\frac{1}{x} \le 1$, умножение на $x^2 \ge 0$ даёт $-x^2 \le x^2 \sin 1_x \le x^2$. Обе оценки $\to 0$; по (86) предел равен 0.

10. Вычислите $\lim \frac{1-cos}{\to 0 sin}$**.**

[Источник: Контрольная 2.20]

Решение. Делим числитель и знаменатель на θ законно, так как внутри предела $\not= 0$): $1 - \cos\theta 1 - \cos\theta - \to 0\theta$

$$(1 - \cos\theta)/(a\sin\theta) = 0, 1$$

$\sin\theta \sin\theta\theta$ используя $^{1-cos} \to 0$ пример 2.25) и $^{sin} \to 1$ стандартный предел). $\theta\theta$

5.3. OpenStax §2.3, упражнения 83–130 — вопросы и полные решения

5.3.1 Использование законов пределов (83-86)

1. $\lim_{x\to 0}(4x^2 - 2x + 3)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 83]

Решение. Подстановка по (85): $4(0)^2 - 2(0) + 3 = 3$.

2. $\lim \frac{x3+3x2+5}{x\to 1}$ **. 4−7x**

[Источник: §2.3, упр. 84]

Решение. Знаменатель при 1 равен $-3\not= 0$, поэтому закон частного и подстановка дают $^{1+3+5} = \frac{9}{-3} = -3$. $-3\surd$

$$\lim_{x\to 9} \sqrt{x^2 - 6x + 3}.$$

3. $\lim_{x\to -2}$

[Источник: §2.3, упр. 85]

Решение. Подкоренное выражение непрерывно при -2 и положительно там; закон корня: $\sqrt{4 + 12 + 3} = \sqrt{19}$.

4. $\lim_{x\to -1}(9x + 1)^2$**.**

[Источник: §2.3, упр. 86]

Решение. Закон степени, затем подстановка: $(9(-1) + 1)^2 = (-8)^2 = 64$.

5.3.2 Прямая подстановка (87–92)

1. $\lim_{x\to 7} x^2$**.**

[Источник: §2.3, упр. 87]

Решение. 49.

2. $\lim_{x\to -2}(4x^2-1)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 88]

Решение. $4(4)-1=15$.

3. $\lim \frac{1}{x\to 01+sinx}$**.**

[Источник: §2.3, упр. 89]

Решение. Знаменатель $1+\sin 0=\not{Y}=0$: закон частного даёт $\frac{1}{1}=1$.

4. $\lim_{x\to 2} e^{2x-x2}$**.**

[Источник: §2.3, упр. 90]

Решение. Показатель: $2(2)-4=0$; $e^0=1$.

5. $\lim \frac{2+7x}{x\to 1x+6}$**.**

[Источник: §2.3, упр. 91]

Решение. $\frac{2+7}{1+6}=9_7$**. 6.** $\lim_{x\to 3}\ln e^3 x$**.**

[Источник: §2.3, упр. 92]

Решение. $\ln e^3 x$ = 3x тождественно логарифм и экспонента взаимно обратны), поэтому предел $3\cdot 3=9$.

5.3.3 Неопределённость 0/0(93–102)

1. $\lim \frac{x2-16}{x\to 4x-4}$**.**

[Источник: §2.3, упр. 93]

Решение. Форма 0/0. Раскладываем: $^{(x-4)(x+4)}=x+4$ при $\not{x}=4$; предел $=8$. $x-4$

2. $\lim \frac{x-2}{x\to 2x2-2x}$**.**

[Источник: §2.3, упр. 94]

Решение. Раскладываем знаменатель: $\frac{x-2}{x(x-2)}=1_x$ при $\not{x}=2$; предел $=1_2$.

3. $\lim \frac{3x-18}{x\to 62x-12}$**.**

[Источник: §2.3, упр. 95]

Решение. $\frac{3(x-6)}{2(x-6)}=3_2$ при $\not{x}=6$; предел $=3_2$.

$$\lim_{h\to 0}((1+h)^2-1)/h$$

4. $\lim_{h\to 0}$**.** h

[Источник: §2.3, упр. 96]

Решение. $^{1+2h+h2-1}=^{h(2+h)}=2+h$; предел $=2$ это производная x^2 при 1). hh

5. $\lim \frac{t-9}{t\to 9t-3}$**.** $\sqrt{}$

[Источник: §2.3, упр. 97]

Решение. Форма 0/0. Умножаем на сопряжённое знаменателя: $\sqrt{}$

$$\lim_{t\to 9}(t-9)/(\sqrt{t}-3)=\lim_{t\to 9}(t-9)(\sqrt{t}+3)/((\sqrt{t}-3)(\sqrt{t}+3))$$

$$\lim_{t\to 9}(t-9)(\sqrt{t}+3)/(t-9)=\lim_{t\to 9}$$

$$(\sqrt{t}+3)=6(t\neq 9)$$

значит предел $9+3=6$.

6. Найдите $\lim_{h\to 0}(1/(a+h)-1/a)/h$**, где** a **— ненулевая действительная константа.**

[Источник: §2.3, упр. 98]

Решение. Приводим числитель: $^{a-(a+h)-h-1}$

$\lim_{h\to 0}(a^{a+h}-a^a)/h$, где a — ненулевая действительная константа.

Предел: $-\frac{1}{a2}$ производная $1/x$ при a).

7. $\lim \frac{sin}{\to tan}$**.**

[Источник: §2.3, упр. 99]

Решение. При $\not\theta=\pi$ вблизи π: $\frac{sin}{tan}=\sin\theta\cdot\cos\frac{}{sin}=\cos\theta$ сокращение законно, так как там $\sin\not\theta=0$). Предел: $\cos\pi=-1$.

8. $\lim \frac{x3-1}{x\to 1x2-1}$**.**

[Источник: §2.3, упр. 100]

Решение. Раскладываем оба: $^{(x-1)(x2+x+1)}{=}^{x2+x+1}$; предел $=\frac{3}{2}$.

$$(x-1)(x+1)/(x+1)$$

9. $\lim \frac{2x2+3x-2}{x\to 1/2}$ **. 2x−1**

[Источник: §2.3, упр. 101]

Решение. $2x^2+3x-2=(2x-1)(x+2)$; сокращаем до $x+2$; предел $=\frac{1}{2}+2=5_2$.

$$\sqrt{x+4}-1$$

10. $\lim_{x\to -3}$**.** $x+3$

$$\sqrt{x+4+1}$$

[Источник: §2.3, упр. 102]

Решение. Сопряжённое: умножаем на $\sqrt{x+4+1}$:

$$((x+4)-1)/\sqrt{x+4+1}=1/((x+3)(x+4+1)),(x\neq -3);$$

предел $=\frac{1}{1+1}=1_2$.

5.3.4 Формы $K/0$: односторонние бесконечные пределы (103–106)

1. $\lim_{x\to -2}{}^{-2x2+7x-4}$

$$(x+2)/(x-2)$$

[Источник: §2.3, упр. 103]

Решение. Раскладываем: числитель $=(2x-1)(x+4)$, знаменатель $=(x+2)(x-1)$. При $x=-2$ числитель равен $(-5)(2)=-10\not=0$, тогда как знаменатель $\to 0$: форма $K/0$. Знак вблизи -2: возьмём $x=-2.1$: $(x+2)<0,(x-1)<0$, значит знаменатель положителен; числитель около $-10<0$. Отношение $\to-\infty$.

2. $\lim_{x\to -2}{}^{+2x2+7x-4}$

$$(x+2)/(x-2)$$

[Источник: §2.3, упр. 104]

Решение. Тот же числитель; теперь $(x+2)>0, (x-1)<0$: знаменатель отрицателен. Отношение $\to +\infty$.

3. $\lim_{x\to 1} -^{2x2+7x-4}$

$$(x+2)/(x-2)$$

[Источник: §2.3, упр. 105]

Решение. Числитель при 1: $(1)(5) = 5 > 0$. При $x \to 1^{-}$: $(x+2) > 0, (x-1) < 0$, знаменатель отрицателен: отношение $\to -\infty$.

4. $\lim_{x\to 1} +^{2x2+7x-4}$

$$(x+2)/(x-2)$$

[Источник: §2.3, упр. 106]

Решение. Знаменатель положителен справа от 1: отношение $\to +\infty$. Двусторонние пределы при -2 и при 1 оба не существуют; $x=-2$ и $x=1$ — вертикальные асимптоты.)

5.3.5 Законы пределов с заданными пределами (107–114)

На протяжении всего: $\lim_{x\to 6} f(x) = 4$, $\lim_{x\to 6} g(x) = 9$, $\lim_{x\to 6} h(x) = 6$.

1. $\lim_{x\to 6}$ **2f** $(x)g(x)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 107]

Решение. Произведение, затем постоянный множитель: $2 \cdot 4 \cdot 9 = 72$.

$$: g(x) - 1$$

2. $\lim_{x\to 6} f(x)$**}.**

[Источник: §2.3, упр. 108]

Решение. Закон частного: $^{9-1} = 2$.

$$\lim_{x\to 6} f(x).$$

3. $\lim_{x\to 6} f(x) + \frac{1}{3}g(x)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 109]

Решение. Сумма и постоянный множитель: $4 + \frac{9}{3} = 7$.

4. $\lim_{x\to 6} h(x)$

[Источник: §2.3, упр. 110]

Решение. Закон степени: $6^3 = 216$. p

5. $\lim_{x\to 6} g(x) - f(x)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 111]

Решение. Разность, затем корень: $\sqrt{9} - 4 = \sqrt{5}$.

6. $\lim_{x\to 6} xh(x)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 112]

Решение. Закон произведения с $\lim x = 6$: $6 \cdot 6 = 36$.

7. $\lim_{x\to 6}[(x+1)f(x)]$**.**

[Источник: §2.3, упр. 113]

Решение. $(6+1)\cdot 4 = 28$.

8. $\lim_{x\to 6} f(x)g(x) - h(x)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 114]

Решение. $4 \cdot 9 - 6 = 30$.

5.3.6 Кусочные функции и пределы по графикам (115–125)

(

$$x^2 \le 3$$

1. $f(x) = x > 3$**: найдите** a**.** $\lim_{x\to 3^-} f, b$**.** $\lim_{x\to 3^+} f$**.** $x + 4$

[Источник: §2.3, упр. 115]

Решение. a. Параболическая ветвь: 9. b. Линейная ветвь: 7. Двусторонний предел НЕ существует.) (

$$(x^3 - 1)/x \le 0$$

2. $g(x) = x > 0$**: найдите** a**.** $\lim_{x\to 0^-} g, b$**.** $\lim_{x\to 0^+} g$**. 1**

$$0^3 - 1 = -1.$$

[Источник: §2.3, упр. 116]

Решение. a. Кубическая ветвь: b. Постоянная ветвь: 1. Двусторонний НЕ существует.)

(

$$x^2 - 2x + 1, x < 2$$

3. $h(x) = x \ge 2$**: найдите** a**.** $\lim_{x\to 2^-} h, b$**.** $\lim_{x\to 2^+} h$**.** $3 - x$

[Источник: §2.3, упр. 117]

Решение. a. $4-4+1 = 1$. b. $3-2 = 1$. Обе стороны согласованы: $\lim_{x\to 2} h(x) = 1 = h(2)$ — непрерывна там, несмотря на кусочное определение.

4. Пусть f **и** g **— два изображённые функции** ($V-$**образная** $f(x) = |x+2|$**; кусочная** g **с линейной левой ветвью** $g(x) = -x-6$ **и криволинейной правой ветвью), вычислите** $\lim_{x\to -3^+}(f(x) + g(x))$**.**

[Источник: §2.3, упр. 118]

Решение. С графика: $f(-3) = |-3+2| = 1$ и на криволинейной ветви $g(-3^+) = 1$. Закон суммы: $1 + 1 = 2$.

$$f(-3) - 3g(-3^-) = 1 - 3(-1) =$$

[Источник: §2.3, упр. 119]

Решение. Слева линейная ветвь даёт $g(-3^-) = -(-3)-6 = -3$... читая стык с графика, значение левой ветви при -3 равно -1; берём график-значение $g(-3^-) = -1$: $f(-3) - 3g(-3^-) = 1 - 3(-1) = 4$.

$$\lim_{x\to -3-}\left(f(x)-3g(x)\right)$$

6. $\lim_{x\to 0}$**. 3**

[Источник: §2.3, упр. 120]

Решение. $f(0)=|2|=2$; $g(0)=-2$ кривая проходит через (0, −2)). Произведение и частное: $^{2\cdot(-2)}=-\frac{4}{3}$. 3

$$7.\lim_{x\to 3}(2+g(x))$$

7. $\lim_{x\to -3} f(x)$**}.**

$$(2+g)/(-3-2)+(-1)/(2+1)$$

[Источник: §2.3, упр. 121]

Решение. Слева: $\lim_{x\to -3} f(x)\}=1$; справа: $\lim_{x\to -3} f(x)\}=3$. Односторонние

$$f(-3)=\frac{1}{2}$$

пределы различны, значит двусторонний предел не существует. $_2$.

8. $\lim_{x\to 1} f(x)$

[Источник: §2.3, упр. 122]

Решение. $f(1)=|3|=3$; закон степени: 9.

$P_3=(1)/(3)$; каноническая форма: 3.

9. $\lim_{x\to 1} f(x)-g(x)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 123]

Решение. С графика, $g(1)=-5$ и $f(1)=3$: разность 8; кубический корень: $_3\sqrt{8}=2$.

10. $\lim_{x\to -7} xg(x)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 124]

Решение. При $x=-7$ линейная ветвь даёт $g(-7)=-(-7)-6=1$; произведение: $(-7)(1)=-7$.

11. $\lim_{x\to -9}[xf(x)+2g(x)]$**.**

[Источник: §2.3, упр. 125]

Решение. $f(-9)=|-7|=7$; $g(-9)=9-6=3$; $(-9)(7)+2(3)=-63+6=-57$.

5.3.7 Теорема о двух милиционерах и приложения (126–130)

T Верно или неверно: если 2x$-1\le g(x)\le x^2-$2x$+3$ вблизи $x=2$, то $\lim_{x\to 2} g(x)=0$.

[Источник: §2.3, упр. 126]

Решение. Неверно. Обе оценки при $x=2$ равны $2(2)-1=3=4-4+3$, поэтому по теореме о двух милиционерах $\lim_{x\to 2} g(x)=3$, а не 0. Теорема даёт ровно общий предел оценок.)$T\lim_{\to 0}\theta^2\cos\,^{1}$.

[Источник: §2.3, упр. 127]

Решение. $-1\le\cos\,^{1}\le 1$ даёт $-\theta^2\le\theta^2\cos 1\le\theta^2$; обе оценки $\to 0$; сжатие: предел $=0$. $(0,x$ рационально

1. $\lim_{x\to 0} f(x)$**, где** $f(x)=x$ **иррационально.**

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 0$$

[Источник: §2.3, упр. 128]

Решение. Для всех x: $0 \le f(x) \le x^2$ рациональное x даёт 0; иррациональное x даёт $x^2 \ge 0$). Поскольку $0 \to 0$ и $x^2 \to 0$, теорема о двух милиционерах заставляет $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ — даже при том, что f разрывна дикая образом в каждой точке x $\not= 0$. $^{q}10^{-19}$; вычислите $\lim_{r\to 0} +E(r)$ и T Закон Кулона: $E(r) =$ при $q =$

$$E(r) = fracq4\pi\varepsilon_0 r^2$$

интерпретируйте; почему справа?

[Источник: §2.3, упр. 129]

Решение. Числитель — положительная константа; при $r \to 0^+$ знаменатель $\to 0^+$, значит $E(r) \to +\infty$: величина поля растёт неограниченно, когда пробная точка приближается к заряду. Только $r \to 0^+$ имеет смысл, потому что r — расстояние и не может быть отрицательным и $r = 0$ — само местоположение заряда). T Плотность $\rho = m/V$ даёт $V(\rho) = \frac{m}{}$; при $m = 8$ кг вычислите $\lim_{\to 0} +V(\rho)$ и объясните физический смысл.

[Источник: §2.3, упр. 130]

; при $\rho \to 0^+$ объём $\to +\infty$:

Решение. $V(\rho) =$ объект фиксированной массы, но исчезающей плотности должен занимать неограниченный объём формальное высказывание «идеального газа, истончающегося»). Приближение справа — единственный физический вариант, так как плотность положительна.

5.4. Разобранные примеры конспекта недели 4 — вопросы и полные решения

1. Покажите, что $\lim_{x\to 1}(x^2-1)/(x-1)$ имеет форму 0/0, и вычислите его; сравните с $\lim_{x\to 0} x/x, \lim_{x\to 0} x^2/x, \lim_{x\to 0} x/x^2$.

[Источник: Конспект недели 4, неопределённости]

Решение. Подстановка $x = 1$ даёт $\frac{0}{0}$ — неопределённость. Раскладывая: $(x-1)(x+1) = x+1$ при $x \not= 1$, значит предел 2. Три сравнения разрешают $x - 1$

$$\lim_{x\to 1}(x^2-1)/(x-1), \lim_{x\to 0} x^x, \lim_{x\to 0} x^2, \lim_{x\to 0} x^x$$

2

ту же форму 0/0 в три разных исхода: $= 1 \to 1$; $= x \to 0$; $=$

$$\lim_{x}(x-1)/(x-1)$$

$\to \pm\infty$ конечного двустороннего предела нет). Именно поэтому 0/0 не несёт[1] автоматического значения: исход зависит от того, как числитель и знаменатель приближаются к нулю.

2. Используя стандартный предел $\lim \frac{sinx}{x\to 0} = 1$, вычислите $\lim_{x\to 0}$. xx^{sin5x}

[Источник: Конспект недели 4, стандартные пределы]

Решение. Замена $u =$ 5x так $u \to 0$ при $x \to 0$): $^{sin5x} = 5^{\cdot sin5x} = 5^{\cdot sinu} \to 5 \cdot 1 = 5$. x 5x u

3. Используя асимптотическую эквивалентность, вычислите $\lim_{x\to 0}$ **и 5x** $\lim \frac{sin3x1-cosx}{x\to 0}$**.**

$$\sin 3x/5x{\sim}3x/5x$$

[Источник: Конспект недели 4, асимптотика]

Решение. Поскольку sin 3x ~ 3x при $x \to 0, \sin$ 3x/5x ~ 3x/5x $= \frac{3}{5}$, значит предел равен 3/5. Поскольку $1 - \cos x$ ~ $x^2/2, (1 - \cos x)/x^2$ ~ 1/2, значит предел равен 1/2.

$$\lim_{x\to 0}(\sin^3 x)/(5x) = \frac{1}{5}(16)$$

стандартный предел (87) через эквивалентность.

4. Покажите, что 3x^2**+ 5x − 1 ~ 3x**^{2} **при** $x \to \infty$**, и вычислите** $\lim_{x\to\infty}(2x^3 + x)/(5x^2 - 1)$ **через эквивалентности.**

[Источник: Конспект недели 4, эквивалентность на бесконечности]

Решение. $(3x^2 + 5x - 1)/$3x$^2 = 1 + 5/(3x) - 1/(3x^2) \to 1$ при $x \to \infty$, поэтому 3x^2+ 5x − 1 ~ 3x^2.

$\lim_{x\to\infty}(3x^2 + 5x - 1)/(3x^2) = 1 + 0 - 0 = 1$, эквивалентность установлена:

член высшей степени управляет долгосрочным поведением. Тогда $(2x^3+x)/(5x^2-1) \approx (\frac{2}{5})x$.

$\lim_{x\to\infty}(2x^3 + x)/(5x^2 - 1) = (\frac{2}{5})x$, что $\to +\infty$; точнее, отношение исходной дроби к $(\frac{2}{5})x$ стремится к 1.

5. Покажите, что $\sin x = O(x)$ **при** $x \to 0$**, и что 3x** $= O(x)$**, но 3x** $= o(x)$**.**

[Источник: Конспект недели 4, символы Ландау]

Решение. Неравенство $|\sin x| \le |x|$ верно для всех действительных x стандартный геометрический факт), что в точности означает

$$|\sin x| \le 3|x|$$

ограниченность $_{|x|}$: $\sin x = O(x)$. Для 3x: $= 3$ ограничено, значит $|x|$ 3x $= O(x)$; но $\frac{3x}{x} = 3 \to 0$, поэтому 3x $= o(x)$. Это нагляднейшая иллюстрация различия O и o: большое O допускает любое ограниченное отношение, малое o требует обращения отношения в нуль.

6. Проверьте $x^2 = o(x)$ **при** $x \to 0$ **и** $x = o(x^2), x^{10} = o(e^x)$ **при** $x \to \infty$**.**

x^2 - 2x $+x = o(x)$ вблизи нуля.

[Источник: Конспект недели 4, символы Ландау]

Решение. $= x \to 0$: На бесконечности $=$

$x^2 = o(x)$ при $x \to 0$. (16)

$o(x^{1/2})$; $x^{10}/e^x \to 0$ по стандартному пределу $\lim_{x\to\infty} x^n/e^x \to 0(88)$: экспоненциальный рост в конце концов доминирует над любой фиксированной степенью.

7. Запишите $\sin x$ **~** x **и** $e^x = 1 + x + \frac{x2}{2} + o(x^2)$ **на языке малого** o**. Почему** $f(x) = O(g(x))$ **не обычное уравнение?**

[Источник: Конспект недели 4, соотношения]

Решение. По $(94), f$ ~ g тогда и только тогда, когда $f = g + o(g)$: значит $\sin x$ ~ x переписывается как $\sin x = x + o(x)$ — ошибка пренебрежима по сравнению с x. Для экспоненты $e^x = 1 + x + o(x)$ верно, потому что $^{ex-1-x} \to 0, x$ а сохранение ещё одного члена даёт $e^x = 1+x+\frac{x2}{2}+o(x^2)$. Наконец, $f = O(g)$ не уравнение, потому что

$O(g)$ обозначает целый класс функций, ограниченных постоянными кратными g; запись $2x^2+3x+1 = 2x^2 + O(x)$ означает в точности, что остаток $3x+1$ растёт не быстрее постоянного кратного x.

6. Дополнения из учебников — дополнительные упражнения обязательного чтения с полными решениями

6.1. OpenStax §1.2 (Базовые классы функций) — избранные упражнения решены

1. Для каждой пары точек найдите наклон прямой через них и скажите, возрастает прямая, убывает, горизонтальна или вертикальна: (59) (−2, 4) и (1, 1); (61) (3, 5) и (−1, 2); (63) (2, 3) и (5, 7); (65) (2, 4) и (1, 4); (66) (1, 4) и (1, 0).

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 59–66]

Решение. Наклон $m = (y_2-y_1)/(x_2-x_1)$. $(59) m = (-5-1)/(2-(-4)) = -\frac{6}{6} = -1$: убывает. $(61) m = 4 > 0$: возрастает. $(63) m = (7-3)/(5-2) = \frac{4}{3}$: возрастает. $(65) m = (4-4)/(1-2) = 0$: горизонтальна. $(66) \Delta x = 0$: вертикальна, наклон не определён.

2. Запишите уравнение в форме наклон-сдвиг: (67) наклон −6, через (1, 3); (70) наклон $\frac{2}{5}$, точка пересечения с x равна 8; (71) через (2, 1) и (−2, −1); (73) пересечения: x в 5 и y в −3.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 67–73]

Решение. $(67) y-3 = -6(x-1) \Rightarrow y = -6x+9$. (70) пересечение с x в 8 означает точку (8, 0): $y-0 = \frac{2}{5}(x-8) \Rightarrow y = 2_5x - \frac{16}{5}$. $(71) m = -\frac{1-1}{-2-2} = -\frac{2}{-4} = 1_2$; $y-1 = \frac{1}{2}(x-2) \Rightarrow y = 1_2x$. (73) через (5, 0) и (0, −3): $m = -\frac{3-0}{0-5} = 3_5$; $y = 3_5x - 3$.

3. (75–76) Для каждого линейного уравнения укажите наклон m и сдвиг b: $y = 2x - 3$; $y = -\frac{1}{7}x + 1$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 75–76]

Решение. $(75) m = 2, b = -3$. $(76) m = -\frac{1}{7}, b = 1$.

4. (81–82) Перепишите с наклоном и сдвигом: $2x + 3y = 6$; $6x - 5y + 15 = 0$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 81–82]

Решение. $(81) y = 2 - \frac{2}{3}x$: $m = -\frac{2}{3}, b = 2$. $(82) y = 6_5x + 3$: $m = 6_5, b = 3$.

5. (83–86) Для каждого многочлена: степень; нули; сдвиг по y; поведение на концах; чётность. a. $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$; c. $f(x) = x^3 + 3x^2 - x - 3$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 83–86]

Решение. a. Степень 2; $2x^2-3x-5 = (2x-5)(x+1)$: нули $\frac{5}{2}$ и -1; сдвиг -5; ветви вверх старший коэффициент $2 > 0$), значит $f \to +\infty$ на обоих концах; не чётная и не нечётная из-за нечётного члена $-3x$ и константы). c. Степень 3; проба $x = -1$: $-1 + 3 + 1 - 3 = 0$, значит $(x+1)$ — множитель: $x^3 + 3x^2 - x - 3 = (x+1)(x^2-1) = (x+1)(x-1)(x+1) = (x-1)(x+1)^2$: нули 1 простой) и -1 двойной); сдвиг -3; куб со старшим коэффициентом положительным: $f \to +\infty$ при $x \to +\infty, f \to -\infty$ при $x \to -\infty$; не чётная и не нечётная.

6. (88–91) Опишите график g исходя из базового графика: $(88) g(x) = x^2 - 1$; $(89) g(x) = (x+3)^2 + 1$; $(90) g(x) = \sqrt{x} + 2$; $(91) g(x) = -\sqrt{x} - 1$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 88–91]

Решение. (88) Парабола $y = x^2$, сдвинутая вниз на 1. (89) Парабола, сдвинутая влево на 3 и вверх на 1 вершина $(-3, 1)$). (90) График корня, сдвинутый влево на 2

область $[-2, \infty)$). (91) График корня, отражённый относительно оси x и сдвинутый вниз на 1 область $[0, \infty)$, значения ≤ -1). (

$$f(x) = 4x + 3, x \leq 0; (9)$$

7. $(94) f(x) = x > 0$**: вычислите** $f(-3), f(0), f(2)$**; изобразите.**

$$-x + 1$$

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 94]

Решение. $f(-3) = 4(-3) + 3 = -9$ левая ветвь); $f(0) = 3$; $f(2) = -2 + 1 = -1$ правая ветвь). График: возрастающая прямая до (0, 3), затем убывающая прямая из открытой точки (0, 1) — скачкообразный разрыв при 0. (

$$f(x) = (x - 3)/(x - 2), x \neq 2$$

8. $(97) g(x) = x = 2$**: вычислите** $g(0), g(-4), g(2)$**. 4,**

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 97]

Решение. $g(0) = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$; $g(-4) = \frac{3}{-6} = -\frac{1}{2}$; $g(2) = 4$ по специальному определению формула там не определена — именно поэтому дано кусочное значение). $\sqrt[3]{x}$ —

9. Верно или неверно (98–103): $(98) f(x) = \frac{4x+1}{7x-2}$ **трансцендентна;** $(99) g(x) =$ **нечётная корневая функция; (100) логарифмическая функция алгебраична;** $(101) f(x) = x^b$ **с действительной константой** b **— экспоненциальная функция; (102) область определения корня чётной степени — все действительные числа; (103) компания купила оборудование за $20,500, через 3 года стоит $12,300 — найдите** $V(t)$ **и интерпретируйте.**

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 98–103]

Решение. (98) Неверно: отношение многочленов рационально, значит алгебраично, а не трансцендентно. (99) Верно: кубические корни определены для всех действительных и функция нечётна. (100) Неверно: x^b — степенная функция; логарифмы трансцендентны. (101) Неверно: у экспоненты переменная в показателе, b^x. (102) Неверно: корни чётной степени требуют неотрицательного подкоренного, поэтому область исключает отрицательные нечётные корни принимают все действительные). (103) Линейная амортизация: $V(t) = 20500 + ^{12300-20500}\, t = 320500 - \frac{8200}{3}t \approx 20500 - 2733.33t$. $V(0) = 20500$ — цена покупки; пересечение с t при $t \approx 7.5$ лет — момент обнуления стоимости; $V(5) = 20500 - ^{41000} \approx$ \$6833. 3

6.2. OpenStax §1.5 (Экспоненциальные и логарифмические функции) — избранные упражнения решены

1. (239–245) Изобразите; укажите область определения, множество значений, горизонтальную асимптоту: a**.** $f(x) = e^x + 2$**;** b**.** $f(x) = -2^x$**;** c**.** $f(x) = 1 - 2^{-x}$**;** d**.** $f(x) = e^{-x} - 1$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 239–245]

Решение. a. e^x, сдвинутая вверх на 2: область R, значения $(2, \infty)$, асимптота $y = 2$. b. Отражение относительно оси x: область R, значения $(-\infty, 0)$, асимптота $y = 0$. c. При $x \to +\infty, 2^{-x} \to 0$, значит $f \to 1$ снизу; при $x \to -\infty, 2^{-x} \to \infty$, значит $f \to -\infty$: возрастает, значения $(-\infty, 1)$, асимптота $y = 1$. d. Зеркало e^x затухание вправо): область R, значения $(-1, \infty)$, асимптота $y = -1$.

2. (246–253) Перепишите в эквивалентной экспоненциальной форме: a**.** $\log_3 81 = 4$**;** b**.** $\log_8 2 = \frac{1}{3}$**;** c**.** $\log_5 1 = 0$**;** d**.** $\ln 1_{e3} = -3$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 246–253]

Решение. По (39): a. $3^4 = 81$. b. $8^{1/3} = 2$. c. $5^0 = 1$. d. $e^{-3} = 1/e^3$.

3. (254–262) Перепишите в эквивалентной логарифмической форме: a**.** $2^3 = 8$**;**

b**.** $4^{-2} = \frac{1}{16}$**;** c**.** $10^2 = 100$**;** d**.** $3^4 = 81$**;** e**.** $3^3 = 27$**;** f**.** $9^y = 150$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 254–262]

Решение. a. $\log_2 8 = 3$. b. $\log_{1/4} 16 = -2$. c. $\log 100 = 2$. d. $\log_{1/3} x$ означает показатель: $(\frac{1}{3})^y = x$; $\log_{64} 4 = \frac{1}{3}$. f. $\log_9 150 = y$.

4. (264–266) Изобразите; укажите область определения, множество значений, вертикальную асимптоту: a**.** $f(x) = 3 + \ln x$**;** b**.** $f(x) = \ln(x - 1)$**;** c**.** $f(x) = \ln(-x)$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 264–266]

Решение. a. $\ln x$, сдвинутый вверх на 3: область $(0, \infty)$, значения R, вертикальная асимптота $x = 0$. b. Сдвиг вправо на 1: область $(1, \infty)$, значения R, асимптота $x = 1$. c. Отражение относительно оси y: область $(-\infty, 0)$, значения R, асимптота $x = 0$.

5. (270–275) Раскройте по законам логарифмов: a**.** $\log x^4$**;** b**.** $\log \frac{9a3}{b}$**;** c**.** $\ln ab$**;** d**.** $p \log_5$ **125xy**^{3}**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 270–275]

Решение. a. $4 \log x$. b. $\log 9 + 3 \log a - \log b = 2 \log 3 + 3 \log a - \log b$. c. $\ln a + \frac{1}{3} \ln b$. d. $\frac{1}{5} \log_5(125\text{xy}^3) = 1_5(3 + \log_5 x + 3 \log_5 y)$.

6. (276–283) Решите точно: a**.** $5^x = 125$**;** b**.** $e^3 x - 15 = 0$**;** c**.** $8^x = 4$**;** d**.** $4^{x+1} - 32 = 0$**;** e**.** $3^{x/14} = \frac{1}{10}$**;** f**.** $10^x = 7.21$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 276–283]

Решение. a. $x = 3$ так как $125 = 5^3$). b. 3x $= \ln 15, x = \frac{ln15}{}\approx 0.9027$. c. $2^3 x = 2^2, 3x = \frac{2}{3}$. d. $4^{x+1} = 2^5 \Rightarrow 2^{2x+2} = 2^5 \Rightarrow x = 3\frac{x}{14} \ln 3 = -\ln 10$, $x = -\frac{14ln10}{2}$. e. ≈ -29.32. f. $\ln 3x = \log 7.21 \approx 0.8580$.

7. (284–291) Решите точно, если возможно: a**.** $\log_3 x = 0$**;** b**.** $\log_5 x = -2$**;** c**.** $\log_3(x + 5) = 0$**;** d**.** $\log_2(2x - 7) = 0$**;** e**.** $\ln \sqrt{x} + 3 = 2$**;** f**.** $\log_6(x + 9) + \log_6 x = 2$**;** g**.** $\log_4(x + 2) - \log_4(x - 1) = 0$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 284–291]

Решение. a. $x = 3^0 = 1$. b. $x = 5^{-2} = \frac{1}{25}$. c. $x + 5 = 3^0 = 1, x = -4$; проверяем область $x + 5 > 0$: $1 > 0 OK$, значит $x = -4$ подходит ($\log_3 1 = 0$). d. 2x $-7 = 1, x = 4$. e. $\sqrt{x} + 3 = e^2, x = e^4 - 3 \approx 51.60$. f. Объединяем: $\log_6$

$$\log_6(x(x + 9)) = 2$$

$x(x + 9) = 36 \Rightarrow x^2 +$ 9x $-36 = 0 \Rightarrow (x + 12)(x - 3) = 0$; область требует $x > 0$, значит $x = 3$. g. $\log \frac{x+2}{4x-1} = 0 \Rightarrow \frac{x+2}{x-1} = 1 \Rightarrow x + 2 = x - 1$: невозможно; решений нет.

8. (292–297) Переход к другому основанию, приближение до четырёх знаков: a**.** $\log_5 47$**;** b**.** $\log_2 82$**;** c**.** $\log_{0.5} 211$**;** d**.** $\log_{0.2} 0.452$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 292–297]

Решение. По (41): a. $\frac{ln47}{ln5} \approx 2.3922$. b. $\frac{ln82}{ln2} \approx 6.3576$. c. $\frac{ln211}{ln0.5} \approx -7.7181$. d. $\frac{ln0.452}{ln0.2} \approx 0.3536$.

9. (307) Колония бактерий удваивается за 12 часов, изначально 1000. a**. Используя** $Q = Q_0 e^{kt}$**, найдите** k**;** b**. сколько времени до 200,000?**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 307]

Решение. a. Удвоение: $2 = e^{12}k$, значит $k = \frac{ln2}{12} \approx 0.0578$ в час. b. $200000 = 1000\mathrm{e}^{kt}$: $e^{kt} = 200$, $t = {}^{ln200} = {}^{12ln200} \approx 92.1$ часов. $k \ln 2$

10. (308) Популяция кроликов удваивается каждые 6 месяцев, изначально 120. a. Используя $P = P_0a^t$, найдите a; b. когда достигнет 3500?

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 308]

Решение. a. $a = 2$ за 6-месячный период или в год: при t в годах $a = 4$; за 6 месяцев $a = 2$). b. $3500 = 120 \cdot 2^t$ при t в 6-месячных единицах): $2^t = \frac{175}{6} \approx 29.17$, $t = \log_2 29.17 = {}^{ln29.17} \approx 4.87$ периодов, т.е. около 2.4 лет. $\ln 2$

11. (309) Землетрясение 1906 года в Сан-Франциско имело магнитуду 8.3; японское землетрясение того же года — 4.9. Насколько интенсивнее было Сан-Франциско шкала Рихтера)?

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 309]

Решение. Отношение интенсивностей по Рихтеру: $10^{8.3-4.9} = 10^{3.4} \approx 2512$: землетрясение в Сан-Франциско было примерно в 2500 раз интенсивнее — наглядная демонстрация логарифмической шкалы из (40).

6.3. OpenStax §2.2 — табличные упражнения (42–45) решены

1. Оцените $\lim_{t\to 0+} \cos t/t$ по таблице $(t = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001)$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 42]

Решение. Значения: $t = 0.1$: $0.\frac{995004}{0}.1 = 9.95004$; $t = 0.01$: $0.\frac{99995}{0}.01 = 99.995$; $t = 0.001$: $0.\frac{9999995}{0}.001 = 999.9995$; $t = 0.0001$: 9999.95. Значения растут неограниченно: числитель $\to 1$, знаменатель $\to 0^+$ — форма $K/0^+$, поэтому предел равен $+\infty$.

$$\lim_{t\to 0+} \cos(t)/t = +\infty$$

2. Оцените $\lim_{x\to 2}(x-2)/(x^3-4x)$ по таблице.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 43]

Решение. Сначала упрощаем: $(x-2)/(x^3-4x) = (x-2)/(x(x-2)(x+2)) = 1/(x(x+2))$ при $x \neq 2$. Значения таблицы: $x = 1.99$: $1/(1.99 \cdot 3.99) = \frac{1}{7}.9401 \approx 0.1259$; $x = 2.01$: $1/(2.01 \cdot 4.01) = \frac{1}{8}.0601 \approx 0.1241$ — приближаются к $0.125 = \frac{1}{8}$. Алгебра подтверждает таблицу: предел $1/(2 \cdot 4) = \frac{1}{8}$. T Угадайте по таблице, затем проверьте по графику: $\lim_{\to 0} \sin(\pi/\theta)$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 44]

Решение. Значения: $\theta = 0.1$: $\sin(10\pi) = 0$; 0.01: $\sin(100\pi) = 0$; 0.001: $\sin(1000\pi) = 0$; 0.0001: 0. Таблица наводит на 0 — но $\sin(\pi/\theta)$ колеблется между -1 и 1 бесконечно быстро вблизи 0 например, $\theta = \frac{2}{3}$ даёт $\sin(3\pi/2) = -1$, а $\theta = \frac{2}{5}$ даёт $\sin(5\pi/2) = 1$). Предел не существует; таблица обманула, потому что точки выборки $1/n$ — в точности нули синуса. Это предостерегающее упражнение о табличном методе. T Угадайте по таблице, затем проверьте по графику: $\lim_{\to 0+}(1/\alpha) \cdot \cos(\pi/\alpha)$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 45]

Решение. При $\alpha = 1/n$: $(1/\alpha) \cdot \cos(n\pi) = n \cdot (-1)^n$ — значения $\pm n$ растут по модулю и чередуют знак. График колеблется между всё большими положительными и отрицательными значениями: предел не существует ни $+\infty$, ни $-\infty$ — знаки чередуются). Таблица в удачных точках ($\alpha = 1/(2n)$ даёт $+2\mathrm{n} \to +\infty$) вводила бы в заблуждение в противоположную сторону.