ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 января 2023 г. № 4

Об утверждении клинических протоколов

На основании абзаца девятого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», подпункта 8.3 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) со сверхкомплектными зубами» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с аномалиями формы и размеров зубов» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с крапчатыми зубами» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с гипоплазией эмали» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с наследственными нарушениями структуры зубов» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с нарушением прорезывания зубов» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с изменением цвета твердых тканей зубов после прорезывания» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с изменением цвета зубов вследствие применения тетрациклина» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с ретенированными и импактными зубами» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с кариесом постоянных зубов» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с сошлифовыванием (абразивным износом) зубов» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с другим уточненным сошлифовыванием зубов (абфракционным дефектом)» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с эрозией зубов» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с отложениями на зубах» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с чувствительным дентином» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с болезнями пульпы постоянных зубов» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с болезнями периапикальных тканей постоянных зубов» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с эндопериодонтитом» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с периодонтитом» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с гингивитом» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с рецессией десны» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) со стоматитом и родственными поражениями» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с кандидозным стоматитом» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с болезнью губ (хейлитом)» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с лейкоплакией» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с болезнями языка» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с переломом постоянного зуба» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с вывихом постоянного зуба» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.

Министр Д.Л.Пиневич

СОГЛАСОВАНО

Брестский областной исполнительный комитет

Витебский областной исполнительный комитет

Гомельский областной исполнительный комитет

Гродненский областной исполнительный комитет

Могилевский областной исполнительный комитет

Минский областной исполнительный комитет

Минский городской исполнительный комитет

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь

Министерство внутренних дел Республики Беларусь

Министерство обороны Республики Беларусь

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Национальная академия наук Беларуси

Управление делами Президента Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.01.2023 № 4

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

«Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с другим уточненным сошлифовыванием зубов (абфракционным дефектом)»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Настоящий клинический протокол определяет общие требования к объему оказания медицинской помощи на терапевтическом и ортопедическом стоматологических приемах в амбулаторных условиях пациентам (взрослое население) с другим уточненным сошлифовыванием зубов (абфракционным дефектом) (шифр по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра К03.18 Другое уточненное сошлифовывание зубов).
- 2. Требования настоящего клинического протокола являются обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством о здравоохранении.
- 3. Для целей настоящего клинического протокола используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», а также следующий термин и его определение:

другое уточненное сошлифовывание зубов (абфракционный дефект) — некариозное поражение тканей зуба, имеющее форму выемки или клина, возникающее вследствие многократного воздействия боковых окклюзионных нагрузок.

ГЛАВА 2 ПРИЗНАКИ И КРИТЕРИИ ДРУГОГО УТОЧНЕННОГО СОШЛИФОВЫВАНИЯ ЗУБОВ (АБФРАКЦИОННОГО ДЕФЕКТА)

- 4. Признаки другого уточненного сошлифовывания зубов (абфракционного дефекта): дефект в пришеечной области, имеет клиновидную форму с острыми краями, глубокий, небольшой по площади.
- 5. Критерии другого уточненного сошлифовывания зубов (абфракционного дефекта): быстропроходящая боль от раздражителей вследствие убыли твердых тканей зуба; данные анамнеза (медленная убыль тканей в течение нескольких лет), наличие атипичной окклюзионной силы.

ГЛАВА 3 ДИАГНОСТИКА ДРУГОГО УТОЧНЕННОГО СОШЛИФОВЫВАНИЯ ЗУБОВ (АБФРАКЦИОННОГО ДЕФЕКТА)

6. Основными принципами диагностики другого уточненного сошлифовывания зубов (абфракционного дефекта) являются:

выявление факторов, влияющих на возникновение и развитие другого уточненного сошлифовывания зубов (абфракционного дефекта), а также определение медицинских показаний к лечению, выбор метода лечения и тактики врача-специалиста;

дифференциальная диагностика другого уточненного сошлифовывания зубов (абфракционного дефекта);

выявление взаимосвязи стоматологического и общего здоровья, наличия вредных привычек с возникновением другого уточненного сошлифовывания зубов (абфракционного дефекта).

7. Обязательными диагностическими мероприятиями являются:

сбор анамнеза;

внешний осмотр и пальпация челюстно-лицевой области;

осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов;

зондирование, перкуссия, оценка состояния твердых тканей зубов, зубных рядов, пломб и протезов (при их наличии), оценка состояния слизистой оболочки полости рта, тканей периодонта;

индексная оценка стоматологического здоровья: индекс интенсивности кариеса зубов – КПУ, гигиенический индекс Green, Vermillion – OHI-S.

8. Дополнительными диагностическими мероприятиями (по медицинским показаниям) являются:

консультация врача-специалиста (врача общей практики, врача-стоматолога-ортопеда, врача-стоматолога-ортодонта);

инструментальные диагностические исследования (лучевые методы исследования): прицельная контактная внутриротовая рентгенография или ортопантомография челюстей или конусно-лучевая компьютерная томография зубов;

индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба (далее – ИРОПЗ): при индексной оценке оценивается соотношение площади дефекта на окклюзионной поверхности ко всей площади окклюзионной поверхности зуба;

физический метод исследования: электроодонтометрия;

фотографирование для оценки твердых тканей зуба.

ГЛАВА 4 ЛЕЧЕНИЕ ДРУГОГО УТОЧНЕННОГО СОШЛИФОВЫВАНИЯ ЗУБОВ (АБФРАКЦИОННОГО ДЕФЕКТА)

9. Принципами лечения другого уточненного сошлифовывания зубов (абфракционного дефекта) являются:

устранение факторов, обусловливающих процесс абфракции;

предупреждение дальнейшего развития патологического процесса;

сохранение и восстановление анатомической формы зуба и функциональной способности всей зубочелюстной системы.

- 10. Терапевтические лечебные мероприятия у пациентов с другим уточненным сошлифовыванием зубов (абфракционным дефектом) (проводятся врачом-стоматологом-терапевтом) включают:
 - 10.1. обязательные лечебные мероприятия:

гигиенические мероприятия (мотивация и обучение гигиене полости рта с использованием лечебно-профилактических зубных паст, профессиональное удаление зубных отложений до показателей гигиенического индекса OHI-S \leq 0,3-0,6 балла);

при глубине дефекта менее 2 мм проводится реминерализирующая терапия;

при глубине дефекта более 2 мм препарирование полости с последующим пломбированием стеклоиономерными цементами;

10.2. дополнительные лечебные мероприятия (по медицинским показаниям):

обезболивание с использованием лекарственных средств, применяемых при лечении пациентов (взрослое население) с другим уточненным сошлифовыванием зубов (абфракционным дефектом), согласно приложению;

при глубине дефекта менее 2 мм применяются десенситайзеры;

при глубине дефекта более 2 мм препарирование полости с последующим пломбированием композиционными материалами, компомерами или гиомерами; или

препарирование полости с последующим пломбированием ее композиционными материалами в виде винира; или использование прокладочного материала, с последующим пломбированием композиционными материалами, компомерами или гиомерами.

11. Ортопедическое лечение (проводится врачом-стоматологом-ортопедом) пациентов с другим уточненным сошлифовыванием постоянных зубов (абфракционным дефектом) включает:

обезболивание по медицинским показаниям с использованием лекарственных средств, применяемых при лечении пациентов (взрослое население) с другим уточненным сошлифовыванием зубов (абфракционным дефектом), согласно приложению;

препарирование под искусственные коронки, вкладки, виниры;

изготовление временных конструкций (исключение – препарированные зубы под штампованные коронки);

получение аналоговых или оптических (3D) оттисков;

определение и фиксацию центрального соотношения челюстей или центральной окклюзии при помощи восковых или пластмассовых базисов с окклюзионными валиками или окклюзионных силиконовых материалов;

выбор цвета, размера и формы искусственных коронок, вкладок, виниров в соответствии с имеющимися зубами и индивидуальными особенностями пациента;

наложение и припасовку каркаса коронки;

наложение и припасовку готовой коронки, вкладки, винира;

фиксацию коронки на временный материал (по медицинским показаниям);

фиксацию коронки, вкладки, винира на постоянный материал;

рекомендации по гигиеническому уходу за зубным протезом, правилам адаптации и срокам замены конструкций.

При ИРОПЗ от 0,4 до 0,6 показано изготовление вкладок, виниров; при ИРОПЗ от 0,6 до 0,8 — изготовление искусственных коронок; при ИРОПЗ более 0,8 — применение штифтовых конструкций с последующим изготовлением искусственных коронок.

12. Медицинское наблюдение за результатами лечения рекомендовано осуществлять путем проведения медицинских осмотров пациентов с другим уточненным сошлифовыванием постоянных зубов (абфракционным дефектом) врачом-стоматологом-терапевтом через 6 месяцев после завершения терапевтического лечения. Последующее медицинское наблюдение за состоянием зубов и зубных протезов (при их наличии) выполняют 2 раза в год (каждые 6 месяцев).

Приложение

к клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с другим уточненным сошлифовыванием зубов (абфракционным дефектом)»

Лекарственные средства, применяемые при лечении пациентов (взрослое население) с другим уточненным сошлифовыванием зубов (абфракционным дефектом)

№ п/п		Лекарственные формы, дозировки	Способ применения, режим дозирования		
D0	D04AB Местные анестетики для наружного применения				
1		применения 100 мг/мл во флаконах 50 мл	Одну порцию (1—3 нажатия на дозирующий клапан) аэрозоля наносят на слизистую оболочку полости рта или десну. Лекарственное средство можно также наносить путем смазывания смоченным в нем ватным тампоном		

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2023, 8/39541

N0	N01B Лекарственные средства для местной анестезии					
	Лидокаин/Хлоргексидин		Для аппликационной анестезии слизистой			
	_		оболочки полости рта, в т. ч. перед			
			инъекционной анестезией.			
			Разовую дозу врач-специалист назначает			
			индивидуально, учитывая состояние области			
			нанесения лекарственного средства и общее			
			состояние пациента			
3			Лекарственное средство предназначено			
			для инъекционного применения в полости рта			
			и может вводиться только в ткани, где			
			отсутствует воспаление.			
			При выполнении одной лечебной процедуры			
			взрослым можно вводить артикаин в дозе			
		раствор для инъекций (40 мг +	до 7 мг на 1 кг массы тела. Отмечено, что			
			пациенты хорошо переносили дозы до 500 мг			
			(соответствует 12,5 мл раствора для инъекций)			
		раствор для инъекций (40 мг +				
		0,012 мг)/мл в картриджах				
		1,7 мл (в ампулах 2 мл)				