

Teorema de Koning

Blanca

7 de abril de 2018

El teorema de K  ning dice que $\sum_{i=1}^k f_i(x_i - a) = \sum_{i=1}^k f_i(x_i - \bar{x}) + (a - \bar{x})^2$

Demostraci  n

$$\sum_{i=1}^k f_i(x_i - a) = \sum_{i=1}^k f_i(x_i - a)^2 - \sum_{i=1}^k f_i 2ax_i + \sum_{i=1}^k f_i a^2$$

Aplicando la definici  n de media $\bar{x} = \sum_{i=1}^k f_i x_i$ y sacando factor com  n a^2 en el   ltimo sumando y sabiendo que $\sum_{i=1}^k f_i = 1$ resulta:

$$\sum_{i=1}^k f_i x_i^2 - 2a\bar{x} + a^2$$

sumando $\bar{x}^2 - \bar{x}^2$ y asociando en forma de binomio, queda:

$$\sum_{i=1}^k f_i x_i^2 - \bar{x} + (a - \bar{x})^2$$

volvemos a sumar $\bar{x}^2 - \bar{x}^2$ y aplicando la definici  n de media y la de sumatoria de frecuencias relativas resulta:

$$\sum_{i=1}^k f_i x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^k f_i x_i + \sum_{i=1}^k f_i \bar{x}^2 + (a - \bar{x})^2$$

Sacando factor com  n las sumatorias y viendo que eso es el desarrollo de un binomio:

$$\sum_{i=1}^k f_i(x_i - \bar{x}) + (a - \bar{x})^2$$

Que es lo que pretend  amos demostrar.