

**Corso di Laurea: Ingegneria Informatica**  
**Testo n.34 - Esame di Fisica Generale sessione del 24/07/2020**

**Nome:**

**Matricola:**

**Cognome:**

**Anno di Corso:**

**ESERCIZIO.1 – Meccanica**

Un blocco assimilabile ad punto materiale di massa  $m= 14.7$  kg può muoversi senza attrito su un piano orizzontale. Al blocco sono collegate due molle ideali di costanti elastiche  $k_1= 235 \text{ Nm}^{-1}$  e  $k_2= 571 \text{ Nm}^{-1}$  , rispettivamente, come mostrato in figura. Nella posizione  $x_0=0$  m il blocco è in equilibrio e le molle sono a riposo. All'istante  $t=0$  s il blocco  $m$  viene lasciato, da fermo, dalla posizione  $x= 79$  cm . Determinare:

1) il periodo  $T$  delle oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio:

$$T = \dots\dots\dots$$

2) la legge oraria del punto per  $t \geq 0$  s e il modulo della massima accelerazione  $|a_{max}|$  raggiunta dal punto durante il suo moto:

$$|a_{max}| = \dots\dots\dots ; \quad x(t) = \dots\dots\dots$$

3) l'energia cinetica  $E_k$  del punto al tempo  $t=T/ 13$  (con  $T$  periodo del moto oscillatorio):

$$E_k = \dots\dots\dots$$



*(Figura qualitativa a solo scopo illustrativo)*

## ESERCIZIO.2 – Elettromagnetismo

I due solenoidi in figura sono rettilinei, di lunghezza infinita, coassiali con l'asse in comune lungo l'asse  $Z$  e hanno raggi  $r_1 = 15 \text{ mm}$  e  $r_2 = 129 \text{ mm}$ . I solenoidi hanno entrambi  $n = 4.09 \cdot 10^5 \text{ spire m}^{-1}$  e sono percorsi da una medesima corrente  $i_0 = 49 \text{ A}$  ma in versi opposti, come rappresentato in figura. Si determinino:

1) Il grafico di  $B(r)$  in funzione della distanza  $r$  dall'asse  $Z$  e

il versore  $\mathbf{u}_B$  nella direzione e verso di  $|\vec{B}|$  dovunque risulti  $\vec{B}(r, \varphi, z) \neq (0; 0; 0) \forall r \geq 0; \forall \varphi \in [0, 2\pi]; \forall z \in \mathbb{R}$

$$\mathbf{u}_B = \dots\dots\dots$$

2) Calcolare l'intensità del campo magnetico  $|\vec{B}(0, \varphi, z)| \forall \varphi \in [0, 2\pi]; \forall z \in \mathbb{R}$

$$|\vec{B}(0, \varphi, z)| = \dots\dots\dots$$


Intorno ai due solenoidi, e coassialmente ad essi, viene collocata una spira circolare, di raggio  $r_3 = 42 \text{ cm}$  e resistenza ohmica  $R = 466 \Omega$ , mentre la corrente che scorre nei solenoidi viene fatta variare con legge  $i(t) = 17.8 t$ . Determinare:

3) Indicare in che verso circola la corrente nella spira (orario o antiorario) motivando la risposta.

Determinare la f.e.m. indotta  $\mathcal{E}_i$  lungo la spira

$$\mathcal{E}_i = \dots\dots\dots$$

**Costanti Utili:**  $\mu_0 = 1.257 \cdot 10^{-6} \text{ TmA}^{-1}$



(Figura qualitativa a solo scopo illustrativo)