Corso di Laurea: Ingegneria Informatica

Testo n.32 - Esame di Fisica Generale sessione del 03/07/2020

Nome: Matricola:

Cognome: Anno di Corso:

ESERCIZIO.1 - Meccanica

Una sfera omogenea di massa m=73.0 kg e raggio r=56 cm rotola senza strisciare con velocità $v_{cm}=9.2$ ms⁻¹ lungo un piano orizzontale. La sfera urta inelasticamente uno scalino di altezza h=25 cm nel punto P come mostrato in Figura.

Rispondere nell'ipotesi che la sfera non slitti e rimanga in contatto con il punto P dove urta lo scalino:

1) Calcolare l'energia cinetica di rotazione della sfera \mathbf{E}_k un istante prima dell'urto:


$$E_k =$$

2) Calcolare l'energia cinetica di rotazione della sfera \mathbf{E}_k un istante dopo l'urto:

$$E_k =$$

3) Trovare la minima velocità v^* che permette alla sfera di superare il gradino:

$$v^* = \dots$$



(Figura qualitativa a solo scopo illustrativo)

${\bf ESERCIZIO.2-Elettromagnetismo}$

Un avvolgimento è realizzato con N=29 strati di un filo conduttore di resistività $\rho=2.7\ 10^{-3}\ \Omega$ m disposti lungo due semi-circonferenze di raggio r=48.7 cm e ortogonali come rappresentato in Figura. Nell'avvolgimento scorre una corrente $i=7.4\ \Lambda$

1) Determinare le componenti del versore \vec{u}_{μ} nella direzione e verso del momento di dipolo magnetico su questo avvolgimento

$$\vec{u}_{\mu} = \dots$$

L'avvolgimento viene immerso in una regione nella quale è presente un campo magnetico $\vec{B} = (12.0 \ \hat{i} + 10.5 \ \hat{j})$ T


2) Determinare l'energia potenziale magnetica (U) dell'avvolgimento

$$U = \dots$$

Si mantiene l'avvolgimento immerso nel campo magnetico e la corrente in esso cirolante. Per t=0 s si mette in rotazione l'avvolgimento con velocità angolare $\vec{\Omega}=0.346$ $\hat{\bf k}$ rad/s

3) Determinare la potenza dissipata nell'avvolgimento all'istante $t^*=12.2 \text{ s}$

$$P(t^*) = \dots$$



(Figura qualitativa e non in scala a scopo illustrativo)