Corso di Laurea: Ingegneria Informatica

 $\overline{\text{Testo n.56}}$ - Esame di Fisica Generale sessione del 03/07/2020

Nome: Matricola:

Cognome: Anno di Corso:

ESERCIZIO.1 - Meccanica

Una sfera omogenea di massa $m=65.0~{\rm kg}$ e raggio $r=179~{\rm cm}$ rotola senza strisciare con velocità $v_{cm}=58.2~{\rm ms}^{-1}$ lungo un piano orizzontale. La sfera urta inelasticamente uno scalino di altezza $h=111~{\rm cm}$ nel punto P come mostrato in Figura.

Rispondere nell'ipotesi che la sfera non slitti e rimanga in contatto con il punto P dove urta lo scalino:

1) Calcolare il momento angolare della sfera L_i rispetto a P un istante prima dell'urto:


$$L_i =$$

2) Calcolare l'energia cinetica di rotazione della sfera \mathbf{E}_k un istante dopo l'urto:

$$E_k =$$

3) Trovare la minima velocità v^* che permette alla sfera di superare il gradino:

$$v^* = \dots$$



(Figura qualitativa a solo scopo illustrativo)

ESERCIZIO.2 - Elettromagnetismo

Un avvolgimento è realizzato con N=31 strati di un filo conduttore di resistività $\rho=9.0\ 10^{-3}\ \Omega$ m disposti lungo due semi-circonferenze di raggio r=71.8 cm e ortogonali come rappresentato in Figura. Nell'avvolgimento scorre una corrente i=2.7 A

1) Determinare le componenti del momento di dipolo magnetico $(\vec{\mu})$ su questo avvolgimento

$$\vec{\mu} = \dots$$

L'avvolgimento viene immerso in una regione nella quale è presente un campo magnetico $\vec{B} = (3.7 \ \hat{i} + 11.2 \ \hat{j}) \ T$


2) Determinare l'energia potenziale magnetica (U) dell'avvolgimento

$$U = \dots$$

Si mantiene l'avvolgimento immerso nel campo magnetico e la corrente in esso cirolante. Per t=0 s si mette in rotazione l'avvolgimento con velocità angolare $\vec{\Omega}=0.107~\hat{\bf k}$ rad/s

3) Determinare la potenza dissipata nell'avvolgimento all'istante $t^* = 9.5 \text{ s}$

$$P(t^*) = \dots$$



(Figura qualitativa e non in scala a scopo illustrativo)