Corso di Laurea: Ingegneria Informatica

Testo~n.43 - Esame di Fisica Generale sessione del 24/07/2020

Nome: Matricola:

Cognome: Anno di Corso:

ESERCIZIO.1 – Meccanica

Un blocco assimilabile ad punto materiale di massa $m=13.8~{\rm kg}$ può muoversi senza attrito su un piano orizzontale. Al blocco sono collegate due molle ideali di costanti elastiche $k_1=133~{\rm Nm}^{-1}$ e $k_2=601~{\rm Nm}^{-1}$, rispettivamente, come mostrato in figura. Nella posizione $x_0=0$ m il blocco è in equilibrio e le molle sono a riposo. All'istante t=0 s il blocco m viene lasciato, da fermo, dalla posizione $x=138~{\rm cm}$. Determinare:

1) la frequenza ν delle oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio:


 $\nu =$

2) la legge oraria del punto per $t \ge 0$ s e il modulo della massima accelerazione $|a_{max}|$ raggiunta dal punto durante il suo moto:

 $|a_{max}| = \dots ; \qquad x(t) = \dots$

3) l'energia meccanica totale E_{tot} del punto al tempo t=T/5 (con T periodo del moto oscillatorio):

 $E_{tot} = \dots$



(Figura qualitativa a solo scopo illustrativo)

ESERCIZIO.2 - Elettromagnetismo

I due solenoidi in figura sono rettilinei, di lunghezza infinita, coassiali con l'asse in comune lungo l'asse Z e hanno raggi r_1 = 9 mm e r_2 = 85 mm . I solenoidi hanno entrambi n= 6.26 10^5 spire m⁻¹ e sono percorsi da una medesima corrente i_0 = 36 A ma in versi opposti, come rappresentato in figura. Si determinino:

1) Il grafico di B(r) in funzione della distanza r dall'asse Z e il versore \mathbf{u}_B nella direzione e verso di $|\vec{B}|$ dovunque risulti $\vec{B}(r,\varphi,z) \neq (0;0;0) \ \forall r \geq 0 \ ; \ \forall \varphi \in [0,2\pi] \ ; \ \forall z \in \mathbb{R}$

$${\bf u}_B =$$

2) Calcolare l'intensità del campo magnetico $|\vec{B}\left(\frac{(r_1+r_2)}{2},\varphi,z\right)| \ \forall \varphi \in [0,2\pi] \ ; \ \forall z \in \mathbb{R}$


$$|\vec{B}\left(\frac{(r_1+r_2)}{2},\varphi,z\right)| = \dots$$

Intorno ai due solenoidi, e coassialmente ad essi, viene collocata una spira circolare, di raggio $r_3 = 77$ cm e resistenza ohmica $R = 126 \Omega$, mentre la corrente che scorre nei solenoidi viene fatta variare con legge i(t) = 13.8 t. Determinare:

3) Indicare in che verso circola la corrente nella spira (orario o antiorario) motivando la risposta. Determinare la potenza P dissipata in (mW) sulla spira per effetto Joule

$$P =$$

Costanti Utili: $\mu_0 = 1.257 \ 10^{-6} \ \mathrm{TmA^{-1}}$



(Figura qualitativa a solo scopo illustrativo)