Corso di Laurea: Ingegneria Informatica Testo ${ m n.9}$ - Esame di Fisica Generale sessione del ${ m 03/07/2020}$

Nome:	Matricola:
Nome:	Matricola

Cognome: Anno di Corso:

ESERCIZIO.1 - Meccanica

Una sfera omogenea di massa m=39.0 kg e raggio r=97 cm rotola senza strisciare con velocità $v_{cm}=11.2$ ms⁻¹ lungo un piano orizzontale. La sfera urta inelasticamente uno scalino di altezza h=52 cm nel punto P come mostrato in Figura.

Rispondere nell'ipotesi che la sfera non slitti e rimanga in contatto con il punto P dove urta lo scalino:

1) Calcolare il momento angolare della sfera L_i rispetto a P un istante prima dell'urto:


$$L_i =$$

2) Calcolare la velocità angolare della sfera ω_f un istante dopo l'urto:

$$\omega_f = \dots$$

3) Trovare la minima velocità v^* che permette alla sfera di superare il gradino:

$$v^* =$$



(Figura qualitativa a solo scopo illustrativo)

ESERCIZIO.2 - Elettromagnetismo

Un avvolgimento è realizzato con N=49 strati di un filo conduttore di resistività $\rho=7.3\ 10^{-3}\ \Omega$ m disposti lungo due semi-circonferenze di raggio r=47.8 cm e ortogonali come rappresentato in Figura. Nell'avvolgimento scorre una corrente $i=9.1\ \Lambda$

1) Determinare le componenti del momento di dipolo magnetico $(\vec{\mu})$ su questo avvolgimento

$$\vec{\mu} = \dots$$

L'avvolgimento viene immerso in una regione nella quale è presente un campo magnetico $\vec{B} = (14.3 \,\hat{\mathbf{i}} + 10.0 \,\hat{\mathbf{j}})$ T


2) Determinare l'energia potenziale magnetica (U) dell'avvolgimento

$$U = \dots$$

Si mantiene l'avvolgimento immerso nel campo magnetico e la corrente in esso cirolante. Per t=0 s si mette in rotazione l'avvolgimento con velocità angolare $\vec{\Omega}=0.668~\hat{\bf k}$ rad/s

3) Determinare la potenza dissipata nell'avvolgimento all'istante $t^*=10.0 \text{ s}$

$$P(t^*) = \dots$$



(Figura qualitativa e non in scala a scopo illustrativo)