

## Esercizio

Una particella si muove lungo l'asse  $x$  seguendo la seguente legge oraria

$$x(t) = x_0 + \alpha t^2 - b t^3 \quad (1)$$

1. Determinare le unità di misura delle costanti  $\alpha$  e  $b$ .

Si supponga ora  $x_0 = 1 \text{ m}$ ,  $\alpha = 1 \text{ m/s}^2$  e  $b = \frac{1}{3} \text{ m/s}^3$ .

2. Calcolare la velocità e l'accelerazione della particella all'istante  $t = 2 \text{ s}$ ;
3. Calcolare la velocità massima della particella nell'intervallo temporale  $t \in [0 \text{ s}; 4 \text{ s}]$ ;
4. Determinare gli scostamenti massimi  $x_d > 0$  (verso destra) e  $x_s < 0$  (verso sinistra) che la particella ha rispetto all'origine nell'intervallo temporale  $t \in [0 \text{ s}; 4 \text{ s}]$ ;
5. Disegnare il grafico della legge oraria nell'intervallo temporale  $t \in [0 \text{ s}; 4 \text{ s}]$ .

## SOLUZIONE

1. Siccome l'espressione (1) riguarda una coordinata spaziale, ciascuno dei tre addendi deve avere la dimensione di m. Pertanto

$$m = [\alpha t^2] = [\alpha] s^2 \quad \Rightarrow \quad [\alpha] = \frac{m}{s^2} \quad (2)$$

$$m = [b t^3] = [b] s^3 \quad \Rightarrow \quad [b] = \frac{m}{s^3} \quad (3)$$

2. • Anzitutto calcoliamo l'espressione della velocità e dell'accelerazione ad un generico istante  $t$ .

La velocità è la derivata temporale della legge oraria  $x(t)$ . Pertanto

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 2\alpha t - 3bt^2 \quad (4)$$

L'accelerazione è, a sua volta, la derivata temporale della velocità  $v(t)$ , e dunque

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 2\alpha - 6bt \quad (5)$$

- Valutiamo ora queste espressioni generali all'istante particolare  $t = 2s$ .

Dalla (4) abbiamo

$$\begin{aligned} v(t = 2s) &= 2 \cdot \left(1 \frac{m}{s^2}\right) (2s) - 3 \cdot \frac{1}{3} \frac{m}{s^3} (2s)^2 = \\ &= 4 \frac{m}{s} - 4 \frac{m}{s} = \\ &= 0 \frac{m}{s} \end{aligned} \quad (6)$$

Per l'accelerazione, dalla (5) abbiamo

$$\begin{aligned} a(t = 2s) &= 2 \cdot \left(1 \frac{m}{s^2}\right) - 6 \cdot \frac{1}{3} \frac{m}{s^3} (2s) = \\ &= 2 \frac{m}{s^2} - 4 \frac{m}{s^2} = \\ &= -2 \frac{m}{s^2} \end{aligned} \quad (7)$$

Notiamo che l'accelerazione è negativa, il che significa che all'istante  $t = 2s$  la particella sta diminuendo la sua velocità. Dato che la velocità è nulla, ne deduciamo che l'istante  $t = 2s$  è l'istante a partire dal quale la particella comincia ad acquisire velocità negativa, ossia l'istante a partire dal quale inizia a tornare indietro (NB: ciò *non* significa che la particella si trovi nell'origine, ma semplicemente che sta iniziando a tornare verso sinistra).

3. Per calcolare la velocità massima nell'intervallo  $t \in [0\text{ s}; 4\text{ s}]$  osserviamo anzitutto che l'espressione (4) trovata per la velocità rappresenta una parabola rovesciata. Per determinare il massimo di  $v(t)$  occorre dunque:

- determinare i punti in cui si annulla la derivata di  $v(t)$  (ossia in cui si annulla l'accelerazione  $a(t)$ ); dalla (5) abbiamo che

$$\begin{aligned} a(t) &= 2\alpha - 6bt = 0 \\ \Rightarrow t^* &= \frac{\alpha}{3b} \end{aligned} \quad (8)$$

In tale istante la velocità vale [vedi la (4)]

$$\begin{aligned} v^* &= v(t^*) = 2\alpha t^* - 3bt^{*2} = \\ &= 2\alpha \frac{\alpha}{3b} - 3b \left(\frac{\alpha}{3b}\right)^2 = \\ &= \frac{2}{3} \frac{\alpha^2}{b} - \frac{1}{3} \frac{\alpha^2}{b} \\ &= \frac{1}{3} \frac{\alpha^2}{b} \end{aligned} \quad (9)$$

Sostituendo i valori numerici abbiamo

$$\begin{aligned} v^* &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1^2 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^4}}{\frac{1}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}^3}} = \\ &= 1 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned} \quad (10)$$

- valutare  $v(t)$  ai punti estremali dell'intervallo. Dalla (4) abbiamo

$$v_1 = v(t = 0\text{ s}) = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (11)$$

e

$$\begin{aligned} v_2 &= v(t = 4\text{ s}) = 2 \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} (4\text{ s}) - 3 \cdot \frac{1}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}^3} (4\text{ s})^2 = \\ &= 8 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 16 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \\ &= -8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned} \quad (12)$$

- Confrontando i valori (10), (11) e (12) osserviamo che nell'intervallo  $t \in [0\text{ s}; 4\text{ s}]$ :

-in valore assoluto la velocità massima si registra all'istante  $t = 4\text{ s}$ , è negativa in segno (verso sinistra) e vale  $v_2 = -8\text{ m/s}$

-la velocità massima in avanti (verso destra) si registra all'istante  $t^* = \alpha/(3b) = 1\text{ s}$  e vale  $v^* = +1\text{ m/s}$ .

4. Per calcolare lo scostamento massimo dall'origine nell'intervallo  $t \in [0 \text{ s}; 4 \text{ s}]$  dobbiamo valutare i massimi della legge oraria  $x(t)$ . Di nuovo, per determinare i massimi occorre:

- determinare gli istanti in cui si annulla la derivata di  $x(t)$  (ossia in cui si annulla la velocità  $v(t)$ ); dalla (4) abbiamo che

$$v(t) = 2\alpha t - 3bt^2 = t(2\alpha - 3bt) = 0 \quad (13)$$

da cui abbiamo due soluzioni:

$$t_a = 0 \text{ s} \quad (14)$$

$$t_b = \frac{2\alpha}{3b} = 2 \text{ s} \quad (15)$$

In tali istanti la posizione vale [vedi la (1)]

$$\begin{aligned} x_a &= x(t_a) = x_0 + \alpha t_a^2 - b t_a^3 = \\ &= x_0 + 0 + 0 = \\ &= 1 \text{ m} \quad (\text{positivo, quindi a destra dell'origine}) \end{aligned} \quad (16)$$

e

$$\begin{aligned} x_b &= x(t_b) = x_0 + \alpha t_b^2 - b t_b^3 = \\ &= x_0 + \alpha \left(\frac{2\alpha}{3b}\right)^2 - b \left(\frac{2\alpha}{3b}\right)^3 = \\ &= x_0 + \frac{4\alpha^3}{9b^2} - \frac{8\alpha^3}{27b^2} = \\ &= x_0 + \frac{4\alpha^3}{27b^2} = \\ &= 1 \text{ m} + \frac{4 \frac{\text{m}^3}{\text{s}^6}}{27 \cdot \frac{1}{9} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^6}} = \\ &= 1 \text{ m} + \frac{4}{3} \text{ m} = \\ &= \frac{7}{3} \text{ m} = \\ &= 2.33 \text{ m} \quad (\text{positivo, quindi a destra dell'origine}) \end{aligned} \quad (17)$$

- valutare  $x(t)$  agli istanti estremali dell'intervallo. L'istante estremo  $t = 0$  è già stato considerato in quanto è risultato essere anche un punto in cui si annulla la derivata  $v(t)$ ; per l'istante estremo  $t = 4 \text{ s}$ , dalla (1) abbiamo

$$\begin{aligned} x_2 &= x(t = 4 \text{ s}) = 1 \text{ m} + \frac{\text{m}}{\text{s}^2} (4 \text{ s})^2 - \frac{1 \text{ m}}{3 \text{ s}^3} (4 \text{ s})^3 = \\ &= 1 \text{ m} + 16 \text{ m} - \frac{64}{3} \text{ m} = \\ &= \frac{3 + 48 - 64}{3} \text{ m} = \\ &= -\frac{13}{3} \text{ m} \\ &= -4.33 \text{ m} \quad (\text{negativo, quindi a sinistra dell'origine}) \end{aligned} \quad (18)$$

- Confrontando i valori (16), (17) e (18) osserviamo che nell'intervallo  $t \in [0\text{ s}; 4\text{ s}]$ :

-lo scostamento massimo verso destra vale  $x_d = +2.33\text{ m}$  e si registra all'istante  $t_b = 2\alpha/(3b) = 2\text{ s}$

-lo scostamento massimo verso sinistra vale  $x_s = -4.33\text{ m}$  e si registra all'istante  $t = 4\text{ s}$ .

5. Dagli elementi trovati in precedenza, possiamo tracciare il grafico della legge oraria. In particolare

- all'istante  $t = 0$  abbiamo  $x(0) = 1\text{ m}$ ; ai primi istanti la legge oraria vale  $x(t) \simeq x_0 + \alpha t^2$  con  $\alpha > 0$ , quindi è una parabola che cresce;
- a grandi tempi,  $x(t) \sim \mathcal{O}(t^3)$  ed è negativo;
- la derivata si annulla agli istanti  $t = 0$  e  $t_b = 2\alpha/(3b) = 2\text{ s}$ ;
- lo scostamento massimo verso destra vale  $x_d = +2.33\text{ m}$  e si registra all'istante  $t_b = 2\alpha/(3b) = 2\text{ s}$ ;
- lo scostamento massimo verso sinistra vale  $x_s = -4.33\text{ m}$  e si registra all'istante  $t = 4\text{ s}$ .

Da queste informazioni possiamo tracciare il grafico mostrato in Fig.1




Figure 1: Andamento della legge oraria  $x(t)$  della posizione [Eq.(1)] e  $v(t)$  della velocità [Eq.(4)].