RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TEKNIK EKSTUBASI**		
	No.Dokumen 400.7.3.4 / 1228 / 2026	No.Revisi 0.2	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Waka Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Pengangkatan pipa jalan napas dari trachea
TUJUAN	1. Mencegah kerusakan dinding saluran pernapasan bagian atas dari penekanan ETT secara terus menerus. 2. Supaya pasien dapat bernapas seperti semula (secara normal melalui hidung) 3. Memberi perasaan nyaman terhadap pasien 4. Supaya pasien dapat batuk dengan efektif dan dapat mengeluarkan sputum sendiri.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	**A. Standar Alat :** 1. Trolley emergency 2. Laryngoscope 3. Peralatan suction lengkap 4. Spuit 20 cc 5. Sarung tangan (handschoen) 6. Masker O2 dan perlengkapannya 7. Bag Mask Valve (Airviva) **B. Prosedur :** 1. Mendorong trolley emergency mendekat kesisi tempat tidur pasien untuk persiapan agar dapat mengantisipasi segera apabila ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**TEKNIK EKSTUBASI**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1228/2026	No.Revisi 0.2	Halaman : 2/2
	2. Beritahu pasien akan rencana pengangkatan pipa ETT dan cuci tangan. 3. Injeksi dexametason biasanya sesuai dengan instruksi dokter (10 mg IV ± ¼ -½ jam sebelum extubasi). 4. Pasien dianjurkan napas dalam dan batuk. 5. Lakukan pengisapan sekresi sampai bersih 6. Plester tube dilepas dan diberikan O2 100% melalui ET menggunakan ambubag. Suction kateter dimasukkan kedalam tube, ditarik bersama suction kateter sambil memutar, penarikan ETT dilakukan pada saat inspirasi. 7. Selesai pengangkatan ETT beri O2 dengan konsentrasi 5- 8 lt / mnt dengan menggunakan masker non rebreathing 8. Observasi ketat tanda-tanda sesak napas, suara per napasan, tanda-tanda vital dan AGD (bila diperlukan). 9. Bersihkan alat-alat dan cuci tangan.		
UNIT TERKAIT	ICU		