

课后答案网，用心为你服务！



[大学答案](#) --- [中学答案](#) --- [考研答案](#) --- [考试答案](#)

最全最多的课后习题参考答案，尽在课后答案网（www.khdaw.com）！

Khdaw团队一直秉承用心为大家服务的宗旨，以关注学生的学习生活为出发点，

旨在为广大学生朋友的自主学习提供一个分享和交流的平台。

爱校园（www.aixiaoyuan.com） 课后答案网（www.khdaw.com） 淘答案（www.taodaan.com）

信息安全数学基础习题答案

第一章 整数的可除性

- 证明: 因为 $2|n$ 所以 $n=2k, k \in \mathbb{Z}$
 $5|n$ 所以 $5|2k$, 又 $(5, 2)=1$, 所以 $5|k$ 即 $k=5k_1, k_1 \in \mathbb{Z}$
 $7|n$ 所以 $7|2 \cdot 5k_1$, 又 $(7, 10)=1$, 所以 $7|k_1$ 即 $k_1=7k_2, k_2 \in \mathbb{Z}$
 所以 $n=2 \cdot 5 \cdot 7 k_2$ 即 $n=70 k_2, k_2 \in \mathbb{Z}$
 因此 $70|n$
- 证明: 因为 $a^3-a=(a-1)a(a+1)$
 当 $a=3k, k \in \mathbb{Z}$ 则 $3|a$ 则 $3|a^3-a$
 当 $a=3k-1, k \in \mathbb{Z}$ 则 $3|a+1$ 则 $3|a^3-a$
 当 $a=3k+1, k \in \mathbb{Z}$ 则 $3|a-1$ 则 $3|a^3-a$
 所以 a^3-a 能被 3 整除。
- 证明: 任意奇整数可表示为 $2k_0+1, k_0 \in \mathbb{Z}$
 $(2k_0+1)^2=4k_0^2+4k_0+1=4k_0(k_0+1)+1$
 由于 k_0 与 k_0+1 为两连续整数, 必有一个为偶数, 所以 $k_0(k_0+1)=2k$
 所以 $(2k_0+1)^2=8k+1$ 得证。
- 证明: 设三个连续整数为 $a-1, a, a+1$ 则 $(a-1)a(a+1)=a^3-a$
 由第二题结论 $3|(a^3-a)$ 即 $3|(a-1)a(a+1)$
 又三个连续整数中必有至少一个为偶数, 则 $2|(a-1)a(a+1)$
 又 $(3, 2)=1$ 所以 $6|(a-1)a(a+1)$ 得证。
- 证明: 构造下列 k 个连续正整数列:
 $(k+1)!+2, (k+1)!+3, (k+1)!+4, \dots, (k+1)!+(k+1), k \in \mathbb{Z}$
 对数列中任一数 $(k+1)!+i=i[(k+1)k \cdots (i+1)(i-1) \cdots 2 \cdot 1+1], i=2, 3, 4, \dots, (k+1)$
 所以 $i|(k+1)!+i$ 即 $(k+1)!+i$ 为合数
 所以此 k 个连续正整数都是合数。
- 证明: 因为 $191^{1/2} < 14$, 小于 14 的素数有 2, 3, 5, 7, 11, 13
 经验算都不能整除 191 所以 191 为素数。
 因为 $547^{1/2} < 24$, 小于 24 的素数有 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23
 经验算都不能整除 547 所以 547 为素数。
 由 $737=11 \cdot 67, 747=3 \cdot 249$ 知 737 与 747 都为合数。
- 解: 存在。eg: $a=6, b=2, c=9$
- 证明: $p_1 p_2 p_3 | n$, 则 $n = p_1 p_2 p_3 k, k \in \mathbb{N}^+$
 又 $p_1 \leq p_2 \leq p_3$, 所以 $n = p_1 p_2 p_3 k \geq p_1^3$ 即 $p_1^3 \leq n^{1/3}$
 p_1 为素数 则 $p_1 \geq 2$, 又 $p_1 \leq p_2 \leq p_3$, 所以 $n = p_1 p_2 p_3 k \geq 2 p_2 p_3 \geq 2 p_2^2$
 即 $p_2 \leq (n/2)^{1/2}$ 得证。
- 解: 小于等于 $500^{1/2}$ 的所有素数为 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 依次删除这些素数的倍数可得所求素数:
- 证明: 反证法
 假设 $3k+1$ 没有相同形式的素因数, 则它一定只能表示成若干形如 $3k-1$ 的素数相乘。
 $(3k_1+1)(3k_2+1)=[(3k_1+1)k_2+k_1] \cdot 3+1$ 显然若干个 $3k+1$ 的素数相乘, 得

到的还是 $3k+1$ 的形式，不能得出 $3k-1$ 的数，因此假设不成立，结论得证。
同理可证其他。

13. 证明：反证法

假设形如 $4k+3$ 的素数只有有限个，记为 p_1, p_2, \dots, p_n

因为 $4k+3=4k'-1=4k-1$ 构造 $N=4*p_1*p_2*\dots*p_n-1 \geq 3*p_1*p_2*\dots*p_n$

所以 $N > p_i$ ($i=1, 2, \dots, n$)

N 为 $4k-1$ 形式的素数，即为 $4k+3$ 的形式，所以假设不成立。

原结论正确，形如 $4k+3$ 的素数有无穷多个。

28. (1) 解： $85=1*55+30$

$$55=1*30+25$$

$$30=1*25+5$$

$$25=5*5$$

$$\text{所以 } (55, 85)=5$$

(2) 解： $282=1*202+80$

$$202=2*80+42$$

$$80=1*42+38$$

$$42=1*38+4$$

$$38=9*4+2$$

$$4=2*2$$

$$\text{所以 } (202, 282)=2$$

29. (1) 解： $2t+1=1*(2t-1)+2$

$$2t-1=(t-1)*2+1$$

$$2=2*1$$

$$\text{所以 } (2t+1, 2t-1)=1$$

(2) 解： $2(n+1)=1*2n+2$

$$2n=n*2$$

$$\text{所以 } (2n, 2(n+1))=2$$

32. (1) 解： $1=3-1*2$

$$=3-1*(38-12*3)$$

$$=-38+13*(41-1*38)$$

$$=13*41-14*(161-3*41)$$

$$=-14*161+55*(363-2*161)$$

$$=55*363+(-124)*(1613-4*363)$$

$$=(-124)*1613+551*(3589-2*1613)$$

$$=551*3589+(-1226)*1613$$

$$\text{所以 } s=-1226 \quad t=551$$

(2) 解： $1=4-1*3$

$$=4-1*(115-28*4)$$

$$=-115+29*(119-1*115)$$

$$=29*119+(-30)*(353-2*119)$$

$$=-30*353+89*(472-1*353)$$

$$=89*472+(-119)*(825-1*472)$$

$$=(-119)*825+208*(2947-3*825)$$

$$=208*2947+(-743)*(3772-1*2947)$$

$$=951*2947+(-743)*3772$$

$$\text{所以 } s=951 \quad t=-743$$

36. 证明: 因为 $(a, 4) = 2$ 所以 $a=2*(2m+1) \quad m \in \mathbb{Z}$

$$\text{所以 } a+b=4m+2+4n+2=4(m+n)+4=4(m+n+1)$$

$$\text{即 } 4|a+b$$

$$\text{所以 } (a+b, 4) = 4$$

37. 证明: 反证法

$$\text{假设 } n \text{ 为素数, 则 } n|a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

由 1.4 定理 2 知 $n|a+b$ 或 $n|a-b$, 与已知条件矛盾

所以假设不成立, 原结论正确, n 为合数。

40. 证明: (1) 假设是 $2^{1/2}$ 有理数, 则存在正整数 p, q , 使得 $2^{1/2}=p/q$, 且 $(p, q) = 1$

$$\text{平方得: } p^2=2q^2, \text{ 即 } 2|p^2, \text{ 所以 } p=2m, m \in \mathbb{N}$$

$$\text{因此 } p^2=4m^2=2q^2 \quad q^2=2m^2 \quad q=2n, n \in \mathbb{N}$$

$$\text{则 } (p, q) = (2m, 2n) = 2(m, n) \geq 2 \text{ 与 } (p, q) = 1 \text{ 矛盾}$$

所以假设不成立, 原结论正确, $2^{1/2}$ 不是有理数。

(2) 假设是 $7^{1/2}$ 有理数, 则存在正整数 m, n , 使得 $7^{1/2}=p/q$, 且 $(m, n) = 1$

$$\text{平方得: } m^2=2n^2, \text{ 即 } 7|m^2$$

$$\text{将 } m \text{ 表示成 } n \text{ 个素数 } p_i \text{ 的乘积, } m=p_1 p_2 p_3 \dots p_n, \quad p_i \text{ 为素数。}$$

$$\text{因为 } 7 \text{ 为素数, 假设 } 7 \nmid m, \text{ 则 } 7 \notin \{p_1, p_2, p_3, \dots, p_n\}$$

$$\text{所以 } m^2 = p_1^2 p_2^2 p_3^2 \dots p_n^2 = (p_1 p_2 p_3 \dots p_n)(p_1 p_2 p_3 \dots p_n)$$

$$\text{所以 } 7 \nmid m^2, \text{ 与 } 7|m^2 \text{ 矛盾, 故 } 7|m, \quad m=7k$$

$$\text{同理可知: } 7|n, \quad n=7k_0$$

$$\text{所以 } (m, n) = (7k, 7k_0) = 7(k, k_0) \geq 7 \text{ 与已知矛盾}$$

故原结论正确, $7^{1/2}$ 不是有理数。

(3) 同理可证 $17^{1/2}$ 不是有理数。

41. 证明: 假设 $\log_2 10$ 是有理数, 则存在正整数 p, q , 使得 $\log_2 10=p/q$, 且 $(p, q) = 1$

$$\text{又 } \log_2 10 = \ln 10 / \ln 2 = p/q$$

$$\ln 10^q = \ln 2^p \quad 10^q = 2^p$$

$$(2*5)^q = 2^p \quad 5^q = 2^{p-q}$$

所以只有当 $q=p=0$ 是成立, 所以假设不成立

故原结论正确, $\log_2 10$ 是无理数。

同理可证 $\log_3 7, \log_{15} 21$ 都是无理数。

50. (1) 解: 因为 $8=2^3, 60=2^2*3*5$

$$\text{所以 } [8, 60] = 2^3*3*5 = 120$$

51. (4) 解: $(47^{11}79^{11}101^{1001}, 41^{11}83^{111}101^{1000}) = 41^0 47^0 79^0 83^0 101^{1000} = 101^{1000}$

$$[47^{11}79^{11}101^{1001}, 41^{11}83^{111}101^{1000}] = 41^{11} 47^{11} 79^{11} 83^{111} 101^{1001}$$

第二章. 同余

1. 解: (1) 其中之一为 9, 19, 11, 21, 13, 23, 15, 25, 17
(2) 其中之一为 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
(3) . (1) 或 (2) 中的要求对模 10 不能实现。
2. 证明: 当 $m > 2$ 时, 因为 $(m-1)^2 = m^2 - 2m + 1 = m(m-2) + 1$
所以 $(m-1)^2 \equiv 1 \pmod{m}$
即 1 与 $(m-1)^2$ 在同一个剩余类中, 故 $0^2, 1^2, \dots, (m-1)^2$ 一定不是模 m 的完全剩余系。
6. 解: $2^1 \equiv 2 \pmod{7}$, $2^2 \equiv 4 \pmod{7}$, $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$
又 $20080509 = 6693503 \cdot 3$
所以 $2^{20080509} = (2^3)^{6693503} \equiv 1 \pmod{7}$
故 $2^{20080509}$ 是星期六。
7. 证明: (i) 因为 $a_i \equiv b_i \pmod{m}, 1 \leq i \leq k$ 所以 $a_i = b_i + k_i m$
又 $a_1 + a_2 + \dots + a_k = \sum a_i = \sum (b_i + k_i m) = \sum b_i + m \cdot \sum k_i$
所以有 $\sum a_i \equiv \sum b_i \pmod{m}$
即 $a_1 + a_2 + \dots + a_k \equiv b_1 + b_2 + \dots + b_k \pmod{m}$
(ii) 因为 $a_i \equiv b_i \pmod{m}, 1 \leq i \leq k$ 所以 $a_i \pmod{m} = b_i \pmod{m}$
所以 $(a_1 a_2 \dots a_k) \pmod{m} = [(a_1 \pmod{m})(a_2 \pmod{m}) \dots (a_k \pmod{m})] \pmod{m}$
 $\equiv [(b_1 \pmod{m})(b_2 \pmod{m}) \dots (b_k \pmod{m})] \pmod{m}$
 $\equiv (b_1 b_2 \dots b_k) \pmod{m}$
所以 $a_1 a_2 \dots a_k \equiv b_1 b_2 \dots b_k \pmod{m}$
8. 证明: 如果 $a^2 \equiv b^2 \pmod{p}$ 则 $a^2 = b^2 + kp$, $k \in \mathbb{Z}$
即 $kp = a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 所以 $p \mid (a+b)(a-b)$
又 p 为素数, 根据 1.4 定理 2 知 $p \mid a+b$ 或 $p \mid a-b$ 得证。
9. 证明: 如果 $a^2 \equiv b^2 \pmod{n}$ 则 $a^2 = b^2 + kn$, $k \in \mathbb{Z}$
即 $kn = a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 所以 $n \mid (a+b)(a-b)$
由 $n = pq$ 知 $kpq = a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
因为 $n \nmid |a-b|$, $n \nmid |a+b|$, 所以 p, q 不能同时为 $a-b$ 或 $a+b$ 的素因数。
不妨设 $p \mid a-b$, $q \nmid a-b$, 则 $q \nmid |a-b|$, $p \nmid |a+b|$ 即 $(q, a-b) = 1, (p, a+b) = 1$
因此 $(n, a-b) = (pq, a-b) = (p, a-b) = p > 1$
 $(n, a+b) = (pq, a+b) = (q, a+b) = q > 1$
故原命题成立。
10. 证明: 因为 $a \equiv b \pmod{c}$ 则 $a = cq + b$, $q \in \mathbb{Z}$
根据 1.3 定理 3 知 $(a, c) = (b, c)$
17. 解: (1) $a_k + a_{k-1} + \dots + a_0 = 1 + 8 + 4 + 3 + 5 + 8 + 1 = 30$
因为 $3 \mid 30, 9 \nmid 30$ 所以 1843581 能被 3 整除, 不能被 9 整除。
(2) $a_k + a_{k-1} + \dots + a_0 = 1 + 8 + 4 + 2 + 3 + 4 + 0 + 8 + 1 = 31$
因为 $3 \nmid 31, 9 \nmid 31$ 所以 184234081 不能被 3 整除, 也不能被 9 整除。
(3) $a_k + a_{k-1} + \dots + a_0 = 8 + 9 + 3 + 7 + 7 + 5 + 2 + 7 + 4 + 4 = 56$
因为 $3 \nmid 56, 9 \nmid 56$ 所以 8937752744 不能被 3 整除, 也不能被 9 整除。
(4) $a_k + a_{k-1} + \dots + a_0 = 4 + 1 + 5 + 3 + 7 + 6 + 8 + 9 + 1 + 2 + 2 + 4 + 6 = 58$
因为 $3 \nmid 58, 9 \nmid 58$ 所以 4153768912246 不能被 3 整除, 也不能被 9 整除。
20. 解: $(89878 \cdot 58965) \pmod{9} = [(89878 \pmod{9}) \cdot (58965 \pmod{9})] \pmod{9} = (4 \cdot 6) \pmod{9}$
 $\equiv 6 \pmod{9} \equiv 5299?56270 \pmod{9}$
又 $5299?56270 \equiv (45 + ?) \pmod{9} \equiv ? \pmod{9}$
所以 $? = 6$ 即未知数字为 6。

21. 解: (1) 因为 $875961 \cdot 2753 \equiv [(36 \bmod 9)(17 \bmod 9)] \bmod 9 \equiv 0 \bmod 9$
 $2410520633 \equiv 26 \bmod 9 \equiv 8 \bmod 9$
 所以等式 $875961 \cdot 2753 = 2410520633$ 不成立
- (2) 因为 $14789 \cdot 23567 \equiv [(29 \bmod 9)(23 \bmod 9)] \bmod 9 \equiv 1 \bmod 9$
 $348532367 \equiv 41 \bmod 9 \equiv 5 \bmod 9$
 所以等式 $14789 \cdot 23567 = 348532367$ 不成立
- (3) 因为 $24789 \cdot 43717 \equiv [(30 \bmod 9)(22 \bmod 9)] \bmod 9 \equiv 3 \bmod 9$
 $1092700713 \equiv 30 \bmod 9 \equiv 3 \bmod 9$
 所以等式 $24789 \cdot 43717 = 1092700713$ 可能成立
- (4) 这种判断对于判断等式不成立时简单明了, 但对于判断等式成立时, 可能会较复杂。

22. 解: 因为 7 为素数, 由 Wilson 定理知: $(7-1)! \equiv -1 \bmod 7$ 即 $6! \equiv -1 \bmod 7$
 所以 $8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \bmod 7 \equiv 6! \bmod 7 \equiv -1 \bmod 7$

31. 证明: 因为 $c_1, c_2, \dots, c_j \pmod{m}$ 是模 m 的简化剩余系

对于任一 c_i , 有 $m - c_i$ 也属于模 m 的简化剩余系

所以 $c_i + (m - c_i) \equiv 0 \bmod m$

因此 $c_1 + c_2 + \dots + c_j \pmod{m} \equiv 0 \bmod m$

32. 证明: 因为 $a^j \pmod{m} \equiv 1 \bmod m$ 所以 $a^j \pmod{m} - 1 \equiv 0 \bmod m$

$a^j \pmod{m} - 1 = (a-1)(1+a+a^2+\dots+a^{j-1}) \equiv 0 \bmod m$

又 $(a-1, m) = 1$

所以 $1+a+a^2+\dots+a^{j-1} \equiv 0 \bmod m$

33. 证明: 因为 7 为素数, 由 Fermat 定理知 $a^7 \equiv a \bmod 7$

又 $(a, 3) = 1$ 所以 $(a, 9) = 1$ 由 Euler 定理知 $a^{\phi(9)} \equiv a^6 \equiv 1 \bmod 9$ 即 $a^7 \equiv a \bmod 9$

又 $(7, 9) = 1$, 所以 $a^7 \equiv a \bmod 7 \cdot 9$

即 $a^7 \equiv a \bmod 63$

34. 证明: 因为 $32760 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$ 又 $(a, 32760) = 1$

所以 $(a, 2) = (a, 3) = (a, 5) = (a, 7) = (a, 13) = 1$

有: $a^{\phi(13)} \equiv 1 \bmod 13$ 即 $a^{12} \equiv 1 \bmod 13$

$a^{\phi(8)} \equiv a^4 \equiv 1 \bmod 8$ 即 $a^{12} \equiv 1 \bmod 8$

$a^{\phi(5)} \equiv a^4 \equiv 1 \bmod 5$ 即 $a^{12} \equiv 1 \bmod 5$

$a^{\phi(7)} \equiv a^6 \equiv 1 \bmod 7$ 即 $a^{12} \equiv 1 \bmod 7$

$a^{\phi(9)} \equiv a^6 \equiv 1 \bmod 9$ 即 $a^{12} \equiv 1 \bmod 9$

又因为 $[5, 7, 8, 9, 13] = 32760$

所以 $a^{12} \equiv 1 \bmod 32760$

35. 证明: 因为 $(p, q) = 1$ p, q 都为素数 所以 $\phi(p) = p-1$, $\phi(q) = q-1$

由 Euler 定理知: $p^{\phi(q)} \equiv 1 \bmod q$ $q^{\phi(p)} \equiv 1 \bmod p$

即 $p^{q-1} \equiv 1 \bmod q$ $q^{p-1} \equiv 1 \bmod p$

又 $q^{p-1} \equiv 0 \bmod q$ $p^{q-1} \equiv 0 \bmod p$

所以 $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \bmod q$ $q^{p-1} + p^{q-1} \equiv 1 \bmod p$

又 $[p, q] = pq$ 所以 $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \bmod pq$

36. 证明: 因为 $(m, n) = 1$

由 Euler 定理知: $m^{\phi(n)} \equiv 1 \bmod n$ $n^{\phi(m)} \equiv 1 \bmod m$

所以 $m^{\phi(n)} + n^{\phi(m)} \equiv (m^{\phi(n)} \bmod n) + (n^{\phi(m)} \bmod m) \equiv 1 + 0 \equiv 1 \bmod mn$

同理有: $m j^{(n)} + n j^{(m)} \equiv 1 \pmod{m}$
 又 $[m, n] = mn$ 所以 $m j^{(n)} + n j^{(m)} \equiv 1 \pmod{mn}$

第三章. 同余式

1. (1) 解: 因为 $(3, 7) = 1 \mid 2$ 故原同余式有解
 又 $3x \equiv 1 \pmod{7}$ 所以 特解 $x_0 \equiv 5 \pmod{7}$
 同余式 $3x \equiv 2 \pmod{7}$ 的一个特解 $x_0 \equiv 2 * x_0' = 2 * 5 \equiv 3 \pmod{7}$
 所有解为: $x \equiv 3 \pmod{7}$
 (3) 解: 因为 $(17, 21) = 1 \mid 14$ 故原同余式有解
 又 $17x \equiv 1 \pmod{21}$ 所以 特解 $x_0 \equiv 5 \pmod{21}$
 同余式 $17x \equiv 14 \pmod{21}$ 的一个特解 $x_0 \equiv 14 * x_0' = 14 * 5 \equiv 7 \pmod{21}$
 所有解为: $x \equiv 7 \pmod{21}$
2. (1) 解: 因为 $(127, 1012) = 1 \mid 833$ 故原同余式有解
 又 $127x \equiv 1 \pmod{1012}$ 所以 特解 $x_0 \equiv 255 \pmod{1012}$
 同余式 $127x \equiv 833 \pmod{1012}$ 的一个特解 $x_0 \equiv 833 * x_0' = 833 * 255 \equiv 907 \pmod{1012}$
 所有解为: $x \equiv 907 \pmod{1012}$
3. 见课本 3.2 例 1
7. (1) 解: 因为 $(5, 14) = 1$
 由 Euler 定理知, 同余方程 $5x \equiv 3 \pmod{14}$ 的解为:
 $x \equiv 5 j^{(14)-1} * 3 \equiv 9 \pmod{14}$
 (2) 解: 因为 $(4, 15) = 1$
 由 Euler 定理知, 同余方程 $4x \equiv 7 \pmod{15}$ 的解为:
 $x \equiv 4 j^{(15)-1} * 7 \equiv 13 \pmod{15}$
 (3) 解: 因为 $(3, 16) = 1$
 由 Euler 定理知, 同余方程 $3x \equiv 5 \pmod{16}$ 的解为:
 $x \equiv 3 j^{(16)-1} * 5 \equiv 7 \pmod{16}$
11. 证明: 由中国剩余定理知方程解为:
 $x \equiv a_1 M_1 M_1' + a_2 M_2 M_2' + \dots + a_k M_k M_k' \pmod{m}$
 因为 m_i 两两互素, 又中国剩余定理知: $M_i M_i' \equiv 1 \pmod{m_i}$
 又 $M_i = m / m_i$ 所以 $(m, M_i) \equiv 1 \pmod{m_i}$
 所以 $M_i M_i' \equiv M_i j^{(m_i)} \pmod{m_i}$
 代入方程解为 $x \equiv a_1 M_1 j^{(m_1)} + a_2 M_2 j^{(m_2)} + \dots + a_k M_k j^{(m_k)} \pmod{m}$ 得证。
12. (1) 解: 由方程组得: $3x + 3y \equiv 2 \pmod{7}$
 $6x + 6y \equiv 4 \pmod{7} \quad x + y \equiv -4 \pmod{7}$
 $x \equiv 5 \pmod{7} \quad y \equiv 5 \pmod{7}$
 (2) 解: 由方程组得: $2x + 6y \equiv 2 \pmod{7} \quad 2x - y \equiv 2 \pmod{7}$
 $6x + 8y \equiv 4 \pmod{7} \quad x - y \equiv -4 \pmod{7}$
 $x \equiv 6 \pmod{7} \quad y \equiv 3 \pmod{7}$
13. 见课本 3.2 例 4
14. 同课本 3.2 例 3 $2^{1000000} \equiv 562 \pmod{1309}$
15. (1) 解: 等价同余式组为:

$$23x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$23x \equiv 1 \pmod{5}$$

$$23x \equiv 1 \pmod{7}$$

$$\text{所以 } x \equiv 3 \pmod{4} \quad x \equiv 2 \pmod{5} \quad x \equiv 4 \pmod{7}$$

$$\text{所以 } x \equiv 3 \cdot 35 \cdot 3 + 2 \cdot 28 \cdot 2 + 4 \cdot 20 \cdot 6 \equiv 67 \pmod{140}$$

(2) 解: 等价同余式组为:

$$17x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$17x \equiv 1 \pmod{5}$$

$$17x \equiv 1 \pmod{7}$$

$$17x \equiv 1 \pmod{11}$$

$$\text{所以 } x \equiv 1 \pmod{4} \quad x \equiv 2 \pmod{5} \quad x \equiv -3 \pmod{7} \quad x \equiv 7 \pmod{11}$$

$$\text{所以 } x \equiv 1 \cdot 385 \cdot 1 + 2 \cdot 308 \cdot 2 + (-3) \cdot 220 \cdot 5 + 7 \cdot 140 \cdot 7 \equiv 557 \pmod{1540}$$

19. 解: $3x^{14} + 4x^{13} + 2x^{11} + x^9 + x^6 + x^3 + 12x^2 + x \equiv 0 \pmod{7}$

$$\text{左边} = (x^7 - x)(3x^7 + 4x^6 + 2x^4 + x^2 + 3x + 4) + x^6 + 2x^5 + 2x^2 + 15x^2 + 5x$$

$$\text{所以原同余式可化简为: } x^6 + 2x^5 + 2x^2 + 15x^2 + 5x \equiv 0 \pmod{7}$$

$$\text{直接验算得解为: } x \equiv 0 \pmod{7} \quad x \equiv 6 \pmod{7}$$

20. 解: $f'(x) \equiv 4x^3 + 7 \pmod{243}$

直接验算的同余式 $f(x) \equiv 0 \pmod{3}$ 有一解: $x_1 \equiv 1 \pmod{3}$

$$f'(x_1) \equiv 4 \cdot 1^3 + 7 \equiv -1 \pmod{3} \quad f'(x_1)^{-1} \equiv -1 \pmod{3}$$

$$\text{所以 } t_1 \equiv -f(x_1) \cdot (f'(x_1)^{-1} \pmod{3}) / 3^1 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x_2 \equiv x_1 + 3 t_1 \equiv 4 \pmod{9}$$

$$t_2 \equiv -f(x_2) \cdot (f'(x_1)^{-1} \pmod{3}) / 3^2 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x_3 \equiv x_2 + 3^2 t_2 \equiv 22 \pmod{27}$$

$$t_3 \equiv -f(x_3) \cdot (f'(x_1)^{-1} \pmod{3}) / 3^3 \equiv 0 \pmod{3}$$

$$x_4 \equiv x_3 + 3^3 t_3 \equiv 22 \pmod{81}$$

$$t_5 \equiv -f(x_4) \cdot (f'(x_1)^{-1} \pmod{3}) / 3^4 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x_5 \equiv x_4 + 3^4 t_4 \equiv 184 \pmod{243}$$

所以同余式 $f(x) \equiv 0 \pmod{243}$ 的解为: $x_5 \equiv 184 \pmod{243}$

第四章. 二次同余式与平方剩余

2. 解: 对 $x=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 时, 分别求出 y

$$x=0, y^2 \equiv 1 \pmod{7}, y \equiv 1, 6 \pmod{7}$$

$$x=4, y^2 \equiv 4 \pmod{7}, y \equiv 2, 5 \pmod{7}$$

当 $x=1, 2, 3, 5, 6$ 时均无解

5. 解: 对 $x=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16$ 时, 分别求出 y

$$x=0, y^2 \equiv 1 \pmod{17}, y \equiv 1, 16 \pmod{17}$$

$$x=1, y^2 \equiv 3 \pmod{17}, \text{无解}$$

$$x=2, y^2 \equiv 11 \pmod{17}, \text{无解}$$

$$x=3, y^2 \equiv 14 \pmod{17}, \text{无解}$$

$$x=4, y^2 \equiv 1 \pmod{17}, y \equiv 1, 16 \pmod{17}$$

$$x=5, y^2 \equiv 12 \pmod{17}, \text{无解}$$

$x=6, y^2 \equiv 2 \pmod{17}, y \equiv 6, 11 \pmod{17}$
 $x=7, y^2 \equiv 11 \pmod{17}$, 无解
 $x=8, y^2 \equiv 11 \pmod{17}$, 无解
 $x=9, y^2 \equiv 8 \pmod{17}, y \equiv 5, 12 \pmod{17}$
 $x=10, y^2 \equiv 8 \pmod{17}, y \equiv 5, 12 \pmod{17}$
 $x=11, y^2 \equiv 0 \pmod{17}, y \equiv 0 \pmod{17}$
 $x=12, y^2 \equiv 7 \pmod{17}$, 无解
 $x=13, y^2 \equiv 1 \pmod{17}, y \equiv 1, 16 \pmod{17}$
 $x=14, y^2 \equiv 5 \pmod{17}$, 无解
 $x=15, y^2 \equiv 8 \pmod{17}, y \equiv 5, 12 \pmod{17}$
 $x=16, y^2 \equiv 16 \pmod{17}, y \equiv 4, 13 \pmod{17}$

10. 解: (1) $\cdot (17/37) = (-1)^{(17-1)(37-1)/(2 \cdot 2)} \cdot (37/17) = -1$
 (4) $\cdot (911/2003) = (-1)^{(2003-1)(911-1)/(2 \cdot 2)} \cdot (2003/911) = 1/3 = 1$
 (6) $\cdot (7/20040803) = (-1)^{(7-1)(20040803-1)/(2 \cdot 2)} \cdot (20040803/7) = 1$

12. 解: (1) 因为 $(-2/67) = (65/67) = 1$
 所以 -2 是 67 的平方剩余
 所以 $x^2 \equiv -2 \pmod{67}$ 有 2 个解。
 (4) 因为 $(2/37) = (-1)^{(37^2-1)/8} = -1$
 所以 2 是 37 的平方非剩余
 所以 $x^2 \equiv 2 \pmod{37}$ 无解。

14. 证明: (1) 因为 p 为其素数, 模 p 的所有二次剩余个数为 $(p-1)/2$ 个,
 设为 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{(p-1)/2}$
 则 $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdots a_{(p-1)/2} \equiv 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdots ((p-1)/2)^2 \pmod{p}$
 $\equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots ((p-1)/2) \cdot (- (p-1)) \cdot (- (p-2)) \cdots (- (p - (p-1)/2)) \pmod{p}$
 $\equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots ((p-1)/2) \cdot (p - (p-1)/2) \cdots (p-2) \cdot (p-1) \cdot (-1)^{(p-1)/2} \pmod{p}$
 $\equiv (p-1)! \cdot (-1)^{(p-1)/2} \pmod{p}$
 $\equiv (-1) \cdot (-1)^{(p-1)/2} \pmod{p} \quad (2.4 \text{ 定理 } 3)$
 $\equiv (-1)^{(p+1)/2} \pmod{p}$

所以模 p 的所有二次剩余乘积模 p 的剩余为 $(-1)^{(p+1)/2}$ 得证。

- (2) $1, 2, 3, \dots, p-1$ 为 p 的一个完全剩余系
 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \equiv -1 \pmod{p} \equiv (-1)^{(p+1)/2} \cdot (-1)^{(p-1)/2} \pmod{p}$
 因为模 p 的所有二次剩余乘积模 p 的剩余为 $(-1)^{(p+1)/2}$
 所以模 p 的所有非二次剩余乘积模 p 的剩余为 $(-1)^{(p-1)/2}$

- (3) 当 $p=3$ 时, 其二次剩余只有 1, 所以 $p=3$ 时, 模 p 的所有二次剩余之和模 p 的
 剩余为 1

当 $p>3$ 时, 由 (1) 得 $a_1 + a_2 + a_3 \cdots + a_{(p-1)/2} \equiv p(p-1)(p+1)/24 \pmod{p}$
 因为 p 为奇素数, 所以 p 只能取 $3k-1$ 或 $3k+1$ 形式, 代入上式得 0
 所以当 $p>3$ 时, 模 p 的所有二次剩余之和模 p 的剩余为 0。

- (4) 因为模 p 的所有二次非剩余之和与所有二次剩余之和的和可以被 p 整除
 所以由 (3) 得, 当 $p=3$ 时, 模 p 的所有二次非剩余之和模 p 的剩余为 -1;
 当 $p>3$ 时, 模 p 的所有二次非剩余之和模 p 的剩余为 0。

16. 解: (1) 因为 $(7/227) = (-1)^{(227-1)(7-1)/(2 \cdot 2)} \cdot (227/7) = 1$
 所以 7 是 227 的二次剩余
 所以 $x^2 \equiv 7 \pmod{227}$ 有解

(3) .因为 11 对 91 的逆元是 58
 所以原同余方程等价于 $x^2 \equiv 16(\text{mod} 91)$
 又 16 是 91 的平方剩余
 所以 $11x^2 \equiv -6(\text{mod} 91)$ 有解

21. 证明: 应用模重复平方法

$$11=2^0+2^1+2^3$$

令 $x=23, b=2, a=1$

$$(1) x_0=1 \quad a_0=a \cdot b \equiv 2(\text{mod} 23) \quad b_1=b^2 \equiv 4(\text{mod} 23)$$

$$(2) x_1=1 \quad a_1=a_0 \cdot b_1 \equiv 8(\text{mod} 23) \quad b_2=b_1^2 \equiv 16(\text{mod} 23)$$

$$(3) x_2=0 \quad a_2=a_1 \cdot b_2^0 \equiv 8(\text{mod} 23) \quad b_3=b_2^2 \equiv 3(\text{mod} 23)$$

$$(4) x_3=1 \quad a_3=a_2 \cdot b_3 \equiv 1(\text{mod} 23)$$

所以 $2^{11} \equiv 1(\text{mod} 23)$ 即 $23 | 2^{11} - 1$

$47 | 2^{23} - 1$ 与 $503 | 2^{251} - 1$ 应用同样的方法得证。

第五章. 原根与指标

1. 解: 因为 $j(13)=12$, 所以只需对 12 的因数 $d=1, 2, 3, 4, 6, 12$, 计算 $a^d(\text{mod} 12)$

因为 $2^1 \equiv 2, 2^2 \equiv 4, 2^3 \equiv 8, 2^4 \equiv 3, 2^6 \equiv -1, 2^{12} \equiv 1(\text{mod} 13)$

所以 2 模 13 的指数为 12;

同理可得: 5 模 13 的指数为 4, 10 模 13 的指数为 6。

2. 解: 因为 $j(19)=18$, 所以只需对 18 的因数 $d=1, 2, 3, 6, 9, 18$ 计算 $a^d(\text{mod} 12)$

因为 $3^1 \equiv 3, 3^2 \equiv 9, 3^3 \equiv 8, 3^6 \equiv 7, 3^9 \equiv -1, 2^{18} \equiv 1(\text{mod} 13)$

所以 3 模 19 的指数为 18;

同理可得: 7 模 19 的指数为 3, 10 模 19 的指数为 18。

3. 解: 因为 $j(m)=j(81)=54=2 \cdot 3^3$, 所以 $j(m)$ 的素因数为 $q_1=2, q_2=3$, 进而

$$j(m)/q_1=27, \quad j(m)/q_2=18$$

这样, 只需验证: g^{27}, g^{18} 模 m 是否同余于 1。对 2, 4, 5, 6... 逐个验算:

因为 $2^{27} \not\equiv 1(\text{mod} 81) \quad 2^{18} \not\equiv 1(\text{mod} 81)$ 根据 5.2 定理 8 得

所以 2 是模 81 的原根

7. 证明: 因为 $(a, m)=1$, 故由 $\text{ord}_m(a)=st$ 知: $a^{st} \equiv 1(\text{mod} m)$ 即 $(a^s)^t \equiv 1(\text{mod} m)$

不妨令 $\text{ord}_m(a^s)=r$ 则 $a^{sr} \equiv 1(\text{mod} m)$ 所以 $st | sr$

由 $(a^s)^t \equiv 1(\text{mod} m)$ 得 $r | t$ 即 $t=k \cdot r \quad k \in \mathbb{N} \geq 1 \quad r \leq t$ 所以 $sr \leq st$

所以 $sr=st$ 所以 $r=t$

所以 $\text{ord}_m(a^s)=t$

8. 解: 存在

举例: 如 $n=7, d=3$ 因为 $j(7)=6 \quad d=3 | 6$

存在 $a=2 \quad (2, 7)=1, 2j^{(7)} \equiv 1(\text{mod} 7) \quad \text{又 } 2^3 \equiv 1(\text{mod} 7)$

所以 $\text{ord}_7(2)=3$ 满足条件。

10. 证明: 因为 p 为一个奇素数, $p-1/2$ 也是一个奇素数

所以 $j(p)=p-1=2 \cdot (p-1)/2$ 即 $j(p)$ 的不同素因数为 2, $p-1/2$

又因为 $a j^{(p)/2} = a^{p-1/2} \not\equiv 1(\text{mod} p) \quad a j^{(p)/[(p-1)/2]} = a^2 \not\equiv 1(\text{mod} p)$

根据 5.2 定理 8 得 a 是模 p 的原根。

15. 证明：反证法

假设 n 是一个合数，令 $\text{ord}_n(a)=m$ 则 $a^m \equiv 1 \pmod{n}$

因为 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 所以由 5.1 定理 1 得 $m|n-1$ 即 $n-1=k*m$

对 $n-1$ 的所有素因数 q ，必可找到一个 q_1 使 $m|((n-1)/q_1)$

所以 $a^{n-1/q} = a^{m*t} \equiv 1 \pmod{n}$ 与已知条件矛盾，故假设不成立，原结论得证。

16. 解：因为 $d(n, j(m)) = (22, j(41)) = (22, 40) = 2$ $\text{ind}_5 = 22$

所以 $(n, j(m)) | \text{ind}_5$ ，同余式有解

等价同余式为 $22 \text{ind}_x \equiv \text{ind}_5 \pmod{40}$ 即 $11 \text{ind}_x \equiv 11 \pmod{20}$

解得： $\text{ind}_x = 1, 21 \pmod{40}$

所以原同余式解为 $x = 6, 35 \pmod{41}$

17. 解：因为 $d(n, j(m)) = (22, j(41)) = (22, 40) = 2$ $\text{ind}_{29} = 7$

$(2, 7) = 1$ 所以原同余式无解。

第六章. 素性检验

1. 证明：因为 $91 = 13*7$ 是奇合数， $(3, 91) = 1$

又 $3^6 = 729 \equiv 1 \pmod{91}$ 则 $3^{91-1} = 3^{90} = (3^6)^{15} \equiv 1 \pmod{91}$

则 91 是对于基 3 的拟素数。

2. 证明：因为 $45 = 5*3*3$ 是奇合数， $(17, 45) = 1$

由 Euler 定理： $17^4 \equiv 1 \pmod{5}$ $17^2 \equiv 1 \pmod{3}$

所以 $17^4 \equiv 1 \pmod{3}$ 所以 $17^4 \equiv 1 \pmod{45}$

则 $17^{45-1} = 17^{44} = (17^4)^{11} \equiv 1 \pmod{45}$

则 45 是对于基 17 的拟素数。

同理 45 是对于基 19 的拟素数。

10. 证明：25 = 5*5 是奇素数 设 $n = 25$ $n-1 = 24 = 2^3*3$ 则 $t = 3$ $(7, 25) = 1$

$7^3 \equiv 18 \pmod{25}$ $7^{2*3} \equiv -1 \pmod{25}$

所以 25 是基于 7 的强拟素数。

15. 证明： $n = 561 = 3*11*17$ 为奇素数 $(561, 2) = 1$

$b^{(n-1)/2} = 2^{(561-1)/2} = 2^{280} \equiv 1 \pmod{561}$

$(b/n) = (2/561) = (-1)^{(561*561-1)/8} = 1$

所以 $2^{280} \equiv (2/561) \pmod{561}$

所以 561 是对于基 2 的 Euler 拟素数。

第八章. 群

2. 证明: 群 G 是交换群的充要条件是对任意 $a, b \in G$, 有 $(ab)^2 = a^2b^2$ 。

证明: \Rightarrow 必要性: 若 G 是交换群, 则对任意 $a, b \in G$, 有 $ab = ba$, 从而

$$(ab)^2 = abab = aabb = a^2b^2.$$

\Leftarrow 充分性: 若对任意 $a, b \in G$, 有 $(ab)^2 = a^2b^2$ 。那么

$$ba = ebae = a^{-1}(ab)^2b^{-1} = a^{-1}a^2b^2b^{-1} = eabe = ab.$$

因此群 G 是交换群。

4. 设 G 是 n 阶有限群。证明: 对任意元 $a \in G$, 有 $a^n = e$ 。

证明: 任取 $a \in G$, 考虑 a 生成的循环群 $\langle a \rangle$ 。不妨设 $|\langle a \rangle| = q$ 。根据拉格朗日定理, 有 $q | n$, 从而存在正整数 k , 使得 $n = qk$ 。因为 $a^q = e$ (否则 $|\langle a \rangle| \neq q$), 所以 $a^n = (a^q)^k = e^k = e$ 。

6. 设 G 是一个群。记 $\text{cent}(G) = \{a \in G \mid (\forall b \in G) ab = ba\}$ 。证明: $\text{cent}(G)$ 是 G 的正规子群。

证明: 首先证明 $\text{cent}(G)$ 是 G 的子群。任取 $a_1, a_2 \in \text{cent}(G)$, $b \in G$ 。计算

$$ba_1a_2^{-1} = a_1ba_2^{-1} = a_1(b^{-1})^{-1}a_2^{-1} = a_1(a_2b^{-1})^{-1} = a_1(b^{-1}a_2)^{-1} = a_1a_2^{-1}(b^{-1})^{-1} = a_1a_2^{-1}b.$$

因此, $a_1a_2^{-1} \in \text{cent}(G)$, 从而 $\text{cent}(G)$ 是 G 的子群。

再证明 $\text{cent}(G)$ 是 G 的正规子群。任取 $a \in G$, $x \in a \text{cent}(G) a^{-1}$ 。那么存在 $y \in \text{cent}(G)$, 使得 $x = aya^{-1}$ 。由 y 的交换性, 有 $x = aya^{-1} = aa^{-1}y = ey = y \in \text{cent}(G)$ 。

从而 $a \text{cent}(G) a^{-1} \subset \text{cent}(G)$, $\text{cent}(G)$ 是 G 的正规子群。

7. 设 a 是群 G 的一个元素。证明: 映射 $S: x \rightarrow axa^{-1}$ 是 G 到自身的自同构。

证明: (1) 任取 $x, y \in G$ 。计算

$$S(xy) = a(xy)a^{-1} = axeya^{-1} = axa^{-1}aya^{-1} = S(x)S(y)$$

因此 S 是同态映射。

(2) 若 $x, y \in G$ ，且 $S(x) = S(y)$ 。那么 $axa^{-1} = aya^{-1}$ ，从而

$$x = a^{-1}axa^{-1}a = a^{-1}aya^{-1}a = y,$$

因此 S 是单射。

(3) 任取 $c \in G$ 。由于 $S(a^{-1}ca) = a(a^{-1}ca)a^{-1} = ece = c$ ，故 S 是满射。

综上所述，映射 $S: x \rightarrow axa^{-1}$ 是 G 到自身的自同构。

8. 设 H 是群 G 的子群。在 G 中定义关系 $R: aRb \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$ 。证明：

(i) R 是等价关系。

(ii) aRb 的充要条件是 $aH = bH$ 。

证明：(i) 任取 $a \in G$ 。既然 H 是群 G 的子群，那么 $e \in H$ 。因此 $a^{-1}a = e \in H$ ，这说明 aRa ，即 R 满足自反性。

取 $a, b \in G$ 满足 aRb 。那么 $b^{-1}a \in H$ 。根据 H 是群 G 的子群以及逆元的性质，我们有 $a^{-1}b = (b^{-1}a)^{-1} \in H$ ，这说明 bRa ，即 R 满足对称性。

取 $a, b, c \in G$ 满足 aRb ， bRc 。那么 $b^{-1}a \in H$ ， $c^{-1}b \in H$ 。根据 H 是群 G 的子群，我们有 $c^{-1}a = (c^{-1}b)(b^{-1}a) \in H$ 。从而 aRc 成立，即 R 满足传递性。

综上所述 R 是等价关系。

(ii) 即要证明： $b^{-1}a \in H \Leftrightarrow aH = bH$ 。

\Leftarrow 充分性：设 $aH = bH$ ，则 $a = ae \in aH = bH$ ，于是存在 $h \in H$ 使得 $a = bh$ ，左右两边同乘 b^{-1} ，得 $b^{-1}a = b^{-1}bh = h \in H$ 。

\Rightarrow 必要性：如果 $b^{-1}a \in H$ 。对任意 $c \in aH$ ，存在 $h_2 \in H$ 使得 $c = ah_2$ 。进而，

$$c = b(b^{-1}a)h_2 = bh_1h_2 \in bH,$$

因此， $aH \subset bH$ 。

同样，对任意 $c \in bH$ ，存在 $h_3 \in H$ 使得 $c = bh_3$ ，进而 $c = a(b^{-1}a)^{-1}h_3 = ah_1^{-1}h_2 \in aH$ 。

因此 $bH \subset aH$ ，故 $aH = bH$ 。

2007 年试题

- 1 证明：如果 a 是整数，则 $a^3 - a$ 能被 3 整除。
- 2 用广义欧几里德算法求最大公因子 (4655, 12075)
- 3 设 m 是一个正整数， $a \equiv b \pmod{m}$ ，如果 $d \mid m$ ，证明： $a \equiv b \pmod{d}$ 。
- 4 解方程 $987x \equiv 610 \pmod{2668}$
- 5 解方程组
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 1 \pmod{7} \end{cases}$$
- 6 计算 3 模 19 的指数。
- 7 计算 $\left(\frac{6}{53}\right)$ 的 Legendre 符号
- 8 证明：91 是对基 3 的拟素数。
- 9 设 f 是群 G 到 G' 的一个同态， $\ker f = \{a \mid a \in G, f(a) = e'\}$ ，其中 e' 是 G' 的单位元。证明： $\ker f$ 是 G 的子群。
- 10 设 a 是群 G 的一个元素。证明：映射 $S : x \rightarrow axa^{-1}$ 是 G 到自身的自同构。

2007 年试题答案

- 1 证明：因为 $a^3 - a = (a-1)a(a+1)$
当 $a=3k$, $k \in \mathbb{Z}$ $3 \mid a$ 则 $3 \mid a^3 - a$
当 $a=3k-1$, $k \in \mathbb{Z}$ $3 \mid a+1$ 则 $3 \mid a^3 - a$
当 $a=3k+1$, $k \in \mathbb{Z}$ $3 \mid a-1$ 则 $3 \mid a^3 - a$
所以 $a^3 - a$ 能被 3 整除。
2. $12075 = 2 \cdot 4655 + 2765$
 $4655 = 1 \cdot 2765 + 1890$
 $2765 = 1 \cdot 1890 + 875$
 $1890 = 2 \cdot 875 + 140$
 $875 = 6 \cdot 140 + 35$

$$140=4*35$$

$$\text{所以 } (4655, 12075) = 35$$

3. 因为 $d|m$, 所以存在整数 m' 使得 $m = dm'$ 。又因为 $a \equiv b \pmod{m}$, 所以存在整数 k 使得 $a = b + mk$ 。该式又可以写成 $a = b + d(m'k)$ 。故 $a \equiv b \pmod{d}$ 。

$$4. 987x \equiv 610 \pmod{2668}$$

计算最大公因式 $(987, 2668) = 1$, 所以原同余式有解且只有一个解。利用广义欧几里德除法, 求同余式 $987x \equiv 1 \pmod{2668}$ 的解为 $x'_0 = 2495 \pmod{2668}$ 。再写出同余式 $987x \equiv 610 \pmod{2668}$ 的解为 $x_0 = 610 * x'_0 = 610 * 2495 \equiv 1190 \pmod{2668}$ 。

$$5 \text{ 令 } m_1 = 3, m_2 = 5, m_3 = 7, \quad m = 3 * 5 * 7 = 105,$$

$$M_1 = 5 * 7 = 35, M_2 = 3 * 7 = 21, M_3 = 3 * 5 = 15。$$

分别求解同余式 $M'_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ ($i=1, 2, 3$)

得到 $M'_1 = 2, M'_2 = 1, M'_3 = 1$ 。故同余式的解为

$$\begin{aligned} x &\equiv M'_1 M_1 * 2 + M'_2 M_2 * 1 + M'_3 M_3 * 1 \pmod{105} \\ &\equiv 2 * 35 * 2 + 1 * 21 * 1 + 1 * 15 * 1 \pmod{105} \\ &\equiv 71 \pmod{105} \end{aligned}$$

6 解: 因为 $j(19) = 18$, 所以只需对 18 的因数 $d=1, 2, 3, 6, 9, 18$ 计算 $a^d \pmod{12}$

$$\text{因为 } 3^1 \equiv 3, 3^2 \equiv 9, 3^3 \equiv 8, 3^6 \equiv 7, 3^9 \equiv -1, 2^{18} \equiv 1 \pmod{13}$$

所以 3 模 19 的指数为 18;

7

$$\begin{aligned} \left(\frac{6}{53} \right) &= \left(\frac{2}{53} \right) \left(\frac{3}{53} \right) \\ &= (-1)^{(53^2-1)/8} \cdot (-1)^{(3-1)(53-1)/4} \left(\frac{53}{3} \right) \\ &= -1 \cdot 1 \cdot \left(\frac{2}{3} \right) = -1 \cdot (-1)^{(3^2-1)/8} = 1 \end{aligned}$$

8 证明: 因为 $91 = 13 * 7$ 是奇合数, $(3, 91) = 1$

$$\text{又 } 3^6 = 729 \equiv 1 \pmod{91} \quad \text{则 } 3^{91-1} = 3^{90} \equiv (3^6)^{15} \equiv 1 \pmod{91}$$

则 91 是对于基 3 的拟素数。

9 对任意 $a, b \in \ker f$, 有 $f(a) = e', f(b) = e'$, 从而,

$$f(ab^{-1}) = f(a)f(b^{-1}) = f(a)f(b)^{-1} = f(a)f(a)^{-1} = e'.$$

因此, $ab^{-1} \in \ker f$, $\ker f$ 是群 G 的子群。

10 证明: (1) 任取 $x, y \in G$ 。计算

$$S(xy) = a(xy)a^{-1} = axeya^{-1} = axa^{-1}aya^{-1} = S(x)S(y)$$

因此 S 是同态映射。

(2) 若 $x, y \in G$, 且 $S(x) = S(y)$ 。那么 $axa^{-1} = aya^{-1}$, 从而

$$x = a^{-1}axa^{-1}a = a^{-1}aya^{-1}a = y,$$

因此 S 是单射。

(3) 任取 $c \in G$ 。由于 $S(a^{-1}ca) = a(a^{-1}ca)a^{-1} = ece = c$, 故 S 是满射。

综上所述, 映射 $S: x \rightarrow axa^{-1}$ 是 G 到自身的自同构。