


TIPE

THOMAS Etienne, COADIC Alban

22 juin 2025

Comment peut-on modéliser l'effet du vent sur un bâtiment afin d'observer les vortex de Von Kármán ?

- Moteur physique
- Simulation des fluides



$$\dot{C} : \frac{dC}{dt} = \frac{\partial C}{\partial q} \dot{q}$$

$$\ddot{C} : \dot{J}\dot{q} + J\ddot{q} = 0$$

$$\mathcal{P}(F_c) = F_c \cdot \dot{q}$$

On remarque alors que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, (J^T \lambda) \cdot \dot{q} = (J^T \lambda)^T \dot{q} = \lambda J \dot{q} = 0$$

Accélération :

$$\ddot{C} = 0 \Leftrightarrow J\ddot{q} + \dot{J}\dot{q} = 0$$

$$\Leftrightarrow J\ddot{q} = -\dot{J}\dot{q}$$

$$\Leftrightarrow JW(F_c + F) = -\dot{J}\dot{q}$$

$$\Leftrightarrow JWF_c = -JWF - \dot{J}\dot{q}$$

$$\Leftrightarrow JWJ^T \lambda = -JWF - \dot{J}\dot{q}$$

Jacobienne : $J = \frac{q^T}{\|q\|}$

Vitesse :

$$\dot{C} = 0 \Leftrightarrow J\dot{q} = 0$$

$$\Leftrightarrow JW \Delta t J^T \lambda = -J\dot{q}$$

$$\Leftrightarrow JWJ^T \lambda' = -J\dot{q}$$

Contrainte sur la position :

$$C : \|q\| - l = 0$$

Contrainte sur la vitesse :

$$\frac{dC}{dT} = 0 \Leftrightarrow \frac{q^T}{\|q\|} \dot{q} = 0$$


Contrainte sur l'accélération :


$$\frac{d^2 C}{dt^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{\dot{q}^2 q^2 - (q \cdot \dot{q})^2}{\|q\|^3} + \frac{q}{\|q\|} \cdot \ddot{q} = 0$$

Second terme ordre à l'ordre 2 :

$$\dot{J}\dot{q} = \frac{\dot{q}^2 q^2 - (q \cdot \dot{q})^2}{\|q\|^3} = \frac{(x\dot{y} - y\dot{x})^2}{(x+y)^{\frac{3}{2}}}$$

Etienne 3






$$q(t+\Delta t) = q(t) + \dot{q}(t)\Delta t + \frac{\ddot{q}(t)}{2}\Delta t^2 + O(\Delta t^3)$$

$$\frac{q(t+\Delta t) - q(t)}{\Delta t} = \dot{q}(t) + \frac{\ddot{q}(t)}{2}\Delta t + O(\Delta t^2)$$

$$JWJ^T\lambda' = -J\dot{q} - \frac{1}{2\Delta t}J\ddot{q}$$



Équation de Navier-Stokes (fluide incompressible)

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} + \mathbf{g} + \nu \Delta \mathbf{u} - \frac{1}{\rho} \nabla p \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \end{cases}$$


Équation de Navier-Stokes (fluide incompressible)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} + \mathbf{g} + \nu \Delta \mathbf{u} - \frac{1}{\rho} \nabla p \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \end{array} \right.$$

Accélération ($\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}$) = **Advection** ($-\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}$) + **Forces externes** ($\mathbf{g}$) + **Viscosité** ($\nu \Delta \mathbf{u}$) - **Pression** ($\frac{1}{\rho} \nabla p$)


Incompressibilité ($\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$) : pas d'ajout ou de retrait de fluide

Eulérien (Grille décalée)




$\rightarrow$ Vitesse $u_{i,j}$ (face verticale)
 $\uparrow$ Vitesse $v_{i,j}$ (face horizontale)
 (i, j) Indices de la cellule

Lagrangien (Particules)





Eulérien (Grille décalée)




- Pression $p_{i,j}$
- Densité $d_{i,j}$
- Vitesse $u_{i,j}$ (face verticale)
- ↑ Vitesse $v_{i,j}$ (face horizontale)
- (i,j) Indices de la cellule

Lagrangien (Particules)









Vortex de Von Karman



Problèmes



Exemples



Objectifs :

- Régler les problèmes de conservation de la masse du fluide
- Améliorer la précision du solveur fluide
- Passer a un univers en 3D et infini
- Etudier les méthodes de protection des structures face aux vents

Conclusion

Tout le monde s'en fiche de la conclusion, cf juste a insérer le logo de la MP2I pcq ptn on est des royaliste apres tout.