

**QUANTENMECHANIK, BLATT 10, SOMMERSEMESTER 2015, C. KOLLATH**

*Abgabe Di 23.06 vor der Vorlesung. Besprechung 26.06*

**I. BAHNDREHIMPULS EINES ELEKTRONS**

Wir betrachten ein Elektron in einem Zustand, der durch die folgende Wellenfunktion in Kugelkoordinaten beschrieben wird

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}(e^{i\varphi} \sin(\theta) + \cos(\theta))g(r)$$

mit

$$\int_0^\infty |g(r)|^2 r^2 dr = 1$$

und  $\phi$ ,  $\theta$  sind Azimutwinkel bzw. Polarwinkel.

- (a) Was sind die möglichen Ergebnisse einer Messung der z-Komponente des Bahndrehimpulses,  $\hat{L}_z$ , des Elektrons in diesem Zustand? (3 Punkte)
- (b) Was sind die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten die möglichen Messwerte aus (a) zu erhalten? (3 Punkte)
- (c) Was ist der Erwartungswert von  $\hat{L}_z$ ? (2 Punkte)


**II. DAS ZWEIATOMIGE MOLEKÜL: ROTATION UND VIBRATION**

Wir betrachten die Relativbewegung der zwei Atomkerne eines zweiatomigen Moleküls [Abb. (a)]. Eine Näherung für die Bewegungsgleichung des relativen Ortes  $r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$  ist gegeben durch die Schrödingergleichung für ein Zentralpotential:

$$\left( -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + V(r) + V_c(r) \right) u_{n,l}(r) = E_{n,l}(r) u_{n,l}(r),$$

mit  $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$  und  $V_c(r) = l(l+1)\hbar^2 / (2\mu r^2)$ . Das Molekülpotential  $V(r)$  hat die typische Form wie in der Abbildung (b): Ein Minimum bei  $r_b$ , ein steiler Anstieg gegen  $\infty$  für  $r \rightarrow 0$  (Abstoßung der Kerne) und ein langsamer Anstieg gegen 0 für  $r \rightarrow \infty$  (Die Wechselwirkung wird schwach für große Abstände zwischen den Kernen). Wir sind an den gebundenen Zuständen dieses Potentials interessiert. Wir nehmen an, dass die Ausdehnung dieser Zustände klein ist gegenüber  $r_b$ .

- (a) Sei  $l = 0$  (keine Rotation). Nehmen Sie eine quadratische Näherung für das Potential  $V(r)$  um  $r_b$  an (mit unbekannten Konstanten). Bestimmen Sie die Energieeigenwerte. *Hinweis: Die erhaltenen Gleichungen sollten eine wohlbekannte Form haben.* (2 Punkte)
- (b) Sei  $l = 0$ . Was ist die charakteristische Ausdehnung  $(\Delta r)_0$  des Grundzustands? Leiten Sie eine Bedingung für den Entwicklungskoeffizienten dritter Ordnung her, so dass die quadratische Näherung gerechtfertigt ist (Bemerkung: Diese Bedingung ist allgemeingültig für Moleküle.) (3 Punkte)
- (c) Jetzt ziehen wir auch  $l \neq 0$  in Betracht. Motivieren Sie die Verwendung der Näherung  $V_c(r) \approx V_c(r_b)$  für kleine Rotationsenergien, d.h.  $V_c(r_b) \ll E_{n+1,0} - E_{n,0}$ . (3 Punkte)
- (d) Mit Hilfe der Näherung  $V_c(r) \approx V_c(r_b)$  nimmt die Schrödingergleichung eine wohlbekannte Form an. Geben Sie die Energieeigenwerte an. Identifizieren Sie den Rotationsbeitrag, den Vibrationsbeitrag und die Bindungsenergie des Moleküls. (3 Punkte)



### III. STÖRUNG DES WASSERSTOFFATOMS

Wir betrachten den Hamiltonoperator des Wasserstoffatoms unter Einfluss eines zusätzlichen Störpotentials :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta - \frac{e^2}{r} + \frac{\tilde{\epsilon}}{r^2} \quad (1)$$

wobei  $\tilde{\epsilon}$  eine Konstante ist.

- a) Zeigen Sie, dass die Radialgleichung geschrieben werden kann als :

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\hbar^2}{2m} (l(l+1) + \epsilon) - \frac{e^2}{r} \right] R(r) = E R(r) \quad (2)$$

Bestimmen Sie  $\epsilon$ . (6 Punkte)

- b) Diskutieren Sie das Verhalten von Gleichung (2) für  $r \rightarrow 0$  : Wählen Sie den Ansatz  $R(r) = r^\sigma$ . Welchen Wert hat  $\sigma$  ? (3 Punkte)
- c) Diskutieren Sie das Verhalten von Gleichung (2) für  $r \rightarrow \infty$  : Zeigen Sie, dass  $R(r)$  als  $R(r) = \exp(-\kappa r)$  geschrieben werden kann. Welchen Wert hat  $\kappa$  ? (3 Punkte)
- d) Machen Sie den Ansatz

$$R(r) = r^\sigma e^{-\kappa r} W(r) \quad (3)$$

und leiten Sie eine Differentialgleichung für  $W(r)$  her. Setzen Sie  $\lambda = (2me^2)/\hbar^2$ . (5 Punkte)

- e) Zeigen Sie, dass der Ansatz als Polynom

$$W(r) = \sum_s c_s r^s \quad (4)$$

zu der Gleichung

$$c_{s+1} = c_s \frac{2\kappa(\sigma + s) - \lambda}{(s+1)(2\sigma + s)} \quad (5)$$

führt. Warum muss die Reihe bei einem maximalen  $s$  abbrechen ?

Was kann man daraus für die Energieeigenwerte ableiten ? (6 Punkte)

- f) Angenommen  $\epsilon \ll (2l+1)^2$ . Bestimmen Sie die Energieeigenwerte  $E_n$  mit  $n \equiv s + l + 1$ . (4 Punkte)