

Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ»

Курсовая работа  
по Общей физике (Электричество и магнетизм)

Выполнили: Костенко Ю. А.,  
Зеленев В. С.

Москва - 2024

# Содержание

<b>1</b>	<b>Постановка задач</b>	<b>iii</b>
1.1	Задача 1 . . . . .	iii
1.2	Задача 2 . . . . .	iii
1.3	Задача 3 . . . . .	iii
<b>2</b>	<b>Задача 1</b>	<b>iv</b>
2.1	Электродинамика с монополями . . . . .	iv
2.2	Движение диона в различных полях . . . . .	vi
<b>3</b>	<b>Задача 2</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Задача 3</b>	<b>xi</b>

# 1 Постановка задач

## 1.1 Задача 1

Исследовать электродинамику с монополями. Рассмотреть движение диона в однородном электрическом поле  $E$ ; в однородном магнитном поле  $B$ ; в скрещивающихся однородных электрическом и магнитном полях  $E$  и  $B$ , причем считать, что  $E \perp B$ .

## 1.2 Задача 2

Исследовать модель Изинга для ферромагнетиков. Рассчитать вектор намагниченности, получить петлю гистерезиса (если возможно).

## 1.3 Задача 3

Изучить движение заряженной частицы в равновесной электронейтральной плазме. Все необходимые параметры плазмы и частицы даны.

## 2 Задача 1

### 2.1 Электродинамика с монополями

Как известно, классические уравнения Максвелла несимметричны относительно обмена электрических и магнитных полей. Это, во многом, связано с отсутствием магнитных зарядов. Однако существуют различные теории, которые предполагают их существование и позволяют исследовать так называемую электродинамику с монополями, чему и будет посвящен этот раздел.

Сперва следует договориться об обозначениях. Работать будем в системе СГС. К обозначениям будем добавлять индексы  $e$  или  $\mu$ , в зависимости от того, с чем связан соответствующий объект (конкретная связь обычно будет понятна из контекста).

Начнем с получения новых уравнений Максвелла, а также преобразований обмена полей. Выпишем, для начала, классические уравнения Максвелла, с учетом соглашений об обозначениях:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= 4\pi\rho_e \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} &= \frac{4\pi}{c}\vec{j}_e + \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

Очевидно, что для получения симметричных уравнений, во второе из них необходимо добавить член, связанный с плотностью магнитных зарядов  $\rho_\mu$ , а в третье — с током магнитных зарядов  $\vec{j}_\mu$ . После их добавления получается следующая система уравнений:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= 4\pi\rho_e \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 4\pi\rho_\mu \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{4\pi}{c}\vec{j}_\mu - \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} &= \frac{4\pi}{c}\vec{j}_e + \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

При этом минус в третьем уравнении необходим из-за вида искомой симметрии. Полученная система уравнений оказывается симметрична относительно следую-

щего преобразования:

$$\begin{aligned}
\vec{E} &\rightarrow \vec{B} \\
\vec{B} &\rightarrow -\vec{E} \\
\rho_e &\rightarrow \rho_\mu \\
\rho_\mu &\rightarrow -\rho_e \\
\vec{j}_e &\rightarrow \vec{j}_\mu \\
\vec{j}_\mu &\rightarrow -\vec{j}_e
\end{aligned}$$

Опираясь на эти преобразования и на известные формулы классической электродинамики, можно получить следующие выражения:

$$\frac{\partial \rho_e}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j}_e = 0 \rightarrow \frac{\partial \rho_\mu}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j}_\mu = 0$$

$$\varphi_e = \frac{q_e}{r} \rightarrow \varphi_\mu = \frac{q_\mu}{r}$$

$$\vec{E} = \frac{q_e}{r^3} \vec{r} \rightarrow \vec{B} = \frac{q_\mu}{r^3} \vec{r}$$

$$\vec{B} = \frac{q_e}{c} \frac{\vec{v} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \rightarrow \vec{E} = -\frac{q_\mu}{c} \frac{\vec{v} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{F}_e = q_e(\vec{E} + \frac{1}{c} \vec{v} \times \vec{B}) \rightarrow \vec{F}_\mu = q_\mu(\vec{B} - \frac{1}{c} \vec{v} \times \vec{E})$$

## 2.2 Движение диона в различных полях

Как следствие **симметризации** уравнений Максвелла, осуществлённой в предыдущем разделе задачи путём определения некоторой модели "**монополя**" (частицы, являющейся независимым **источником** центрально-симметричного **магнитного поля**), имеет место рассмотрение модели "**диона**" (частицы  $m$ , обладающей не только собственным **электрическим**  $q_e$ , но и собственным **магнитным** зарядом  $q_\mu$ ).

**Дион** можно поочерёдно поместить в однородное **электрическое**, однородное **магнитное** поле, а также в поле, представляющее **суперпозицию** оных полей, **скрещенных** под **прямым** углом в пространстве, и рассмотреть особенности его динамики.

Рассмотрим **общее уравнение динамики диона** (в системе СГСЭ):

$$m\dot{\vec{v}} = q_e \left( \vec{E} + \frac{1}{c} \cdot [\vec{v} \times \vec{B}] \right) + q_\mu \left( \vec{B} - \frac{1}{c} \cdot [\vec{v} \times \vec{E}] \right), \text{ где:}$$

$\vec{v} = \{v_x, v_y, v_z\}$  – вектор скорости частицы;

$\vec{E} = \{E_x, E_y, E_z\}$  – вектор электрической напряжённости;

$\vec{B} = \{B_x, B_y, B_z\}$  – вектор магнитной индукции.

Рассмотрим движение диона только в однородном электрическом поле ( $\vec{B} = \vec{0}$ ), задающемся в пространстве вектором электрической напряжённости вида  $\vec{E} = \{E_x, 0, 0\}$ .

Запишем уравнение динамики для данного случая:

$$m\dot{\vec{v}} = E_x \left( q_e - q_\mu (v_z \vec{e}_y - v_y \vec{e}_z) \right)$$

Рассмотрим следующую систему линейных дифференциальных уравнений  $II$ -го порядка относительно времени  $t$ :

$$(*) \begin{cases} \ddot{x} = \frac{q_e E_x}{m} \\ \ddot{y} = -\frac{q_\mu E_x}{mc} \cdot \dot{z} \\ \ddot{z} = \frac{q_\mu E_x}{mc} \cdot \dot{y} \end{cases}$$

Произведём переобозначение вышеописанных групп констант:

$$\beta_1 = \frac{q_e E_x}{m}, \quad \omega_E = \frac{q_\mu E_x}{mc}$$

Перепишем систему уравнений (\*) следующим образом:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \beta_1 & (1) \\ \ddot{y} = -\omega_E \cdot \dot{z} & (2) \\ \ddot{z} = \omega_E \cdot \dot{y} & (3) \end{cases}$$

Найдём решение уравнения (1), дважды его проинтегрировав:

$$x = \frac{\beta_1 t^2}{2} + C_1 t + C_2, \quad \{C_1, C_2\} = const \quad (4)$$

Далее, найдём решения уравнений (2) и (3).

При выражении из уравнения (2)  $\dot{z}$  и подстановке его в уравнение (3), получим следующего вида линейное дифференциальное уравнение *III*-го порядка относительно  $t$ :

$$\ddot{y} + \omega_E^2 \cdot \dot{y} = 0 \quad (5)$$

Произведём следующую замену  $\dot{y} = \xi$  и перепишем уравнение (5) в следующем виде:

$$\ddot{\xi} + \omega_E^2 \cdot \xi = 0 \quad (6)$$

Получили дифференциальное уравнение вида  $\{F(\xi, \ddot{\xi}) = 0\}$  с возможностью понижения порядка.

Воспользуемся данной возможностью — произведём следующие замены:

$$\dot{\xi} = p(\xi), \quad \ddot{\xi} = p(\xi) \cdot p'(\xi)$$

В таком случае, уравнение (6) можно переписать следующим образом:

$$p' + \frac{\omega_E^2 \cdot \xi}{p} = 0$$

Решим полученное уравнение методом разделения переменных — найдём функцию  $p(\xi) = \dot{\xi}$ :

$$\frac{dp}{d\xi} = -\frac{\omega_E^2 \cdot \xi}{p}$$

$$pdp = -\omega_E^2 \cdot \xi d\xi$$

$$p = \pm \sqrt{\widehat{C}_1 - \omega_E^2 \xi^2}, \quad \widehat{C}_1 = const$$

Таким образом, получили функцию  $\dot{\xi} = \pm \sqrt{\widehat{C}_1 - \omega_E^2 \xi^2}$ ,  $\widehat{C}_1 = const$ .

Продолжим решение уравнения — найдём аналогичным способом функции  $\xi(t) = \dot{y}$  и  $y(t)$  соответственно:

$$\dot{\xi} = \pm \sqrt{\widehat{C}_1 - \omega_E^2 \xi^2}$$

$$\pm \frac{d\xi}{\sqrt{\widehat{C}_1 - \omega_E^2 \xi^2}} = dt$$

$$\pm \arcsin \left( \frac{\omega_E}{\sqrt{\widehat{C}_1}} \xi \right) = \omega_E t + \widehat{C}_2, \quad \widehat{C}_2 = const$$

$$\frac{\omega_E}{\sqrt{\widehat{C}_1}} \xi = \pm \sin (\omega_E t + \widehat{C}_2)$$

$$\xi = \pm \frac{\sqrt{\widehat{C}_1}}{\omega_E} \sin (\omega_E t + \widehat{C}_2)$$

$$\dot{y} = \pm \frac{\sqrt{\widehat{C}_1}}{\omega_E} \sin (\omega_E t + \widehat{C}_2)$$



$$dy = \pm \frac{\sqrt{\widehat{C}_1}}{\omega_E} \sin(\omega_E t + \widehat{C}_2) dt$$

$$y = \pm \frac{\sqrt{\widehat{C}_1}}{\omega_E^2} \cos(\omega_E t + \widehat{C}_2) + \widehat{C}_3, \quad \widehat{C}_3 = \text{const}$$

В результате получили итоговое решение дифференциального уравнения (5):

$$y = \pm \frac{\sqrt{\widehat{C}_1}}{\omega_E^2} \cos(\omega_E t + \widehat{C}_2) + \widehat{C}_3, \quad \{\widehat{C}_1, \widehat{C}_2, \widehat{C}_3\} = \text{const}$$

Подставим получившееся уравнение  $y = y(t)$  в уравнение (3) и найдём уравнение  $z = z(t)$ :

## 3    Задача 2

## 4    Задача 3