

Noțiuni de bază despre analiza și stilizarea rasterelor

QGIS Tutorials and Tips



Author

Ujaval Gandhi

<http://google.com/+UjavalGandhi>

Translations by

Sorin Călinic

Noțiuni de Bază despre Analiza și Stilizarea Rasterelor

Multe activități de cercetare și observare științifică generează seturi de date raster. Rasterele sunt, în esență, grile de pixeli, cărora le este atribuită o anumită valoare. Prin efectuarea de operații matematice cu aceste valori, vor rezulta analize interesante. QGIS are unele capacități interne de analiză, accesibile prin intermediul *Raster Calculator*. În acest tutorial, vom explora elementele de bază cu privire la utilizarea *Raster Calculator* și opțiunile disponibile pentru stilizarea rasterelor.

Privire de ansamblu asupra activității

Vom folosi datele privind densitatea populației, pentru a găsi și a vizualiza zone ale lumii, care au suferit schimbări dramatice în densitatea populației între 1990 și 2000.

Alte competențe pe care le veți dobândi

- Selectarea și încărcarea în QGIS a seturilor de date multiple, într-un singur pas.

Obținerea datelor

Vom folosi setul de date [Gridded Population of the World \(GPW\) v3](#) Universității Columbia. În mod specific, avem nevoie de densitatea populației pentru întregul glob, în format ASCII, și pentru anii 1990 și 2000.

Iată cum să căutați și să descărcați datele revelante.

1. Mergeți la [Population Density Grid, v3 download page](#). Alegeți formatul *.ascii*, rezoluția 1° și anul 1990 pentru *Data Attributes*. Faceți clic pe *Download*. În acest moment, puteți crea un cont gratuit, apoi să vă conectați, sau să folosiți butonul *Guest Download* din partea de jos, pentru a descărca imediat datele. Repetați procesul pentru datele anului 2000.

[Set Overview](#)
[Data Download](#)
[Maps](#)
[Map Services](#)
[Metadata](#)

Downloads

Recommended Citation:

Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT. 2005. Gridded Population of the World, Version 3 (GPWv3): Population Density Grid. NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). <http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/gpw-density>. Accessed DAY MONTH YEAR.

Download this Citation:

Please check the Research Note field for issues pertaining to importing authors that are organizations.

ENW

Use this format for EndNote and RefWorks software.

RIS

Use this format for ProCite, Reference Manager and Zotero software.

Data:

Geography:

Region » Global

Data Set:

Population Density Grid

Data Attributes:

.ascii

1°

1990

Download


[feedback and support](#)

Acum aveți descărcate 2 fișiere zip.

Sursa de date [GPW3]

Procedura


2. Deschideți QGIS și mergeți la *Layer* ► *Add Raster Layer...*



3. Localizați fișierele zip descărcate. Apăsând tasta Ctrl și făcând clic pe ambele fișiere zip, pentru a le selecta. Astfel, le veți putea încărca într-un singur pas.



4. Fiecare fișier zip conține 2 fișiere grilă. Litera a din numele fișierului sugerează că valorile corespunzătoare populației au fost ajustate pentru a se potrivi cu totalurile ONU. Vom folosi grilele ajustate, pentru acest tutorial. Selectați `gl_ds00ag60.asc` ca strat de adăugat. Clic pe OK.




5. Stratul nu are un CRS definit, deci din moment ce grilele sunt în lat/long, alegeți `EPSG: 4326` ca sistem de coordonate de referință.




6. Din moment ce am selectat ambele fișiere zip, veți vedea, încă o dată, ferestre de dialog similare. Repetați procesul și selectați grila glds90ag60.asc, pentru a fi adăugat ca strat.



7. Încă o dată, alegeți *EPSG:4326* ca CRS.



8. Acum, veți vedea ambele rastere încărcate în QGIS. Rasterul este redat în tonuri de gri; pixelii întunecați indicând valorile mai mici, iar cei deschii valorile mai mari.



9. Fiecare pixel din raster are asignat o valoare. Această valoare reprezintă densitatea populației din grila respectivă. Faceți clic pe butonul *Identify Features* pentru a selecta instrumentul, apoi faceți clic oriunde pe raster, pentru a vedea valoarea pixelilor.



10. Pentru a vizualiza mai bine modelul densității populației, ar trebui să-l stilizăm. Faceți clic dreapta pe numele stratului și selectați *Properties*. Puteți efectua, de asemenea, dublu-clic pe numele stratului din Cuprins, pentru a deschide fereastra de dialog Layer Properties.



11. Sub fila *Style* schimbați *Render type* pe *Singleband pseudocolor*. Apoi, efectuați clic pe *Classify* de sub *Generate a new color map*. Veți observa valorile a 5 noi culori. Apăsăți *OK*.



12. Înapoi, în suportul hărții din QGIS, rasterul va fi redat asemănător unei zone fierbinți. Repetați aceeași procedură și pentru cealalt raster.



13. Pentru analiza noastră, ne dorim să găsim zonele cu cea mai mare schimbare a populației între 1990 și 2000. Acest lucru se face prin găsirea diferenței dintre valorile pixelilor din grilele celor două straturi. Selectați *Raster* → *Raster calculator*.



14. În secțiunea *Raster bands*, puteți selecta stratul efectuând dublu-clic pe numele lui. Benzile sunt denumite după numele rasterului, urmat de @ și de numărul benzii. Din moment ce fiecare dintre rastele noastre au doar 1 bandă, veți vedea doar 1 intrare pe raster. Calculatorul raster poate efectua operații matematice asupra pixelilor din raste. În acest caz, dorim să introducem o formulă simplă pentru a scădea densitatea populației anului 1990 din cea a anului 2000. Introduceți formula `glds00ag60@1 - glds90ag60@1`. Denumiți stratul de ieșire ca *pop_density_change_2000_1990.tif* și bifați caseta de lângă *Add result to project*. Apoi faceți clic pe *OK*.



15. O dată ce operațiunea este completă, veți vedea noul strat încărcat în QGIS.



16. Această vizualizare a tonurilor de gri este utilă, dar putem crea o imagine mult mai informativă. Faceți clic dreapta pe stratul `pop_density_change_2000_1990` și selectați *Properties*.



17. Vrem să stilizăm stratul în așa fel încât valorile pixelilor, cuprinse în anumite game, să aibă aceeași culoare. Înainte de asta, mergeți la fila *Metadata* și uitați-vă la proprietățile rasterului. Notați valorile minime și maxime ale acestui strat.



18. Acum, mergeți la fila *Style*. Selectați *Singleband pseudocolor* pentru *Render type* din secțiunea *Band Rendering*. Setați *Discrete* pentru *Color interpolation*. Faceți clic pe butonul *Add entry* de 4 ori, pentru a crea 4 clase unice. Faceți clic pe o intrare pentru a modifica valorile. Harta de culori lucrează în așa fel, încât toate valorile mai mici decât valoarea introdusă vor avea culoarea acelei intrări. Având în vedere că valorile minime din rasterul nostru sunt mai mari de -2000, vom alege -2000 ca primă intrare. Acest lucru va fi valabil pentru valorile No Data. Introduceți valorile și etichetele pentru alte intrări, la fel ca în imaginea de mai jos, și faceți clic pe *OK*.



19. În acest moment, veți vizualiza mult mai bine zonele care au înregistrat schimbări pozitive sau negative în densitatea populației. Faceți clic pe butonul *Zoom In* în glisă, realizând un dreptunghi deasupra Europei, pentru a explora regiunea în detaliu.



20. Selectați instrumentul *Identify* și faceți clic pe regiunile Roșii și Albastre, pentru a vă convinge că regulile de stilizare lucrează așa cum vă așteptați.



21. Acum, haideți să ducem această analiză cu un pas mai departe și să găsim doar zonele cu densitate *negativă* a populației. Deschideți *Raster* ► *Raster calculator*.



22. Introduceți expresia `pop_density_change_2000_1990@1 < -10`. Această expresie va seta valoarea pixelului la 1 în cazul satisfacerii expresiei, sau la 0 în caz contrar. Așa că vom obține un raster al căror pixeli vor avea valoarea 1 acolo unde schimbarea a fost negativă, și 0 acolo unde nu a fost negativă. Denumiți stratul de ieșire ca `negative_pop_change_2000_1990` și bifați caseta de lângă *Add result to project*. Faceți clic pe OK.



23. O dată ce noul strat a fost încărcat, efectuați clic dreapta pe el și selectați *Properties*. În fila *Transparency*, adăugați 0 ca *Additional no data value*. De asemenea, această setare va face pixelii cu valoarea 0 transparenți. Clic pe *OK*.



24. Vezi vedea c ariile cu densitate negativ a populaiei sunt alcătuite din pixeli gri.

