

哪些代谢物在更多癌种中同向改变？

按同一方向 P < 0.05 的癌种数排序 · ccRCC 两队列只计一个癌种

	BRCA	COAD	GBM	PDAC	PRAD	ccRCC3	ccRCC4	同向显著 / 可评估 癌种数
肌酐	●	●	●	○	●	●	●	↓ 5 / 6
2-羟基戊二酸 ¹	●	●	●	—	○	●	●	↑ 4 / 5
丁酰肉碱	●	—	—	●	●	●	○	↑ 4 / 4
肌苷	●	●	—	●	●	●	○	↓ 4 / 5
甘氨酸	●	○	●	○	●	○	○	↑ 3 / 6
麦芽糖	●	—	●	○	○	●	●	↑ 3 / 5
犬尿氨酸	●	●	—	○	○	●	●	↑ 3 / 5
N-乙酰甲硫氨酸	●	●	—	○	○	●	●	↑ 3 / 5

● 升高

● 降低

● 实心 P < 0.05

○ 空心 P ≥ 0.05

— 未覆盖

肌酐：5 癌显著降低

同向次数最多，不要求所有队列方向一致。

肌苷在 ccRCC3 显著升高，反向结果保留；未显著方向不计入同向显著癌种数。

¹ 2-羟基戊二酸沿用源注释，未区分 D/L。并列排序及完整来源见附表；GBM 为非配对比较。