1. Регрессионная модель задана в матричном виде при помощи уравнения $y = X\beta + \varepsilon$, где $\beta = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)'$. Известно, что $\mathbb{E}(\varepsilon) = 0$ и $\mathbb{V}\mathrm{ar}(\varepsilon) = \sigma^2 \cdot I$. Известно также, что

$$y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для удобства расчетов приведены матрицы

$$X'X = \left(\begin{array}{ccc} 5 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \text{ if } (X'X)^{-1} = \frac{1}{2} \left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{array}\right).$$

- (a) Найдите вектор МНК-оценок коэффициентов $\hat{\beta}$.
- (b) Найдите несмещенную оценку для неизвестного параметра σ^2 .
- (c) Проверьте гипотезу $\beta_2=0$ против альтернативной о неравенстве на уровне значимости 5%
- 2. По данным о пассажирах Титаника оценивается логит-модель. Зависимая переменная survived равна 1, если пассажир выжил. Объясняющая переменная sexmale равна 1 для мужчин.

	Model 1
(Intercept)	1.92***
	(0.28)
age	-0.01
	(0.01)
sexmale	-2.84***
	(0.21)
AIC	633.45
BIC	646.80
Log Likelihood	-313.72
Deviance	627.45
Num. obs.	633
$^{***}p < 0.001, ^{**}p < 0.01, ^{*}p < 0.05$	

Таблица 1: Statistical models

- (а) Оцените вероятность выжить для женщины 20 лет
- (b) Оцените предельный эффект увеличения возраста для женщины 20 лет
- (с) С помощью какого метода оценивается логит-модель? Каким образом при этом получаются оценки стандартных ошибок коэффициентов?
- 3. Теорема Гаусса-Маркова.
 - (а) Аккуратно сформулируйте теорему Гаусса-Маркова для стохастических регрессоров.
 - (b) Поясните каждое из свойств оценок, фигурирующих в теореме.
 - (c) Как меняются свойства оценок МНК при нарушении предпосылки теоремы о том, что условная дисперсия ε_i постоянна?