

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Problemes d'Anàlisi Real
FME Curs 2020/21

Tema 1: Successions i sèries de funcions.

1. Estudieu la convergència puntual i uniforme de les següents funcions:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} f_n(x) = \begin{cases} 0 & \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \\ -nx + 1 & 0 \leq x < \frac{1}{n} \end{cases} & \text{(b)} f_n(x) = \frac{\sin x}{n}, \quad x \in \mathbb{R} \\ \text{(c)} f_n(x) = \frac{x^{2n}}{1+x^{2n}}, \quad x \in \mathbb{R} & \text{(d)} f_n(x) = \frac{(x+1)^n - 1}{(x+1)^n + 1}, \quad x \in \mathbb{R} \end{array}$$

2. Sigui $y = f(x)$ una funció definida a l'interval $[a, b]$ satisfent $\forall x \in [a, b], f(x) \geq \alpha > 0$.

Es considera la successió $f_n(x) = \frac{nf(x)}{(1+nf(x))}$.

Proveu que $\forall x \in [a, b], f_n(x) \rightarrow 1$ uniformement. Què passa si existeix $\gamma \in [a, b]$ tal que $f(\gamma) = 0$ (amb f contínua)? i si f no és contínua (per exemple si $f(x) = 3$ si $x \neq \gamma$ però $f(\gamma) = 0$)?

3. Estudieu la convergència puntual i uniforme de les successions

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \{ \sqrt[n]{x} \}, \quad x > 0 & \text{(b)} \left\{ \frac{e^x}{x^n} \right\}, \quad x > 0 \\ \text{(c)} \left\{ e^{-nx^2} \right\}, \quad x \in \mathbb{R} & \text{(d)} \left\{ \frac{e^{-nx^2}}{n} \right\}, \quad x \in \mathbb{R} \end{array}$$

4. Estudieu la convergència uniforme de

$$f_n(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)(x+2)} - \cdots - \frac{1}{(x+n-1)(x+n)}$$

a $[0, 1]$. Ajuda: Intenteu sumar $f_n(x)$.

5. Sigui $f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$. Proveu que $\{f_n(x)\}$ convergeix uniformement a tot \mathbb{R} però que $f'_n(x)$ no convergeix a cap punt.
6. Sigui la funció $f_n(x) = 2nxe^{-nx^2}$ definida a l'interval $[0, 1]$. Comproveu que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \neq \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$$

7. Estudieu la validesa del teorema sobre la integral de la funció límit d'una successió de funcions per a la successió

$$f_n(x) = \frac{nx}{(1+nx^2)} \text{ per a } x \in [0, 1]$$

8. Feu servir els resultats sobre integració de la funció límit per provar que la successió $f_n(x) = n^2 x^n (1-x)$ no convergeix uniformement a l'interval $[0, 1]$.
9. Proveu els següents resultats relatius a la successió

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & x > n^2 \\ \frac{1}{n} & n^2 \geq x \geq 0 \end{cases}$$

- (a) $\{f_n(x)\}$ convergeix uniformement a $[0, \infty)$. Determineu la funció límit $f(x)$.
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(x) \, dx \neq \int_0^\infty f(x) \, dx$

Repetiu els mateixos càlculs amb la successió

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & x > n^2 \\ \frac{1}{n^3} & n^2 \geq x \geq 0 \end{cases}$$

10. Es consideren $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n}$ i $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$

Comproveu que malgrat que la convergència $\{f_n, f\}$ sigui uniforme a tot \mathbb{R} , $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) \neq f'(x)$.

11. Sigui

$$f_n(x) = \begin{cases} \sin^2(\frac{\pi}{x}) & \frac{1}{n+1} \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

Comproveu que $f_n(x)$ convergeix vers una funció contínua però no hi convergeix uniformement.

12. Proveu els resultats següents:

- (a) $\sum_{n \geq 1} n^{-x}$ convergeix uniformement a $[r, \infty)$ amb $r > 1$
- (b) $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} \sin(2^n \pi x)$, convergeix uniformement a qualsevol interval de la recta real.
Què li passa a la successió de les derivades?
- (c) La funció límit de

$$\sum_{n \geq 1} (n^4 + x^4)^{-1}$$

és contínua.

13. Estudieu la convergència de les sèries:

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\cos nx}{n^3} \qquad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{1 + x^{2n}}$$

14. Estudieu la convergència de les sèries:

$$\sum_{n \geq 1} n e^{-nx} \qquad \sum_{n \geq 1} n^{75} e^{-nx} \qquad \sum_{n \geq 1} |x \ln x|^n$$

15. Estudieu la convergència de les sèries:

$$\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n!} e^{-nx} \quad x \in [0, 1] \qquad \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n x^n}{n} \quad x \in [0, 1]$$

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n+x} \quad x \geq 0 \qquad \sum_{n \geq 1} \frac{\sin nx}{n} \quad x \in [\delta, 2\pi - \delta]; \quad \delta > 0$$

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin nx}{n} e^{-nx} \quad x \in [\delta, 2\pi - \delta]; \quad \delta > 0$$

Indicació. $\sin(kx) \sin(\frac{x}{2}) = \frac{1}{2} [\cos((k + \frac{1}{2})x) - \cos((k - \frac{1}{2})x)]$. Sumeu per k .

16. Comproveu que $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{x^2 + n}{n^2}$ convergeix uniformement sobre qualsevol interval real fitat, però no ho fa absolutament.

17. Sigui $x \in [0, 1]$ i definim

$$f_n(x) = \begin{cases} (n+1)[(n+2)x - 1] & \text{si } \frac{1}{n+2} \leq x \leq \frac{1}{n+1} \\ (n+1)[1 - nx] & \text{si } \frac{1}{n+1} \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \text{pels altres } x \in [0, 1]. \end{cases}$$

Demostreu que $\{f_n(x)\}$ convergeix a la funció contínua $f(x) = 0$ puntualment però que no ho fa uniformement.

18. Sigui $x \in [-1, 1]$ i

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{n-1}{n} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Demostreu que $\{f_n(x)\}$ convergeix uniformement. Calculeu la successió de derivades i vegeu que també convergeix uniformement a la derivada del límit de $\{f_n(x)\}$.

19. Demostreu que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^2}{n^3 + x^3} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n^3 + 1}.$$

20. Estudieu la convergència puntual i uniforme de la sèrie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin nx}{\log n}.$$

21. Demostreu que la successió $(f_n(x))$ amb

$$f_n(x) = \frac{x^2}{x^2 + (1 - nx)^2}$$

no té cap subsuccessió que convergeixi uniformement a $[0, 1]$.

22. Es considera la sèrie funcional

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n e^{-nx}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- (a) Proveu que existeix $a \in \mathbb{R}$ tal que la sèrie convergeix puntualment si $x \in (a, +\infty)$ i divergeix si $x \in (-\infty, a]$.
- (b) Demostreu, de dues maneres independents, que la sèrie és uniformement convergent a $[b, +\infty)$, per a tot $b > a$.
- (c) Calculeu la suma de la sèrie.

23. Proveu que la sèrie funcional

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + a^2)^n}, \quad 0 \leq a < 1$$

convergeix uniformement a qualsevol conjunt de la forma

$$(-\infty, -\alpha] \cup [\beta, +\infty)$$

amb $\alpha, \beta > +\sqrt{1-a^2}$. Què passa si $a \geq 1$? Calculeu la suma de la sèrie.

24. Sigui la sèrie funcional

$$\sum_{n \geq 1} \frac{e^{-2nx}}{4n^2 - 1}.$$

- (a) Demostreu que convergeix uniformement a $[0, +\infty)$. Sigui $S(x)$ la funció límit. L'objectiu d'aquest problema és calcular $S(x)$.
- (b) Demostreu que, si multipliquem cada terme de la sèrie per e^{-x} i derivem el resultat, s'obté una sèrie que convergeix uniformement a $[\alpha, +\infty)$, $\forall \alpha > 0$. Sigui $T(x)$ la funció definida per aquesta nova sèrie.
- (c) Vegeu que, si multipliquem els termes de la sèrie de $T(x)$ per e^{2x} i derivem, obtenim de nou una sèrie que convergeix uniformement a $[\alpha, +\infty)$, $\forall \alpha > 0$. Sigui $U(x)$ la funció definida per aquesta darrera sèrie.
- (d) Demostreu que $U(x) = (2 \sinh x)^{-1}$.
- (e) Demostreu que $T(x) = 1/2 e^{-2x} \log((e^x - 1)/(e^x + 1))$. Ajuda: determineu la constant d'integració estudiant el comportament de $e^{3x}T(x)$ quan $x \rightarrow +\infty$.
- (f) De nou integrant, calculeu $S(x)$.
- (g) L'expressió obtinguda per a $S(x)$ és vàlida a $(0, +\infty)$. Es pot estendre a $x = 0$?
- (h) Demostreu que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2}$. Per tant, l'extensió de $S(x)$ a $x = 0$ coincideix amb la suma de la sèrie inicial quan $x = 0$.

25. Sigui $K : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funció tal que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |K(t)| \, dt < \infty, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} K(t) \, dt = 1$$

Si $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ està fitada a tot \mathbb{R} , definim

$$f_n(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x + \frac{t}{n}\right) K(t) \, dt = n \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) K(n(u-x)) \, du.$$

Demostreu que $f_n \rightarrow f$ uniformement a qualsevol interval $[a, b]$.

Un exemple ve donat pel nucli de Féjer:

$$K(t) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^2.$$

26. Considereu la sèrie funcional

$$\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \frac{n+1}{n} e^{nx}.$$

- (a) Trobeu els intervals de convergència puntual i uniforme.
- (b) Sumeu-la.

27. Sigui

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + n^2 x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- (a) Demostreu que $(f_n) \rightarrow 0$ uniformement a \mathbb{R} .
- (b) Proveu que

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

convergeix uniformement a qualsevol interval de la forma $[x_0, +\infty)$ amb $x_0 > 0$.

- (c) Proveu que, si m és un enter positiu,

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n\left(\frac{1}{m}\right) > \frac{1}{2},$$

i deduiu que la convergència de la sèrie no pot ser uniforme a cap interval que contingui el zero.

28. Determineu el radi de convergència de les sèries de potències definides pel terme general a_n .

- (a) $a_n = \frac{1}{(n^2+2n)}$
- (b) $a_n = \frac{\log n}{n}$
- (c) $a_n = \frac{1}{(n^{\log n})}$
- (d) $a_n = \frac{1}{n(\log n)^2}$
- (e) $a_n = \frac{1}{(4n-1)!}$

29. Estudieu, si s'escau, la convergència de les següents sèries en els extrems de l'interval de convergència.

- (a) $1 + \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}$
- (b) $\sum_{n \geq 1} \frac{10^n}{n} x^n$
- (c) $\sum_{n \geq 1} \frac{(n-1)}{n!} x^n$
- (d) $1 + \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^k}$

30. Desenvolpeu en sèrie de potències centrada en el punt 0 cada una de les següents funcions. Determineu, també, els radis de convergència de les sèries que heu obtingut.

$$f(x) = \frac{1}{10+x} \quad g(x) = \cos(x+a)$$

31. Desenvolpeu \sqrt{x} en potències de $x-1$. Determineu el radi de convergència.

32. A partir dels desenvolupaments de e^x , $\sin x$, $\cos x$, $\log(1+x)$ i de $(1+x)^m$ ($m \in \mathbb{R}$), determineu els de les següents funcions:

(a) $(1+x)\log(1+x)$

(b) $(1+x)e^x$

(c) $(1+e^x)^3$

(d) $\frac{1}{(4-x^4)}$

(e) $\frac{3}{(1-x)(1+2x)}$

(f) $\sqrt[3]{8+x}$

(g) $\frac{x^2-3x+1}{x^2-5x+6}$

33. Sabent que

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

proveu que

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{x} dx = \frac{\pi^2}{12} \quad \int_0^1 \frac{\log(1-x)}{x} dx = -\frac{\pi^2}{6}$$

34. Relacionant-les amb sèries conegudes, calculeu la suma de les següents sèries de potències:

$$\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n(n-1)} \quad \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n(n+1)} \quad \sum_{n \geq 0} n^2 x^n$$

35. Elevant al quadrat l'expressió $(1-x)^{-1} = \sum_{n \geq 0} x^n$, proveu $(1-x)^{-2} = \sum_{n \geq 0} (n+1)x^n$.

36. Sabent que la corresponent sèrie és alternada, determineu el mínim nombre de termes que cal prendre per calcular $\cos 10^0$ amb un error menor que 10^{-4} . Calculeu aquest valor.

37. Calculeu $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ amb un error menor que 10^{-5} .

38. Calculeu $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ amb un error menor que 10^{-4} .

39. Calculeu $\frac{1}{\sqrt{e}}$ amb un error menor que 10^{-3} . Feu servir el desenvolupament en sèrie de e^{-x} .

40. Per a quins valors de x , l'aproximació $\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2}$ indueix un error menor o igual que 10^{-2} ? Idem per a 10^{-5} .

41. Es diu que la sèrie numèrica $\sum_n a_n$ és *sumable Abel* a α si

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_n a_n x^n = \alpha,$$

on la sèrie de potències es suposa que convergeix a $[0, 1)$.

- (a) Demostreu que la sèrie divergent $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n$ és sumable Abel a $1/2$.
- (b) Discutiu la sumabilitat Abel de la sèrie divergent $1 - 2 + 3 - 4 + \dots$.
- (c) Discutiu la sumabilitat Abel de la sèrie harmònica $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$.