

3.28. Considerem a \mathbb{Z} les operacions

$$a \oplus b = a + b - 6;$$

$$a \odot b = ab + \alpha(a + b) + 42,$$

on $\alpha \in \mathbb{Z}$.

1) **Comproveu que (\mathbb{Z}, \oplus) és un grup commutatiu.**

Per ser un grup commutatiu, l'operació \oplus ha de complir les propietats associativa i commutativa i ha de tenir element neutre i invers per tots els elements de \mathbb{Z} . Comprovem-ho:

- Associativa: comprovem que $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c = a \oplus b \oplus c$.

$$a \oplus (b \oplus c) = a + (b \oplus c) - 6 = a + (b + c - 6) - 6 =$$

$$(a + b - 6) + c - 6 = (a \oplus b) + c - 6 = (a \oplus b) \oplus c. \square$$

- Commutativa: comprovem que $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \oplus b = b \oplus a$.

$$a \oplus b = a + b - 6 = b + a - 6 = b \oplus a. \square$$

- Existència del neutre: suposem que $\exists e \in \mathbb{Z} : a \oplus e = a$ i el trobem.

$$a \oplus e = a \iff a + e - 6 = a \iff e - 6 = 0 \iff e = 6.$$

En ser \oplus commutativa, ens podem estalviar comprovar per l'altre costat.

- Existència de l'invers: suposem que $\exists a' \in \mathbb{Z} : a \oplus a' = e$ i el trobem.

$$a \oplus a' = e \iff a + a' - 6 = 6 \iff a' = 12 - a.$$

2) **Demostreu que l'operació \odot és associativa si, i només si, $\alpha = -6$ o $\alpha = 7$.**

L'operació \odot serà associativa quan $a \odot (b \odot c) = (a \odot b) \odot c = a \odot b \odot c$. Veiem què passa quan igualem les expressions per cada un dels costats de la tesi:

- $a \odot (b \odot c) = a(b \odot c) + \alpha(a + b \odot c) + 42 = a(bc + \alpha(b + c) + 42) + \alpha(a + bc + \alpha(b + c) + 42) + 42$
- $(a \odot b) \odot c = (a \odot b)c + \alpha(a \odot b + c) + 42 = (ab + \alpha(a + b) + 42)c + \alpha(ab + \alpha(a + b) + 42 + c) + 42$

En igualar,

$$a(bc + \alpha(b + c) + 42) + \alpha(a + bc + \alpha(b + c) + 42) + 42$$

$$= (ab + \alpha(a + b) + 42)c + \alpha(ab + \alpha(a + b) + 42 + c) + 42.$$

Treiem els 42 d'ambdós costats i desenvolupem els productes amb la distributivitat del producte sobre la suma usual:

$$abc + a\alpha b + a\alpha c + 42a + a\alpha + bc\alpha + \alpha^2 b + \alpha^2 c + 42\alpha =$$

$$abc + c\alpha a + c\alpha b + 42c + ab\alpha + \alpha^2 a + \alpha^2 b + 42\alpha + c\alpha.$$

Cancel·lant els termes iguals,

$$42a + a\alpha + c\alpha^2 = 42c + a\alpha^2 + c\alpha,$$

i ara reescriuint com una equació de segon grau en α queda:

$$(c - a)\alpha^2 + (a - c)\alpha + 42(a - c) = 0.$$

Aquesta equació la dividim entre $(c - a)$, que és diferent de zero ja que si $a = c$, $(a \odot b) \odot a = a \odot (b \odot a)$ si \odot és commutativa. Ho podem veure ràpid:

$$a \odot b = ab + \alpha(a + b) + 42 = ba + \alpha(b + a) + 42 = b \odot a.$$

Per tant, com que $a \neq c$, dividim;

$$\alpha^2 - \alpha - 42 = 0,$$

i calculem les solucions amb la fórmula pel càlcul de les arrels dels polinomis de segon grau:

$$\alpha = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(-42)}}{2}$$

$$\alpha_1 = -6 \quad \alpha_2 = 7.$$

Per tant, seguint el curs de les implicacions i tal com volíem demostrar, \odot només és associativa quan $\alpha = -6$ o $\alpha = 7$. \square

- 3) **Demostreu que l'operació \odot té element neutre si, i només si, $\alpha = -6$ o $\alpha = 7$.**

Si existeix un element neutre, $\exists e \in \mathbb{Z} : a \odot e = a$. Per tant, ho escrivim:

$$a \odot e = ae + \alpha(a + e) + 42 = a.$$

Si el trobem, haurem demostrat que existeix. Per fer-ho, intentem resoldre l'equació:

$$a(e + \alpha) + e\alpha + 42 = a.$$

Com que estem utilitzant la suma i el producte usuals, la única solució possible es troba solucionant el sistema:

$$\begin{aligned} e + \alpha &= 1 \\ e\alpha + 42 &= 0 \end{aligned}$$

D'aquí tenim $e = 1 - \alpha$ i $(1 - \alpha)\alpha + 42 = 0$. Aquesta equació ja la tenim solucionada (apartat 2) i per tant, veiem que e existeix només quan $\alpha = -6$ o $\alpha = 7$. \square

- 4) **Per a quins valors de α és $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ un anell?**

Per a que $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ sigui un anell necessitem que (\mathbb{Z}, \oplus) sigui grup abelià i que \odot sigui associativa, tingui element neutre i sigui distributiva respecte \oplus . Com ja hem vist, \oplus només és associativa i té neutre quan $\alpha = -6$ o $\alpha = 7$. Per ser distributiva, volem que $a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c)$. Ho desenvolupem per ambdós costats:

$$\begin{aligned} (1) \quad a \odot (b \oplus c) &= a(b \oplus c) + \alpha(a + b \oplus c) + 42 = ab + ac - 6a + \alpha(a + b + c - 6) + 42, \\ (2) \quad (a \odot b) \oplus (a \odot c) &= (ab + \alpha(a + b) + 42) \oplus (ac + \alpha(a + c) + 42) = \\ &= ab + ac + \alpha(a + b) + \alpha(a + c) + 42 + 42 - 6. \end{aligned}$$

Ara igualement ambdós resultats i veiem què li ha de passar a α :

$$ab + ac - 6a + \alpha(a + b + c - 6) + 42 = ab + ac + \alpha(a + b) + \alpha(a + c) + 42 + 42 - 6$$

$$-6a + a\alpha - 6\alpha = 2a\alpha + 36,$$

$$-a\alpha - 6\alpha = 6a + 36,$$

$$-\alpha(a + 6) = 6(a + 6) \implies \alpha = -6.$$

Per tant, $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ és un anell per $\alpha = -6$.