Àlex Batlle Casellas

12. Si $A \subset \mathbb{R}^m$, demostreu que:

- a) \mathring{A} és el conjunt obert més gran contingut en A. És a dir, si B és un obert dins A, aleshores $B \subset \mathring{A}$.
- b) \bar{A} és el conjunt tancat més petit que conté A. És a dir, si C és un tancat que conté A, aleshores $\bar{A} \subset C$.

Resolució

- a) B és obert \iff $\mathring{B} = B \iff \forall p \in B \ \exists B_r(p) \subset B \implies \forall p \in B \subset A \ \exists B_r(p) \subset B \subset A \implies \mathring{B} \subset \mathring{A} \implies B \subset \mathring{A}.\square$
- b) $\forall p \in \bar{A} \ (\forall B_r(p) \ A \cap B_r(p) \neq \emptyset) \implies \forall p \in \bar{A} \ (\forall B_r(p) \ C \cap B_r(p) \neq \emptyset) \implies \forall p \in \bar{A}, p \in \bar{C} = C \implies \bar{A} \subset C.\Box$
- 13. Donats dos conjunts A, B, es defineix $A + B = \{x + y | x \in A, y \in B\}$. Suposeu A obert.
 - a) Demostreu que si $y \in B$, el conjunt $A + \{y\}$ és obert.
 - b) Demostreu que el conjunt A + B és obert.

Resolució

- a)
- b)