Factor de sensibilidad, explicado fácil

Qué significa · ejemplo · insulina activa

El factor de sensibilidad (FS) estima cuántos mg/dL baja la glucosa con 1 unidad de insulina rápida. Si el FS es 50 mg/dL por unidad, una unidad puede bajar aproximadamente 50 puntos: es una estimación, no una garantía.

Un ejemplo solo para aprender

Glucosa 240 - objetivo 140 = 100 mg/dL
100 ÷ FS 50 = 2 unidades teóricas

El ejemplo es ficticio y supone que no queda insulina rápida activa. No establece el objetivo ni la dosis de una persona real. La cifra debe interpretarse con el plan prescrito, la tendencia, la comida y la actividad.

Dos conceptos distintos

Concepto	Qué responde
Factor de sensibilidad	¿Cuánto puede bajar la glucosa una unidad de rápida? Se expresa en mg/dL por unidad.
Ratio insulina/hidratos	¿Cuántos gramos de hidratos cubre una unidad? Se expresa en g por unidad.
Insulina activa	¿Qué parte de una dosis previa todavía está haciendo efecto? Puede durar varias horas.

Para el profesional

- La regla 1800 / dosis total diaria de insulina (basal + bolos) orienta una estimación inicial con análogos rápidos en mg/dL. No es una prescripción ni sirve como regla universal para cualquier insulina o situación.
- Valida el factor con patrones reales. Puede cambiar por horario, ejercicio, enfermedad, función renal, embarazo o fase de remisión.
- Antes de una corrección revisa insulina activa, hora de la última dosis, tendencia, comida, ejercicio y capacidad de seguimiento. La repetición de bolos puede causar hipoglucemia.

Una hipoglucemia se trata primero. La insulina basal no se utiliza como bolo corrector. Vómitos, cetonas, mal estado general o una hiperglucemia persistente requieren el plan de enfermedad y valoración clínica; la fórmula aislada no resuelve esas situaciones.

Fuentes

UCSF, Diabetes Teaching Center: factor y cálculo · SAEDYN, ajuste de insulina · ADA, Standards of Care 2026