Hipoglucemia: actuar y prevenir

Regla 15-15 · glucagón · seguimiento

En adultos, una glucosa inferior a 70 mg/dL es una alerta; por debajo de 54 mg/dL es una hipoglucemia clínicamente significativa. Si necesita ayuda por alteración física o mental, es grave con independencia de la cifra.

Si está consciente y puede tragar con seguridad

- Ante 70 mg/dL o menos, toma 15 g de glucosa o hidratos de absorción rápida. Comprueba la cantidad en la etiqueta; por ejemplo, comprimidos de glucosa que sumen 15 g.
- Espera 15 minutos y repite la medición. Si sigue baja, repite el tratamiento y busca ayuda si no remonta.
- El chocolate, la bollería y alimentos con mucha grasa no son la primera opción: retrasan la absorción. Tras recuperarse, valora comida o tentempié según insulina activa y tiempo hasta la próxima comida.

Si no puede tragar, pierde conciencia o convulsiona

No dar comida ni bebida por boca. Llama al 112. Administra el glucagón prescrito si está disponible y sabes usarlo; sigue las instrucciones del producto. Coloca de lado si está inconsciente y respira. Si no respira normalmente, sigue las instrucciones de reanimación del 112.

Después del episodio

- Revisa dosis, horarios, ingesta, ejercicio, alcohol y función renal; pregunta por bajadas nocturnas y pérdida de síntomas de aviso.
- Comprueba disponibilidad de glucosa, glucómetro y glucagón, su caducidad y que el cuidador sepa utilizarlos. Una hipoglucemia grave o repetida obliga a revisar el tratamiento.

Niños y usuarios de sistemas automatizados pueden necesitar cantidades distintas de hidratos. Deja una pauta individual escrita. Tras tratar una bajada, el sensor puede tardar en reflejar la recuperación; usa capilar cuando sea necesario para evitar sobretratar.

Fuentes

ADA 2026, objetivos y prevención · ADA, síntomas y regla 15-15 · ADA, hipoglucemia grave