01 / ENTENDER Y EMPEZAR

Colon irritable

Aliviar molestias sin dejar tu dieta cada vez más pequeña.

Guía para leer a tu ritmo.
Llévala a consulta y adapta los ejemplos a tu pauta.



El síndrome de intestino irritable puede causar dolor de barriga, hinchazón y cambios en las deposiciones: diarrea, estreñimiento o ambos. Hay una mayor sensibilidad y cambios en el funcionamiento del intestino. Los síntomas son reales y el diagnóstico debe hacerte un profesional. [1, 2]

Tres ideas para empezar
1. Empieza con horarios regulares y cambios pequeños.
2. Observa tu tolerancia; no todos reaccionamos a lo mismo.
3. Una dieta baja en FODMAP, si se necesita, es temporal y guiada.

No todo dolor de barriga es colon irritable

Antes de quitar muchos alimentos, confirma el diagnóstico. Si te van a estudiar enfermedad celíaca, no retires el gluten antes de las pruebas: puede alterar el resultado. [1, 2]

Tu primera prueba
Durante una semana, come con calma y apunta lo que comes, tus molestias y tus deposiciones. No cambies cinco cosas a la vez.

02 / ADAPTAR, NO PROHIBIR

Comer con menos molestias

Suele ser útil	Conviene probar con cuidado
Comidas regulares, sin grandes atracones	Saltarse comidas y luego comer mucho.
Avena y fibra soluble, aumentando poco a poco	Añadir mucho salvado o fibra de golpe.
Agua y comidas sencillas	Mucho alcohol, café, bebidas con gas o fritos si notas síntomas.
Lácteos sin lactosa si hay mala tolerancia	Quitar todos los lácteos sin buscar una alternativa con calcio.

La fibra se adapta al tipo de síntomas. La soluble, como la de avena o el psyllium, puede ayudar; un suplemento se valora contigo. Añádela poco a poco y con líquido según tu pauta. [1, 2]

Si se propone una dieta baja en FODMAP

Los FODMAP son algunos hidratos que se absorben peor y pueden producir gas y molestias. No son sustancias tóxicas. El plan tiene tres etapas: reducir durante 2 a 6 semanas, probar reintroducciones y mantener la mayor variedad tolerada. Si no mejora, hay que reevaluar; no seguir quitando alimentos. [3, 4]

Exclusiones que sí tienen sentido
Una alergia o una enfermedad celíaca confirmada requieren su pauta específica. El colon irritable solo no obliga a retirar gluten ni lactosa. Evita restricciones amplias por tu cuenta, especialmente si pierdes peso o comes poco. [1, 2, 4]

03 / EL DÍA A DÍA

Ideas para probar y comparar

Estas alternativas sirven para conversar en consulta, no son una lista universal de permitidos. La cantidad y la suma de alimentos de una comida cambian la tolerancia. [3]

Si te da molestias…	Una alternativa para probar
Leche con lactosa	Leche o yogur sin lactosa, si el problema es la lactosa.
Manzana o pera	Una porción de kiwi, naranja o fresones.
Mucha cebolla o ajo	Hierbas, especias suaves o aceite aromatizado sin trozos de ajo.
Muchos garbanzos o lentejas de golpe	Una cantidad menor de conserva escurrida y enjuagada, si se tolera.
Chicles o dulces con polioles	Revisa sorbitol, manitol y otros ingredientes; prueba a reducirlos.

• Lleva un registro breve: alimento y cantidad, dolor de 0 a 10, hinchazón y tipo de deposición. Añade estrés, sueño y menstruación si influyen.

• Planifica una opción sencilla cuando salgas: arroz o patata, proteína y una verdura que ya toleres. Pide las salsas aparte.

• La preparación importa. Prueba verdura cocinada si la cruda te resulta difícil; cambia solo una cosa y observa.

Consulta si aparece
Sangre en las heces, pérdida de peso sin buscarla, fiebre, anemia, síntomas nocturnos nuevos o dolor persistente distinto del habitual. No lo atribuyas sin más al colon irritable. [1, 2]

04 / MI PLAN Y FUENTES

Recuperar variedad es el objetivo

Mi próximo paso

Mi síntoma principal y el cambio que voy a probar:

Alimento que quiero volver a introducir con ayuda:

Fecha para revisar si la prueba ha servido:

Fuentes y actualización

Selección de fuentes públicas y guías vigentes consultadas el 11 de octubre de 2026. Las recomendaciones se han resumido con lenguaje sencillo; los ejemplos de comidas son propuestas educativas propias.

[1] NICE CG61. Síndrome de intestino irritable en adultos. Recomendaciones vigentes.
Abrir fuente original

[2] NIDDK. Alimentación y nutrición en el intestino irritable.
Abrir fuente original

[3] Monash University. Dietas para el intestino irritable y sus tres etapas.
Abrir fuente original

[4] AGA. Clinical Practice Update on the Role of Diet in IBS. 2022. DOI: 10.1053/j.gastro.2021.12.248.
Abrir fuente original

No se indican cantidades estrictas de FODMAP porque dependen del alimento, la porción y la fase del plan. La restricción y la reintroducción requieren apoyo de un profesional formado.