01 / ENTENDER Y EMPEZAR

Colon irritable

Aliviar molestias sin dejar tu dieta cada vez más pequeña.

El síndrome de intestino irritable puede causar dolor de barriga, hinchazón y cambios en las deposiciones: diarrea, estreñimiento o ambos. Hay una mayor sensibilidad y cambios en el funcionamiento del intestino. Los síntomas son reales y el diagnóstico debe hacerte un profesional.



Tres ideas para empezar
1. Empieza con horarios regulares y cambios pequeños.
2. Observa tu tolerancia; no todos reaccionamos a lo mismo.
3. Una dieta baja en FODMAP, si se necesita, es temporal y guiada.

No todo dolor de barriga es colon irritable

Antes de quitar muchos alimentos, confirma el diagnóstico. Si te van a estudiar enfermedad celíaca, no retires el gluten antes de las pruebas: puede alterar el resultado.

Índice · elige lo que quieres consultar

1 Qué es y por dónde empezar p. 1
2 Alimentos: qué elegir y qué adaptar p. 2
3 Consejos para el día a día p. 3
4 Menú semanal y fuentes p. 4

02 / ADAPTAR, NO PROHIBIR

Comer con menos molestias

Suele ser útil	Conviene probar con cuidado
Comidas regulares, sin grandes atracones	Saltarse comidas y luego comer mucho.
Avena y fibra soluble, aumentando poco a poco	Añadir mucho salvado o fibra de golpe.
Agua y comidas sencillas	Mucho alcohol, café, bebidas con gas o fritos si notas síntomas.
Lácteos sin lactosa si hay mala tolerancia	Quitar todos los lácteos sin buscar una alternativa con calcio.

La fibra se adapta al tipo de síntomas. La soluble, como la de avena o el psyllium, puede ayudar; un suplemento se valora contigo. Añádela poco a poco y con líquido según tu pauta.

Si se propone una dieta baja en FODMAP

Los FODMAP son algunos hidratos que se absorben peor y pueden producir gas y molestias. No son sustancias tóxicas. El plan tiene tres etapas: reducir durante 2 a 6 semanas, probar reintroducciones y mantener la mayor variedad tolerada. Si no mejora, hay que reevaluar; no seguir quitando alimentos.

Exclusiones que sí tienen sentido
Una alergia o una enfermedad celíaca confirmada requieren su pauta específica. El colon irritable solo no obliga a retirar gluten ni lactosa. Evita restricciones amplias por tu cuenta, especialmente si pierdes peso o comes poco.

03 / EL DÍA A DÍA

Ideas para probar y comparar

Estas alternativas sirven para conversar en consulta, no son una lista universal de permitidos. La cantidad y la suma de alimentos de una comida cambian la tolerancia.

Si te da molestias…	Una alternativa para probar
Leche con lactosa	Leche o yogur sin lactosa, si el problema es la lactosa.
Manzana o pera	Una porción de kiwi, naranja o fresones.
Mucha cebolla o ajo	Hierbas, especias suaves o aceite aromatizado sin trozos de ajo.
Muchos garbanzos o lentejas de golpe	Una cantidad menor de conserva escurrida y enjuagada, si se tolera.
Chicles o dulces con polioles	Revisa sorbitol, manitol y otros ingredientes; prueba a reducirlos.

• Lleva un registro breve: alimento y cantidad, dolor de 0 a 10, hinchazón y tipo de deposición. Añade estrés, sueño y menstruación si influyen.

• Planifica una opción sencilla cuando salgas: arroz o patata, proteína y una verdura que ya toleres. Pide las salsas aparte.

• La preparación importa. Prueba verdura cocinada si la cruda te resulta difícil; cambia solo una cosa y observa.

Consulta si aparece
Sangre en las heces, pérdida de peso sin buscarla, fiebre, anemia, síntomas nocturnos nuevos o dolor persistente distinto del habitual. No lo atribuyas sin más al colon irritable.

Una semana · cuatro comidas

Elige las porciones que toleres. No es una dieta baja en FODMAP prescrita ni un menú para repetir con restricciones indefinidas.






Día	Desayuno	Almuerzo	Merienda	Cena
Lunes	Avena con leche sin lactosa y kiwi.	Arroz con pollo y zanahoria. Mandarina.	Yogur sin lactosa y unas nueces.	Tortilla, patata cocida y judías verdes.
Martes	Yogur sin lactosa, avena y naranja.	Merluza con arroz y zanahoria. Kiwi.	Mandarina y unas nueces.	Tofu firme con patata y berenjena cocinada.
Miércoles	Pan que toleres con aceite y huevo; leche sin lactosa.	Pollo con patata y judías verdes. Naranja.	Yogur sin lactosa y kiwi.	Arroz con huevo y zanahoria.
Jueves	Avena con yogur sin lactosa y kiwi.	Pescado con patata y zanahoria. Mandarina.	Pan que toleres con aceite.	Tofu firme con arroz y pimiento verde cocinado.
Viernes	Pan que toleres con aceite y queso curado. Kiwi.	Arroz con pescado y judías verdes. Naranja.	Yogur sin lactosa y naranja.	Tortilla, patata y lechuga con pepino si la toleras.
Sábado	Yogur sin lactosa con avena. Mandarina.	Pollo al horno con patata y zanahoria. Kiwi.	Kiwi y unas nueces.	Tofu firme con arroz y berenjena cocinada.
Domingo	Avena con leche sin lactosa y naranja.	Pescado con arroz y judías verdes. Kiwi.	Leche sin lactosa y pan que toleres.	Huevos revueltos, patata y zanahoria cocida.

Sin lactosa solo si la toleras peor. No retires gluten por sistema. Agua y aceite de oliva. Merienda y porciones según tolerancia; recupera variedad con apoyo. Imágenes: ejemplos del lunes.

Fuentes

NICE CG61: colon irritable
AGA: alimentación en colon irritable (2022)
NIDDK: dieta y colon irritable
Monash: alimentos, porciones y tolerancia
Monash: dieta FODMAP y sus etapas