01 / ENTENDER Y EMPEZAR

Colon irritable

Aliviar molestias sin dejar tu dieta cada vez más pequeña.

El síndrome de intestino irritable puede causar dolor de barriga, hinchazón y cambios en las deposiciones: diarrea, estreñimiento o ambos. Hay una mayor sensibilidad y cambios en el funcionamiento del intestino. Los síntomas son reales y el diagnóstico debe hacerte un profesional.



Tres ideas para empezar
1. Empieza con horarios regulares y cambios pequeños.
2. Observa tu tolerancia; no todos reaccionamos a lo mismo.
3. Una dieta baja en FODMAP, si se necesita, es temporal y guiada.

No todo dolor de barriga es colon irritable

Antes de quitar muchos alimentos, confirma el diagnóstico. Si te van a estudiar enfermedad celíaca, no retires el gluten antes de las pruebas: puede alterar el resultado.

Tu primera prueba
Durante una semana, come con calma y apunta lo que comes, tus molestias y tus deposiciones. No cambies cinco cosas a la vez.

02 / ADAPTAR, NO PROHIBIR

Comer con menos molestias

Suele ser útil	Conviene probar con cuidado
Comidas regulares, sin grandes atracones	Saltarse comidas y luego comer mucho.
Avena y fibra soluble, aumentando poco a poco	Añadir mucho salvado o fibra de golpe.
Agua y comidas sencillas	Mucho alcohol, café, bebidas con gas o fritos si notas síntomas.
Lácteos sin lactosa si hay mala tolerancia	Quitar todos los lácteos sin buscar una alternativa con calcio.

La fibra se adapta al tipo de síntomas. La soluble, como la de avena o el psyllium, puede ayudar; un suplemento se valora contigo. Añádela poco a poco y con líquido según tu pauta.

Si se propone una dieta baja en FODMAP

Los FODMAP son algunos hidratos que se absorben peor y pueden producir gas y molestias. No son sustancias tóxicas. El plan tiene tres etapas: reducir durante 2 a 6 semanas, probar reintroducciones y mantener la mayor variedad tolerada. Si no mejora, hay que reevaluar; no seguir quitando alimentos.

Exclusiones que sí tienen sentido
Una alergia o una enfermedad celíaca confirmada requieren su pauta específica. El colon irritable solo no obliga a retirar gluten ni lactosa. Evita restricciones amplias por tu cuenta, especialmente si pierdes peso o comes poco.

03 / EL DÍA A DÍA

Ideas para probar y comparar

Estas alternativas sirven para conversar en consulta, no son una lista universal de permitidos. La cantidad y la suma de alimentos de una comida cambian la tolerancia.

Si te da molestias…	Una alternativa para probar
Leche con lactosa	Leche o yogur sin lactosa, si el problema es la lactosa.
Manzana o pera	Una porción de kiwi, naranja o fresones.
Mucha cebolla o ajo	Hierbas, especias suaves o aceite aromatizado sin trozos de ajo.
Muchos garbanzos o lentejas de golpe	Una cantidad menor de conserva escurrida y enjuagada, si se tolera.
Chicles o dulces con polioles	Revisa sorbitol, manitol y otros ingredientes; prueba a reducirlos.

• Lleva un registro breve: alimento y cantidad, dolor de 0 a 10, hinchazón y tipo de deposición. Añade estrés, sueño y menstruación si influyen.

• Planifica una opción sencilla cuando salgas: arroz o patata, proteína y una verdura que ya toleres. Pide las salsas aparte.

• La preparación importa. Prueba verdura cocinada si la cruda te resulta difícil; cambia solo una cosa y observa.

Consulta si aparece
Sangre en las heces, pérdida de peso sin buscarla, fiebre, anemia, síntomas nocturnos nuevos o dolor persistente distinto del habitual. No lo atribuyas sin más al colon irritable.

IDEAS PARA TU MESA

Tu menú semanal · lunes a jueves

Ideas sencillas para adaptar a tu tolerancia. Este menú no es una dieta baja en FODMAP prescrita. El tamaño de la porción y la combinación importan; usa alimentos que ya sabes que te sientan bien.

Lunes

Desayuno	Comida	Cena
Avena con leche sin lactosa y kiwi.	Arroz con pollo y zanahoria. Mandarina.	Tortilla, patata cocida y judías verdes.

Martes

Desayuno	Comida	Cena
Yogur sin lactosa, avena y naranja.	Merluza con arroz y zanahoria. Kiwi.	Tofu firme con patata y berenjena cocinada.

Miércoles

Desayuno	Comida	Cena
Tostada de pan que toleres, aceite y huevo. Leche sin lactosa.	Pollo con patata y judías verdes. Naranja.	Arroz con huevo y zanahoria.

Jueves

Desayuno	Comida	Cena
Avena con yogur sin lactosa y kiwi.	Pescado con patata y zanahoria. Mandarina.	Tofu firme con arroz y pimiento verde cocinado.

PUEDES INTERCAMBIAR LOS DÍAS

Tu menú semanal · viernes a domingo

Viernes

Desayuno
Pan que toleres con aceite y queso curado. Kiwi.

Comida
Arroz con pescado y judías verdes. Naranja.

Cena
Tortilla con patata y ensalada de lechuga y pepino, si la toleras.

Sábado

Desayuno
Yogur sin lactosa con avena. Mandarina.

Comida
Pollo al horno con patata y zanahoria. Kiwi.

Cena
Tofu firme con arroz y berenjena cocinada.

Domingo

Desayuno
Avena con leche sin lactosa y naranja.

Comida
Pescado con arroz y judías verdes. Kiwi.

Cena
Huevos revueltos, patata y zanahoria cocida.

Adapta, no elimines por sistema
Los lácteos sin lactosa son una opción si la lactosa da molestias. No hace falta quitar el gluten por el colon irritable. Elige un pan que toleres y consulta antes de restricciones amplias.

Sabor y tentempiés
Agua, aceite de oliva y hierbas suaves. Si cebolla o ajo te molestan, usa aceite aromatizado sin trozos. Entre comidas, si necesitas: fruta que toleres, yogur sin lactosa o unas nueces.

Después de esta propuesta
No repitas un menú limitado indefinidamente. Reintroduce variedad con apoyo. Si se pauta una reducción de FODMAP, debe tener revisión, reintroducción y personalización.

PARA LLEVAR A CONSULTA

Mi plan y las fuentes

Mi próximo paso

Mi síntoma principal y el cambio que voy a probar:

Alimento que quiero volver a introducir con ayuda:

Fecha para revisar si la prueba ha servido:

No se indican cantidades estrictas de FODMAP porque dependen del alimento, la porción y la fase del plan. La restricción y la reintroducción requieren apoyo de un profesional formado.

Fuentes utilizadas

Consultadas el 11 de octubre de 2026. Recomendaciones resumidas con lenguaje sencillo. Menús y ejemplos educativos propios. Ilustraciones creadas para ENDONUTRI.

1. NICE CG61. Síndrome de intestino irritable en adultos. Recomendaciones vigentes.
Abrir fuente original

2. NIDDK. Alimentación y nutrición en el intestino irritable.
Abrir fuente original

3. Monash University. Dietas para el intestino irritable y sus tres etapas.
Abrir fuente original

4. AGA. Clinical Practice Update on the Role of Diet in IBS. 2022. DOI: 10.1053/j.gastro.2021.12.248.
Abrir fuente original

5. Monash University. Alimentos y alternativas: la cantidad y la tolerancia importan.
Abrir fuente original