

Pravděpodobnost a statistika

Domácí úkoly

Martin Pustka

14.3.2021

Contents

1	1P	3
2	2P	4
2.1	4
2.1.A	4
2.1.B	4
2.1.C	5
2.1.D	5
2.1.E	5
2.2	6
2.2.A	6
2.2.B	6
2.2.C	6
2.2.D	6
2.3	7
2.3.A	7
2.3.B	7
2.3.C	8
2.3.D	8
2.3.E	8
2.4	10
2.4.A	10
2.4.B	10
2.4.C	10

1 1P

Děláno we wordu :(

2 2P

2.1

Za poslední tři roky firma uzavřela 9 projektů se státní dotací. K těmto projektům vyhotovila závěrečné zprávy, přičemž v závěrečné dokumentaci ke 3 projektům jsou závažné chyby. Auditor si z 9 projektů vybral 4 ke kontrole, náhodně. Jestliže X vyjadřuje počet projektů bez chyb v dokumentaci mezi projekty vybranými ke kontrole určete:

2.1.A

Pravděpodobnostní a distribuční funkci této náhodné veličiny X . Pravděpodobnostní funkci zapište do tabulky a distribuční funkci zadejte předpisem.

```
# Pouzijeme Hypergeometrickou vetu, vybirame pocet uspechu
# X ... pocet projektu bez chyb mezi 4 vybranymi
# X ~ H(N = 9, M = 6, n = 4)

x = 0:4 #pocet projektu, ktere nas zajimaji
N = 9 #celkem 9 projektu
M = 6 #celkovy pocet projektu, ktere nas zajimaji
n = 4 #pocet projektu ve vyberu

# graf pravdepodobnostni funkce pro P(X = 0 az 4)
p = dhyper(x, M, N - M, n) # hodnoty pravd. funkce pro x
#kontrola - melo by dat 1
#sum(p) == 1
#plot(x, p)

#jednotlive pravdepodobnosti p priradime k odpovidajicim
#hodnotam vytyhnutemu poctu spravnych projektu
pravdep = rbind(c("P(xi)", p))
colnames(pravdep) = c("xi", 0:4)
rownames(pravdep) = ""
pravdep #tabulka pravdepodobnostni funkce
pravd.f(x, p) #vykresleni

#pravdepodobnosti prubezne scitame a priradime k nim omezeni
distrib = cbind(cumsum(p), c("x<=0", "0<x<=1", "0<x<=1", "1<x<=2", "x>3"))
colnames(distrib) = c("", "")
rownames(distrib) = c("", "", "F(x) = ", "", "")
distrib #predpis distribucni funkce
dist.f(x, p) #vykresleni
```

2.1.B

Střední hodnotu, rozptyl, směrodatnou odchylku a modus náhodné veličiny X .

```

# stredni hodnota je soucet vsech hodnot vynasobenych jejich pravdepodobnosti
# rozptyl pomoci  $E(x^2) - E(x)^2$ 
# smerodatna odchylka je odmocnina rozptylu
# modus je hodnota nejvetsi pravdepodobnosti
# vypocet modus by bylo treba nahradit y[matchAll(max(p),p)]
# misto y[match(max(p),p)], ale chtel jsem to mit spustitelne
# bez knihoven (matchAll je asi v knihovne tuple?)
souhrn(x,p)

```

2.1.C

Jaká je pravděpodobnost, že mezi projekty vybranými ke kontrole bude alespoň jeden projekt uzavřený s chybami v závěrečné dokumentaci?

```

# vybirame alespon jeden spatny projekt,
# takze 1 nebo 2 nebo 3 spravne (4 spatne neexistuji)
#  $P(x \leq 3)$ 
sum(p[1:4])

```

2.1.D

Je stanoveno, že pokud auditor shledá v projektu závažná pochybení, firma dostane za každý projekt uzavřený s chybami pokutu 200 000 Kč. Určete očekávanou výši pokuty, kterou by měla firma zaplatit.

```

# celkem 4 projekty a odeceme sancí na vytazeni spravnych projektu
(4 - sum(x*p)) * 200000

```

2.1.E

S jakou pravděpodobností bude pokuta větší než 250 000 Kč?

```

# vetsi nez 250 tisic bude v pripade, ze vybereme alespon dva spatne projekty
#  $P(x < 3)$ 
sum(p[1:3])

```

2.2

Náhodná veličina Y je dána distribuční funkcí

2.2.A

Načrtněte graf distribuční i pravděpodobnostní funkce náhodné veličiny Y .

```
# definujeme distribuční funkci
F = c(0, 0.3, 0.5, 0.9, 1)
y = c(1, 10, 100, 1000)

# z distribuční funkce zjistíme pravděpodobnosti pro omezení
p = diff(F)
pravd.f(y, p) # vykreslíme pravděpodobnostní funkci
dist.f(y, p) # vykreslíme distribuční funkci
```

2.2.B

Pomocí distribuční funkce vyjádřete a vypočtete pravděpodobnost, že $Y=100$, a že hodnota Y je alespoň 10.

```
# P(Y=100)
p[match(100,y)] # dohledáme hodnotu pro 100
# P(Y >= 10)
# hledáme vetsy nez, takže musíme odečíst pravděpodobnost 10
1-F[match(10,y)]
# nebo by jsme mohli sečíst změny vetsy nez
p[match(10,y)] + p[match(100,y)] + p[match(1000,y)]
```

2.2.C

Určete střední hodnotu, rozptyl, směrodatnou odchylku a modus náhodné veličiny Y .

```
souhrn(y, p) # podobně jako 1B
```

2.2.D

Jestliže pro náhodnou veličinu R platí $R=\log(Y)$, určete střední hodnotu a rozptyl náhodné veličiny R .

```
R = log10(y) # prepocteme si omezení podle logaritmu

# mohlo by dojít k nesetřizeným omezením, takže je třeba setřidit
idx_sorted = order(R)
R = R[idx_sorted]
p_R = p[idx_sorted]

souhrn(R, p_R)
```

2.3

Rozdělení pravděpodobnosti spojitě náhodné veličiny (SNV) X je dáno hustotou

2.3.A

Určete hodnotu konstanty c . Načrtněte graf hustoty $f(x)$.

```
# integral od -2/3 do 0 pro f(x)dx = 1 kde f(x) = c(6x+8)
# c(3*x^2+8*x) => c(0*0)-c(3*(-2/3)^2+8*(-2/3)) =>
# => c(0) - c(-4) => c*4 dame rovno jedne => c = 0.25
f = function(x){return(6*x+8)} # f(x) = 6x+8
dolniMez = -2/3
horniMez = 0
1/integrate(f, dolniMez, horniMez)$value

# na papire si vyberu dva krajni body -2/3 a 0 a vypocitam jejich hodnoty
# jelikoz jde o primku tak tyto dva body bych spojil a uzavreny interval
# zbytek grafu hustoty bude na nule do nekonecen s otevrenymi intervaly

f.dens = function(x){
  res = 6/4*x+2 # 1/4(6*x+8)
  res[x < -2/3] = 0
  res[x > 0] = 0
  return(res)
}

x = seq(from = -1, to = 0.5, by = 0.01)
FX = f.dens(x)
plot(x, FX, cex = 0.2, main="Graf hustoty")
```

2.3.B

Určete distribuční funkci $F(x)$.

```
# integral od -2/3 do 0 pro F(t) = f(x)dx
# 0 t < -2/3
# F(t) 6/8*t^2 + 2*t + 1 t < -2/3; 0>
# 1 t > 0
# pocitam integral od -2/3 do t, kde t je mensi nez 0, pro f(x)dx
# 6/4*x+2
# 6/8*x^2+2*x
# 6/8*t^2+2*t - (6/8*(-2/3)^2+2*(-2/3)) => 6/8*t^2 + 2*t + 1 => dosadim do F(t)

F.dist = function(x){
  res = 6/8*x^2 + 2*x + 1
  res[x < -2/3] = 0
  res[x > 0] = 1
  return(res)
}
```

```

}

x = seq(from = -1, to = 0.5, by = 0.01)
FX = F.dist(x)
plot(x, FX, type = 'l', main="Distribucni funkce")

```

2.3.C

Vypočtete pravděpodobnosti $P(-1 \leq X_i \leq -1/3)$ a $P(X_i \leq -1/3)$.

```

# vypocet se provadi integraci hustoty pravdepodobnosti v limitach danych zadanim,
# pripadne oseknutou limitami hustoty integrace provedena v 3B,
# pouze dosazujeme (6/8*(-1/3)^2 + 2*(-1/3) + 1) - (6/8*(-2/3)^2 + 2*(-2/3) + 1)
# P(-1 <= X <= -1/3)
integrate(f.dens, -2/3, -1/3)$value

# P(X > -1/3)
# dosazujeme (6/8*(0)^2 + 2*(0) + 1) - (6/8*(-1/3)^2 + 2*(-1/3) + 1)
integrate(f.dens, -1/3, 0)$value

```

2.3.D

Vypočtete číselné charakteristiky SNV X . ($E(X)=?$, $D(X)=?$, $\sigma(X)=?$)

```

x_fx = function(x){
  fx = f.dens(x)
  return(x*fx)
}
xx_fx = function(x){
  fx = f.dens(x)
  return(x*x*fx)
}

# pouzijeme vzorce E(x) = integral x*f(x)dx na celem nenulovem intervalu
# E(x^2) = integral x^2*f(x)dx, pro D(x) = E(x^2) - E(x)^2
E_X = integrate(x_fx, -2/3, 0)$value
E_XX = integrate(xx_fx, -2/3, 0)$value

D_X = E_XX - E_X^2
std_X = sqrt(D_X)

cbind(c("E(X)", "D(X)", "sigma X"), c(E_X, D_X, std_X))

```

2.3.E

Pro SNV Y platí, že $Y=4-2X$. Určete střední hodnotu $E(Y)$ a rozptyl $D(Y)$.

```

# pro Y = 4-2x vyuzijeme vzorečku
# E(aX + b) = aE(x)+b
# D(aX + b) = a^2*D(x)

```



```

# a hodnot, ktere jsme vypocitali v 3D
E_Y = 4 - 2*E_X # E(4-2x)
D_Y = (-2)^2*D_X # D(4-2x)
std_Y = sqrt(D_Y)

cbind(c("E(Y)", "D(Y)", "sigma_y"), c(E_Y, D_Y, std_Y))

```

2.4

Spojité náhodná veličina X je popsána distribuční funkcí

2.4.A

Určete hustotu pravděpodobnosti $f(x)$.

```
# hustota se pocita derivaci distribucni funkce
# zderivujeme sin x => cos x
# f(x)  cos x <0,pi/2>
#      0 (-inf,0) nebo (pi/2,inf)
f = function(x){
  res = cos(x)      # x^2+2x+1
  res[x < 0] = 0 # 0 pro x<=0
  res[x > pi/2] = 0 # 1 pro x>1
  return(res)
}

x = seq(from = -0.5, to = 2, by = 0.01)
FX = f(x)
plot(x, FX, cex = 0.2, main="Graf hustoty")
```

2.4.B

Určete medián $x_{0,5}$.

```
# median nalezi do <0,pi/2> a pocita se z distribucni funkce
F.dist = function(x){
  res = sin(x)      # x^2+2x+1
  res[x <= 0] = 0 # 0 pro x<=0
  res[x > pi/2] = 1 # 1 pro x>1
  return(res)
}
```

2.4.C

Najděte w takové, aby pravděpodobnost, že hodnota SNV X bude větší než w , byla 60 %.

```
# podobne jako median spocitame i pravdepodobnost 60%, akorat musime pocitat s 1-0
x = seq(from = -0.5, to = 2, by = 0.001)
FX = F.dist(x)
plot(x, FX, type='l', main="Pravdepodobnostni funkce a pravdepodobnost 60%")
lines(c(-0.5, 2),c(0.4, 0.4))

asin(0.4)
x[FX >= 0.4][1]
```