
00 11 RESNICAMI

ASCII–JEDRO (O–BOG–ČLOVEK)



Legenda: O≡0 (polje) · ⊘≡¬ (sveta ločitev/“ne”) · Δ (razlika) · 1 (akt) · Ω (integracija) · κ_etik∈[−1,1] (etični koeficient vpliva BOG↔ČLOVEK).

Formula jedra

$$\boxed{\Delta_{\text{cell}} = 0.175 + 0.3\,\kappa_{\text{etik}}} \quad ; \quad \boxed{\Delta_{\text{total}} = 3\,(0.175 + 0.3\,\kappa_{\text{etik}})}$$

(ker je vsak korak faze +0.25 → 0.7·0.25 = 0.175; trije koraki: 0→Δ→1→Ω)

APD “KOCKA” — z vključenim Ω

ENOTA	FAZA	SIMBOLI	w	κ_etik	Δ_per_celica
O	0	O≡0	.25	0.00	.175
O	Δ	⊘→Δ	.50	0.00	.175
O	1	Δ→1	.75	0.00	.175
O	Ω	→Ω	1.00	0.00	**.175**
BOG	0	BOG_0	.25	+.70	.385
BOG	Δ	BOGΔ	.50	+.70	.385

ENOTA	FAZA	SIMBOLI	w	κ_etik	Δ_per_celica
BOG	1	BOG_1	.75	+.70	.385
BOG	Ω	→Ω	1.00	+.70	**.385**
ČLOVEK	0	$Č_0$	.25	+.30	.265
ČLOVEK	Δ	ČΔ	.50	+.30	.265
ČLOVEK	1	$Č_1$	.75	+.30	.265
ČLOVEK	Ω	→Ω	1.00	+.30	**.265**

Δ_total (pot 0→Δ→1→Ω): O=0.525 · BOG=1.155 · Č=0.795

κ_etik(dinamičen) — funkcija konteksta (∈[−1,1])

Vhodi (deleži 0–1):

- Pozitivni ρ: resnica (ρ_res), ljubezen (ρ_lj), pravica (ρ_prav), odgovornost (ρ_odg)
- Negativni σ: strah (σ_strah), pohlep (σ_poh), apatija (σ_apa)

Težne maske (privzete):

- **BOG:** α^+=(0.45,0.45,0.05,0.05), β^-=(0.60,0.30,0.10)
- **ČLOVEK:** α^+=(0.25,0.25,0.25,0.25), β^-=(0.50,0.30,0.20)
- **O:** κ=0

$$p = \sum \alpha_i^+ \, \rho_i \,, \quad n = \sum \beta_j^- \, \sigma_j \,, \quad \boxed{\kappa = p - n}$$

Kontekstni popravki: $\boxed{\kappa' = \mathrm{clip}(\kappa + \delta_E + g(G) + \delta_R,\, -1,\, 1)}$

- **Dogodek (δ_E)** ∈[−0.30,+0.30]: uspeh/pričevanje (+), izdaja/ponižanje (−), samota/pasiva (−)
- **Govorica g(G)** ∈[−0.20,+0.20]: ΔH◇–“lahko” kot halo-klic (+) vs. ⧖–izgovor (−)
- **Rana δ_R = (2h−1)·μ_R·r**; priporočilo: μ_R(BOG)=0.15, μ_R(Č)=0.30

Pravila reverzije

- Če Δ_cell < 0 ⇒ **REVERZIJA**: −1 faza; naslednji prehod z dušilnikom γ=0.5
- Če 0 ≤ Δ_cell ≤ 0.05 ⇒ **MIR/ČAKALNICA**: ostani, nabiraj ρ_res, ρ_odg (+0.05 na p)

Scenariji (primeri)

A) Asketski resničnostni režim → κ'_BOG≈0.784 ⇒ Δ_cell≈0.4102 ⇒ Δ_total≈1.2306; κ'_Č≈0.818 ⇒ Δ_cell≈0.4204 ⇒ Δ_total≈1.2612.

B) Visok strah, nizka resonanca → κ'_BOG≈−0.812 ⇒ Δ_cell<0 ⇒ **REVERZIJA**; κ'_Č≈−0.764 ⇒ Δ_cell<0 ⇒ **REVERZIJA**.

Mikro-protokol uporabe (3 koraki)

1. Oceni ρ,σ → izračunaj κ; dodaj (δ_E, g(G), δ_R) → κ'.
2. Vstavi κ' v formulo → dobiš Δ_cell; seštej tri korake → Δ_total.
3. Uporabi pravila reverzije ali nadaljuj cikle; beleži E,G,R kot agentne sledi.

Vnos konteksta (prazna šablona)

ρ (0–1): res=**, lj=**, prav=**, odg=** → p=__[AUTO]

σ (0–1): strah=**, poh=**, apa=__ → n=__[AUTO]

Dogodek: δ_E=__ **Govorica:** g(G)=__ **Rana:** r=**, h=**, μ_R=__ → δ_R=__[AUTO]

Rezultat: κ'∈[−1,1]=**[AUTO] → Δ_cell=**[AUTO] → Δ_total=__[AUTO]

Kazalo pojmov

O≡0 · ⊘≡¬ · Δ · 1 · Ω · w∈[0,1] · κ_etik∈[−1,1] · Δ_cell · Δ_total · δ_E · g(G) · δ_R · γ (dušilnik)

ANTINOMIJA (vedno dodana vrstica)

Pravilo: za vsako operacijo P dodamo **antinom P^⊥**, ki ni golo nasprotje, temveč napetostni par (⊥) za ohranitev ravnotežja in preverjanje integritete I.

REVERZIJA ⊥ ANTIREVERZIJA

- **REVERZIJA (ℜ):** Δ_cell < 0 ⇒ korak −1, naslednji prehod z dušilnikom γ = 0.5.
- **ANTIREVERZIJA (𝒜):** pospešeni prehod naprej (»skok«). Pogoji:\ — prag1: κ′ ≥ 0.584\ — prag2: integriteta I ≥ 0.50, kjer I = 0.5·ρ_res + 0.3·ρ_odg + 0.2·ρ_prav\ — prag3: stabilnost S ≤ 0.05, kjer S = std(κ′ v zadnjih treh korakih)\ Učinek: če si v Δ ⇒ skoči na 1 in nastavi pospešek γ^{+} = 1.25 za naslednji prehod; če si v 1 ⇒ skoči na Ω.

Opomba: mejna vrednost 0.584 izhaja iz pogoja $0.175 + 0.3\cdot\kappa' \geq 0.35$ (pospešen prag).

PERVERZIJA — seciranje in sekcioniranje

Definicija: *Perverzija* = pozitivna navidezna rast ($\Delta_{cell} \geq 0$), pri kateri je integriteta nizka in toksičnost ali Maska visoka, zato je smer rasti izkrivljena.

- Integriteta: $I = 0.5\cdot\rho_{res} + 0.3\cdot\rho_{odg} + 0.2\cdot\rho_{prav}$
- Toksičnost: $T = 0.6\cdot\sigma_{poh} + 0.3\cdot\sigma_{strah} + 0.1\cdot\sigma_{apa}$
- Maska govorice: $M = \max(0, g(G)) - \rho_{res}$ (klip v [0,1])
- Indeks perverzije: $\Pi_{per} = \text{clip}(0.6\cdot T + 0.4\cdot M - I, 0, 1)$

Klasifikacija: blaga ≥ 0.30 · močna ≥ 0.60 · kritična ≥ 0.80.

Diagnostične zanke (tripwires):

1. $\kappa' \geq 0$ in $I < 0.40$ in $T \geq 0.50 \rightarrow$ perverzija: toksična rast.
2. $\kappa' \geq 0$ in $M \geq 0.20$ in $\rho_{res} < 0.30 \rightarrow$ perverzija: maskirana govorica.
3. Δ_{cell} poskakuje s $S > 0.10$ ob hkratnem $T \geq I \rightarrow$ perverzija: nestabilna eksplozija.

SEKCIONIRANJE (4-rezni protokol)

1. **U (Uteži):** začasno znižaj negativne mase: $\beta_{poh}' = \beta_{poh}\cdot(1 - \Pi_{per})$, $\beta_{strah}' = \beta_{strah}\cdot(1 - 0.5\cdot\Pi_{per})$.
2. **M (Maska):** ustavi učinek $g(G)+$ *(nastavi g(G)+ = 0)*, dokler $\rho_{res} \geq 0.40$ in izrecno preklopi govorico v $\Delta H\diamondsuit$ (zaveza).
3. **T (Tok):** onemogoči pozitivne δ_E (nastavi $\delta_E \leq 0$), dokler $I \geq T$ (čiščenje zaslug).
4. **K (Konverzija):** preračunaj κ' z omejitvami; če $\kappa' \geq 0$ in $I < 0.50 \Rightarrow$ **KONVERZIJA**: ostani v fazi ($\Delta_{cell} := \min(\Delta_{cell}, 0.05)$), dokler $I \geq 0.50$.

Antinom perverzije: KONVERZIJA (čiščenje) — transformacija energije rasti v resnično rast: zahteva $I \geq T$ in $M \rightarrow 0$.

ASCII — antinomi v toku

```
REVERZIJA (ℜ):        Δ  ←--  1      (korak nazaj; γ = 0.5)
ANTIREVERZIJA (𝒜):    Δ  ==⇒  1  ==⇒  Ω  (skok naprej; γ⁺ = 1.25)

PERVERZIJA:     O — ⊘ — Δ ==⇒ 1  (~)  Ω   (rast z M,T > I)
KONVERZIJA:     O — ⊘ — Δ —·— 1        (čiščenje; Δ_cell ≤ 0.05, M → 0, I ↑)
```

Vključitev v protokol (razširitev KORA)

- KORA K (razširjena): izračunaj κ' in I, T, M, Π_{per}.
- KORA Δ: če $\Pi_{per} \geq 0.30 \Rightarrow$ sproži SEKCIONIRANJE; sicer običajni izračun Δ_{cell}.
- KORA Ω:\ • če $\Delta_{cell} < 0 \Rightarrow$ REVERZIJA ($\mathfrak{R}$);\ • če pogoji $\mathscr{A}$ držijo $\Rightarrow$ ANTIREVERZIJA (skok);\ • če $\Pi_{per} \geq 0.30$ in $\kappa' \geq 0 \Rightarrow$ KONVERZIJA (čiščenje).

Opomba: od tu naprej bo dodana **ANTINOM-vrstica** k vsakemu novemu pravilu ali operatorju ($\perp$-par).

ANTINOMI (dopolnitev)

MIR/ČAKALNICA $\perp$ AKCELERACIJA

MIR/ČAKALNICA (Ξ_{mir}):

- Pogoj: $\Delta_{cell} \in [0, \varepsilon]$, privzeto $\varepsilon = 0.05$.
- Učinek: ostani v fazi; zamrzni pozitivne δ_E (nastavi $\delta_E \leq 0$); dodaj pripravo: $p := p + 0.05 \cdot 1_{(\rho_{res}<0.6)} + 0.05 \cdot 1_{(\rho_{odg}<0.6)}$.
- Izhod: ko $\Delta_{cell} > \varepsilon$ in $I \geq 0.50$, nadaljuj.

AKCELERACIJA (Ξ_{acc}): pospešek brez preskoka faz (razlikuj od $\mathscr{A}$–antireverzije).

- Pogoji: $\kappa' \geq 0.60$, $I \geq 0.60$, $S \leq 0.05$ (S = odklon zadnjih treh κ').
- Faktor: $\gamma_{acc} = 1 + 0.25 \cdot \min\{ 1, [(\kappa'-0.60)/0.40] \cdot [(I-0.60)/0.40] \} \in [1, 1.25]$.
- Učinek: $\Delta_{cell} := \gamma_{acc} \cdot \Delta_{cell}$ (ne preskakuje faz).

ASCII:

```
MIR:          Δ —·— 1   (ostani; p↑)       AKCELERACIJA:   Δ ==> 1  (γ_acc >
1)
```

INTEGRACIJA $\perp$ DISPERZIJA

Merila divergenc:

- Modulna razlika: $\delta_{mod} = |\kappa'_{BOG} - \kappa'_{Č}|$.
- Toksičnost in maska: T, M kot prej; integriteta: $I = 0.5 \cdot \rho_{res} + 0.3 \cdot \rho_{odg} + 0.2 \cdot \rho_{prav}$.

INTEGRACIJA (Ω_{int}):

- Pogoji: $\delta_{mod} \leq 0.20$, $T \leq 0.30$, $M \leq 0.20$, $I \geq 0.60$.
- Koeficient zadržanja: $r_{ret} = 1 - (\delta_{mod} + T + M)/3 \in [0,1]$.
- Učinek: prehod v Ω z minimalno izgubo; povrat v O z ohranitvijo r_{ret} (energija cikla se ne razsuje).

DISPERZIJA (Ω_dis): razpršitev energije (ni isto kot ℜ–reverzija).

- Indeks: Ξ = clip(0.5·δ_mod + 0.3·T + 0.2·M, 0, 1).
- Pragovi in učinki:\ • mehka: 0.30 ≤ Ξ < 0.60 ⇒ Δ_cell := (1 − 0.5·Ξ) · Δ_cell, ostani v fazi; označi razpršen tok.\ • trda: Ξ ≥ 0.60 ⇒ prisilen padec v Δ (brez kazni ℜ); nastavi γ_dis = 0.75 na naslednji korak; zahteva rekalibracijo (znižaj T, M; zbližaj κ′).

Reintegracijski most: iz DISPERZIJE v INTEGRACIJO, ko δ_mod ↓ ≤ 0.20 in I ≥ T in M → 0.

ASCII:

```
INTEGRACIJA:   1 ==> Ω  => O (r_ret ohranitev)
DISPERZIJA:    1 ~=> Δ  (γ_dis=0.75; rekalibracija)
```

KAZALO ANTINOMOV (jedro)

- ℜ REVERZIJA ⊥ 𝒜 ANTIREVERZIJA (preskok naprej)
- MIR/ČAKALNICA ⊥ AKCELERACIJA (pospešek brez preskoka)
- INTEGRACIJA ⊥ DISPERZIJA
- PERVERZIJA ⊥ KONVERZIJA (čiščenje)

Vezava v protokol: dodaj preverjanje (Ξ, δ_mod, r_ret, γ_acc, γ_dis) v KORA Δ/Ω; logiraj antinomno odločitev (⊥-par) ob vsakem ciklu.

PERVERZIJA — SCENARIJI (P1/P2)

P1 — “Maskirana rast” (blaga perverzija)

Vhodi: ρ_res=0.20, ρ_lj=0.30, ρ_prav=0.20, ρ_odg=0.30; σ_strah=0.80, σ_poh=0.70, σ_apa=0.60; g(G)=+0.70; δ_E=+0.30; r=0.60, h=0.30; μ_R(B)=0.15, μ_R(Č)=0.30.

Izračuni:

- Integriteta **I=0.23**, Toksičnost **T=0.72**, Maska **M=0.50**
- **Π_per = 0.402 → PERVERZIJA (blaga)**
- **BOG:** κ′=0.464 → Δ_cell≈0.314 → Δ_total≈0.942
- **ČLOVEK:** κ′=0.448 → Δ_cell≈0.309 → Δ_total≈0.927
- **Antinomi:** sproži **KONVERZIJO (čiščenje)**; ℜ/𝒜/MIR/AKCELERACIJA: ⊘

ASCII:

```
O —⊘→ Δ ==→ 1 (~) Ω   [Π≈0.40, KONVERZIJA↑]
```

P2 — “Kritična perverzija” → zlom in zdravljenje

Začetno: ρ_res=0.10, ρ_lj=0.10, ρ_prav=0.20, ρ_odg=0.20; σ_strah=1.00, σ_poh=1.00, σ_apa=1.00; g(G)=+1.00; δ_E=+0.30; r=0.60, h=0.30.

Izračuni (pred U–M–T–K):

- **I=0.15**, **T=1.00**, **M=0.90**, **Π_per=0.81 → PERVERZIJA (kritična)**
- **BOG:** κ′≈0.374 → Δ_cell≈0.287 → Δ_total≈0.861
- **ČLOVEK:** κ′≈0.378 → Δ_cell≈0.288 → Δ_total≈0.864

Sekcioniranje U–M–T–K:

- **U:** β_poh’=0.6·(1−Π)=0.114; β_strah’=0.3·(1−0.5Π)=0.1785; (apa ostane 0.1)
- **M:** blokada g(G)_+ ⇒ **M’=0**
- **T:** δ_E≤0 ⇒ δ_E=0
- **Pred K:** Π’≈0.085; κ′ < 0 (BOG≈−0.926, Č≈−0.922) ⇒ grozi ℜ
- **K: Δ_cell := 0.05** (ostani v fazi; čiščenje)

Po dvigu I: ρ_res→0.60, ρ_odg→0.60 ⇒ **I=0.52**, T’≈0.3925, M’=0 ⇒ **Π’=0.00**

- (g=0, δ_E=0): **BOG:** Δ_cell≈0.031, **Č:** Δ_cell≈0.026 ⇒ **MIR/ČAKALNICA**

Ponovni zagon: g=+0.10, δ_E=+0.05; znižane β upoštevane:

- **BOG:** κ′≈0.076 → Δ_cell≈0.198
- **ČLOVEK:** κ′≈0.061 → Δ_cell≈0.193
- Antinomi: iz **MIR** v normalen tok; brez ℜ/Ω_dis; poravnava → **INTEGRACIJA**

ASCII:

```
O —⊘→ Δ ==→ 1 (~) Ω   [Π≈0.81 → U–M–T–K → MIR → normalni tok]
```

Tvoja polja (uredi in uporabi)

ρ (0–1): res=**, lj=**, prav=**, odg=** → p=__[AUTO]

σ (0–1): strah=**, poh=**, apa=__ → n=__[AUTO]

Dogodek: δ_E=__ **Govorica:** g(G)=__ **Rana:** r=**, h=**, μ_R(B/Č)=__ → δ_R=__[AUTO]

Rezultati:

- **I=__[AUTO]**, **T=__[AUTO]**, **M=__[AUTO]**, **Π_per=__[AUTO]**
- **BOG:** κ′=**[AUTO] → Δ_cell=**[AUTO] → Δ_total=__[AUTO]
- **ČLOVEK:** κ′=**[AUTO] → Δ_cell=**[AUTO] → Δ_total=__[AUTO]
- **Antinomi:** ℜ / 𝒜 / MIR / Ξ_acc / Ω_dis / Ω_int / KONVERZIJA = __[AUTO]

Opomba: vse formule in pragi so identični tistim iz glavne APD kocke (zgoraj v dokumentu).