

DB15

内 蒙 古 自 治 区 地 方 标 准

DB15/T 4350—2025

内蒙古东部地区盐碱地水稻栽培技术规程

Technical code of practice for rice cultivation on saline-alkali
soils in eastern Inner Mongolia

2026-04-10 发布

2026-05-10 实施

内蒙古自治区市场监督管理局 发 布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古自治区农牧厅提出。

本文件由内蒙古自治区农业标准化技术委员会（SAM/TC 20）归口。

本文件起草单位：兴安盟农牧科学院、兴安盟隆华农业科技有限公司、兴安盟农牧技术推广中心、科尔沁右翼中旗农牧技术推广中心、扎赉特旗农牧和科技事业发展中心、通辽市农牧业发展中心、赤峰市翁牛特旗农牧技术推广中心、呼伦贝尔市农业技术推广中心。

本文件主要起草人：徐兴健、韩磊、温丽、孙乌日娜、薛海楠、梁爽、梁依、刘季骢、白璐、陈玉泉、海日汗、谷艳茹、王世刚、王坤、高前慧、常石山、周一民、于静辉、张利、郭志刚、罗巍、马奔驰、宁小萌、韩烽、李子凡、诺敏。

内蒙古东部地区盐碱地水稻栽培技术规程

1 范围

本文件规定了内蒙古东部地区盐碱地水稻栽培的土壤及水源、育秧技术、本田管理、收获等全过程技术要求。

本文件适用于内蒙古东部地区盐碱地水稻栽培。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB/T 8321 （所有部分）农药合理使用准则
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 1276 农药安全使用规范 总则
- NY/T 1534 水稻工厂化育秧技术规程
- NY/T 1997 除草剂安全使用技术规范通则
- NY/T 3658 水稻全程机械化生产技术规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 土壤及水源

4.1 土壤

盐碱地耕层土壤条件pH值8.0~9.5；全盐含量1.0 g/kg~6.0 g/kg。

4.2 水源

灌溉用水可用辖区内河流水和地下水，农田灌溉水质应符合GB 5084的要求。

5 育秧技术

5.1 秧田选址及要求

5.1.1 秧田选址

选择向阳背风、地势平坦、水电方便、无农药残留的田地或庭院建造育秧大棚。

5.1.2 秧棚要求

采用大、中棚进行育秧，秧棚通风口距离地面0.5 m~0.6 m左右，棚外设置挡风设施，有喷灌条件且均匀喷淋。苗床过道下方建立排水渠道，也可筑起10 cm~15 cm高台用于平铺秧盘，建立排水渠道，用于排水排盐。

5.1.3 苗床要求

采用隔离层育秧技术，苗床播种前使用沙土建立3 cm~5 cm隔离层，将秧苗根系与苗床底层盐碱土隔离，苗床消毒及育秧基质选择按照NY/T 1534的规定执行。

5.2 种子要求及种子处理

5.2.1 种子要求

选用国家和自治区审定(登记)的高产优质耐盐碱水稻品种，种子质量应符合GB 4404.1的要求。

5.2.2 种子处理

采用盐水选种，应符合NY/T 1534的要求，将选好的种子在温室下药剂浸水，使用咯菌腈·噻虫嗪、杀螟丹等药剂防治恶苗病及干尖线虫，浸种天数(d)与水温乘积(℃)约等于100℃，农药使用应符合NY/T 1276的要求。

5.2.3 催芽

催芽按照NY/T 1534的规定执行。

5.2.4 播种

4月上中旬播种，日平均气温连续5 d超过5℃即可；每盘播种量120 g~130 g；播种后压实，使种子三面入土，覆土0.5 cm，进行苗床封闭除草、覆膜。

5.3 苗床管理

5.3.1 温度管理

播种后大棚密封保温，出苗率达到80%时揭去无纺布。出苗后开始通风炼苗，棚内温度控制在25℃~28℃。移栽前棚内温度控制在20℃。遇到低温冷害可覆膜或加防寒帘。

5.3.2 水分管理

保持土壤湿润，防止土壤干燥返盐，当早晨叶尖无水珠时或床面出现干燥时应早、晚浇水，一次浇足浇透。封闭管理期间苗床有积水及时通过排水渠进行排水，发现土壤干燥返盐及时浇水接上底墒。

5.3.3 苗床灭草

在苗床封闭除草的基础上，出现芦苇、三棱草等多年生杂草时进行人工除草，出现稗草可使用二氯喹啉酸、敌稗或氰氟草酯进行灭草，药剂使用应符合NY/T 1997的规定。

5.3.4 调酸杀菌

秧苗1.5叶期，用30%恶霉灵（水剂）200 mL和35%甲霜灵（干粉剂）兑水1000倍液喷施200 m²苗床。苗床土壤pH控制在4.5~5.5，利于水稻秧苗生长。

5.3.5 苗床追肥

秧苗2.5叶期若发现脱肥，用水稻苗床专用肥按说明追施，喷施后清水冲洗。移栽前1 d~2 d施送嫁氮肥，带肥下地，随秧苗一起栽到本田里。

5.4 秧苗质量

秧苗质量应符合NY/T 1534中北方中、大苗秧苗标准。

6 本田管理

6.1 本田准备

6.1.1 灌排设施

整地前清理灌排设施，采用单灌单排。

6.1.2 整地施肥

春播前进行旋耕，深度10 cm，旋后耙地，整平耙细，平好垄沟，打好池埂。2~3年秋季浅翻一次，翻深15 cm~20 cm。结合旋耕施入腐熟农家肥2 m³/667 m²~3 m³/667 m²。

6.1.3 洗盐及排盐

整地后放水泡田，轻度盐碱地pH≤8.5，含盐量在3 g/kg以下或长年耕作熟地只泡不排。新垦盐碱地或重度盐碱地pH≥8.5以上，含盐量在3 g/kg以上的需洗盐1~3次，洗盐过程中灌水泡田3 d~5 d，水深10 cm以上，水耙轮搅动至浑水，然后放水排盐，以冲洗盐碱，泡后换上新水。

6.2 插秧移栽

6.2.1 插秧时间

5月中旬日平均温度高于13 ℃插秧为宜。

6.2.2 插秧密度

行穴距30 cm×10 cm~12 cm，4株/穴~6株/穴，插秧穴数2.0万穴/667 m²~2.2万穴/667 m²。

6.2.3 插秧质量

插秧深浅一致，深度<3 cm，秧苗移栽行直苗匀，插秧作业质量应符合NY/T 3658的规定。

6.3 水层管理

采用浅、湿交替灌溉。移栽至返青期检测水层pH值，当pH值超过8.0或水面出现泡沫，水层出现浑浊或滑腻感，应及时排水换水。新垦盐碱地块或重度盐碱地撤水延迟5 d~7 d，防止地块返碱。

6.4 肥料管理

6.4.1 施肥总量

施肥总量为纯氮 $10\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 13\text{ kg}/667\text{ m}^2$ 、纯钾(K_2O) $6\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 8\text{ kg}/667\text{ m}^2$ 、磷肥(P_2O_5) $5\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 8\text{ kg}/667\text{ m}^2$ 、硅肥(SiO_2) $8\text{ kg}/667\text{ m}^2$ ，根据地块选择性施入锌肥 $1\text{ kg}/667\text{ m}^2\sim 1.5\text{ kg}/667\text{ m}^2$ 。对于新垦盐碱地或重度盐碱地可以施入碱性土壤改良剂 $15\text{ kg}/667\text{ m}^2$ 。肥料使用应符合NY/T 496的要求。

6.4.2 基肥

基肥在洗盐之后施入，氮肥占全生育期的30%、钾肥、硅肥占全生育期50%、磷肥、锌肥按总量的100%。

6.4.3 返青肥

水稻移栽后5 d~7 d施入，占氮肥总量的30%，可同时施入酸性调节肥料（按说明使用）降低碱害加快缓苗。

6.4.4 分蘖肥

分蘖中期施入，施入量占氮肥30%，钾肥的50%。

6.4.5 穗粒肥

幼穗分化1~2期施入，施入量占氮肥10%、硅肥的50%。

6.5 病虫草害防治

6.5.1 防治原则

坚持“预防为主，综合防治”的原则，农药使用应符合GB/T 8321（所有部分）和NY/T 1276的规定。

6.5.2 稻瘟病

防治叶瘟在田间初见病斑时施药，叶瘟发病严重田块，可7 d后第二次施药；穗瘟在破口前3 d~5 d预防施药，在齐穗期第二次施药。保护性药剂可选用三环唑、丙硫唑、咪铜·氟环唑等药剂；治疗性药剂可选用吡唑醚菌酯等药剂。

6.5.3 稻曲病

水稻破口前7 d~10 d施药预防，如遇多雨天气，间隔7 d第2次施药。药剂选用苯甲·丙环唑、肟菌·戊唑醇等。

6.5.4 二化螟

选择甲氧虫酰胺、茚虫威、乙基多杀菌素、阿维·氯苯酰、阿维·茚虫威等药剂防治。

6.5.5 红线虫

可以选择醚菊酯、溴氰菊酯、氯吡硫磷等药剂防治。

6.5.6 芦苇草

以芦苇为主的优势群体地块，采用二氯喹啉酸、氰氟草酯、莎稗磷三种药剂混合，并添加助剂，对芦苇集中区域茎叶定向喷施，严防药剂漂移产生药害；也可结合秋翻地将芦苇根打断，人工清除。

7 收获

水稻黄熟末期谷色变黄，籽粒充实饱满坚硬，90%以上即可收获。
