

DERIVADAS: REGRAS DE DERIVAÇÃO

5. DERIVADA DE UMA FUNÇÃO DENTRO DA OUTRA (CADEIA DE FUNÇÕES):

Quando estamos lidando com uma função dentro de outra, como por exemplo

$$f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$$

Normalmente encontraríamos uma $f(x) = \sqrt{x}$, e assim aplicaríamos a regra da queda. Porém não é o nosso caso no momento é como se tivesse uma função polinomial dentro da nossa função potência, como prosseguiríamos nesse caso?

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(x+h)^2 + (x+h) + 1} - \sqrt{x^2 + x + 1}}{h} = \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 2xh + h^2 + x + h + 1} - \sqrt{x^2 + x + 1}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)} - \sqrt{x^2 + x + 1}}{h} = \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)} - \sqrt{x^2 + x + 1})}{h} &\cdot \frac{(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)} + \sqrt{x^2 + x + 1})}{(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)} + \sqrt{x^2 + x + 1})} =\end{aligned}$$

Observem que após fazer apenas algumas manipulações apareceu o termo $\frac{(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)} + \sqrt{x^2 + x + 1})}{(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)} + \sqrt{x^2 + x + 1})}$, a qual equivale a 1, a adição desse termo é necessário para se alcançar o resultado que é buscado, com isso basta usar a propriedade de produto de uma soma e diferença:

$$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2$$

Tal que,

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)} - \sqrt{x^2 + x + 1})}{h} &\cdot \frac{(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)} + \sqrt{x^2 + x + 1})}{(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)} + \sqrt{x^2 + x + 1})} = \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)})^2 - (\sqrt{x^2 + x + 1})^2}{h(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)} + \sqrt{x^2 + x + 1})} &= \end{aligned}$$

Por temos uma raiz quadrada elevada ao quadrado, podemos então corta-la e ficar com:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)})^2 - (\sqrt{x^2 + x + 1})^2}{h(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)} + \sqrt{x^2 + x + 1})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1) - (x^2 + x + 1)}{h(\sqrt{x^2 + x + 1 + h(2x + h + 1)} + \sqrt{x^2 + x + 1})} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x+h+1)}{h(\sqrt{x^2+x+1+h(2x+h+1)}+\sqrt{x^2+x+1})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2x+h+1)}{(\sqrt{x^2+x+1+h(2x+h+1)}+\sqrt{x^2+x+1})} =$$

$$\frac{(2x+0+1)}{(\sqrt{x^2+x+1+0(2x+0+1)}+\sqrt{x^2+x+1})} = \frac{2x+1}{(\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{x^2+x+1})} = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+x+1}} \cdot 2x + 1$$

Com isso chegamos na derivada dessa cadeia de funções $\frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$, arrumando um pouco a mesma temos que

$$\frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+x+1}} \cdot 2x + 1$$

Quero que percebam a seguinte ideia, considere $x^2 + x + 1 = g$, tal que sua derivada $g' = 2x + 1$, após isso vejam a nossa função $f(x)$ como uma $f(g)$, sairíamos de

$$f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} \rightarrow f(g) = \sqrt{g}$$

Pois fizemos essa substituição de valores, se fossemos derivar essa $f(g)$, aplicaríamos a regra da queda, tal que teríamos:

$$f(g) = \sqrt{g} = g^{1/2} \therefore f'(g) = \frac{1}{2} \cdot g^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{g}}$$

Agora retornamos de g para x , teríamos:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{g}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}}$$

Observem que a única coisa que falta para chegar na nossa derivada, é o produto com a derivada de g , ao ponto que podemos dizer que a derivada da nossa $f(x)$, pode ser escrita como:

$$f'(x) = f'(g) \cdot g' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} \cdot 2x + 1$$

Vejam que alcançamos o mesmo resultado por um caminho mais simples. Logo podemos generalizar esse formato e criar a **Regra da Cadeia** que é dada por:

$$f'(x) = f'(g) \cdot g'$$

Da mesma forma quando encontrar com uma função do tipo:

$$h(x)^2$$

Podemos derivar seguindo a mesma ideia da cadeia:

$$\frac{d}{dx}[h(x)^2] = 2 \cdot h(x)^{2-1} \cdot h'(x)$$

De forma mais geral:

$$\frac{d}{dx}[h(x)^n] = n \cdot h(x)^{n-1} \cdot h'(x)$$

(Isso aqui será utilizado constantemente em derivação implícita e oculta)

Vamos fazer um exemplo e colocar a mesma em prática:

$$f(x) = 3x^2 \cdot \sqrt{2x+1}$$

Nesse exemplo temos um produto de funções, onde uma dessas é uma cadeia $\sqrt{2x+1}$, isso não mudará em nada a forma a qual fizemos até aqui, aplicaremos tudo que aprendemos até o momento, para facilitar podemos trabalhar primeiramente de forma separada as funções e sua derivada, e depois aplicar as regras. Vamos começar considerando que

$$f = 3x^2 \therefore f' = 3 \cdot 2 \cdot x^1 = 6x$$

$$g = \sqrt{2x+1} = \sqrt{h} \therefore g' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{h}} \cdot h' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2x+1}} \cdot 2 \text{ (Regra da Cadeia)}$$

$$h = 2x + 1 \therefore h' = 2 + 0 = 2$$

Já sabendo quem é quem, podemos aplicar a regra do produto:

$$f'(x) = f' \cdot g + f \cdot g'$$

$$f(x) = 3x^2 \cdot \sqrt{2x+1} \therefore$$

$$f'(x) = 6x \cdot \sqrt{2x+1} + 3x^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2x+1}} \cdot 2 = 6x \cdot \sqrt{2x+1} + \frac{3x^2}{\sqrt{2x+1}}$$

Com isso vocês podem concluir nesse último ponto, caso queiram arrumar um pouco mais, não terá problema, mas nesse ponto a função já pode ser aceita. Com isso vocês aprenderam que a ideia para chegar na Regra da Cadeia.