

# Biologia Quantitativa

## Populações de Organismos Distribuições Testes de Hipóteses

Depto de Zoologia  
Módulo 03 remoto  
Fevereiro de 2021


# Roteiro da Aula

- Vamos apresentar 3 temas
- Um tema de biologia - populações e distribuições
- Um tema de estatística - teste de hipóteses
- Um tema de R e Rstudio - o R Notebook e os comandos para testar hipóteses com o teste de t


# Distribuição Normal

- Surgiu há aproximadamente 200 anos
- Forma de sino
- Parâmetros: média, variância, desvio padrão
- Integral = 1
- Função densidade sempre  $> 0$
- Simétrica em torno da média
- Para cada combinação de média e desvio padrão há uma curva normal

# Distribuição Normal - Origem



(a) Distribuição de frequência em forma de sino



(b) Uma curva contínua que aproxima a distribuição de frequências observadas

Figura 5.6 – A curva normal

# Distribuição Normal

Dizemos que uma variável aleatória contínua  $X$  tem distribuição normal, com parâmetros  $\mu$  e  $\sigma$ , onde  $-\infty < \mu < +\infty$  e  $\sigma > 0$ , se a sua função densidade de probabilidade for dada por:


$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R},$$

# Distribuição Normal - Estatísticas

- Variância: soma dos quadrados /  $n$
- Desvio padrão: raiz quadrada variância (unidade)
- Coeficiente de variação:  $(dp/media)*100$
- Necessidade de ter estimador não tendencioso
- Como gerar estimadores da pop a partir de amostra
- Média amostral = não tendencioso
- Variância amostral = ok se dividir por  $n-1$  e não  $n$
- Desvio padrão amostral: precisa de fórmula de correção
- 
- Erro padrão da média:  $dpa/raiz(n)$




# Distribuição Normal



**Figura 5.7** – A distribuição normal com parâmetros  $\mu$  e  $\sigma$

# Distribuição Normal - Áreas





# Distribuição Normal - Lim Conf




Figura 7.2 – Intervalo para uma média com 68% e 95% de confiança


# Distribuição Normal - Int Conf

- Média da amostra diferente da média populacional
- Diferença é o erro amostral
- O valor do erro não pode ser calculado, mas a partir da variância da amostra podemos o erro amostral máximo e seu intervalo de confiança (sec 7.3.2 Andrade Ogliari)
- A média da amostra é um estimador não tendencioso da média populacional
- A variância da amostra é estimador não tendencioso se dividido por  $n-1$  em vez de  $n$  (soma dos quadrados /  $(n-1)$ )
- O desvio padrão (raiz quadrada da variância amostral) é estimador tendencioso, precisa de correção. Diminui com amostras grandes

# Teorema do Limite Central

- A distribuição das médias de qualquer distribuição tende à distribuição normal
- Independe do tipo de distribuição original

# Teorema do Limite Central



**Figura 6.6** – Histogramas da distribuição amostral das médias obtidas de amostras de três tamanhos ( $n = 5$ ,  $n = 10$  e  $n = 30$ ) para três distribuições (Poisson, uniforme e bimodal)




# Distribuição Student t

- Andrade e Ogliari sec 7.3.3
- Na maioria das situações o erro padrão da população não é conhecido
- Entretanto podemos calcular o erro padrão da amostra
- Usar o erro padrão da amostra como estimador da população pode alterar a distribuição de probabilidade
- Usa-se ao invés da distribuição normal a distribuição t de student com parâmetro  $n-1$
- Este parâmetro é conhecido como graus de liberdade



# Distribuição de Student



**Figura 7.4** – Formas das distribuições  $t$  de Student e normal padrão

# Abordagem Frequencista

- Desenho experimental / observacional pré-definido Bolker p.10
- Calcular probabilidade de resultado particular, definido como a frequência média daquele resultado em uma sequência a longo prazo de experimentos repetidos.
- Calcular o valor  $p$ , ou seja a probabilidade do resultado particular ou de resultados mais extremos dada uma hipótese nula
- Caso a probabilidade for baixa, rejeitar a hipótese nula
- Críticas: mesmo com valores de  $p$  baixos ( $< 5\%$ ), rejeita-se a hipótese nula em alguns casos - um em 20 para 5%. Se o  $p > 5\%$  aceitamos a hipótese nula com o risco da mesma ser falsa.

# Abordagem Frequencista Slide 2

- Problemas com hipótese nula:
- Pode ser rejeitada mesmo com diferenças pequenas em relação à alternativa, em situações de grandes amostras que dão significancia estatística.
- Hipótese nula pontual (ex: inclinação da reta=0) não é realista. O teste acaba por depender de termos dados suficientes para rejeitar a hipótese nula.
- Recomendação (Bolker). Melhor estimar os valores dos parâmetros biologicamente significativos e obter seus intervalos de confiança do que centrar nos valores de p.

# Abordagem Bayesiana - Bolker

- Os dados observados são a realidade. Os parâmetros ou hipóteses tem distribuições probabilísticas
- Frequencista: existe um conjunto de parâmetros reais. Os dados experimentais fazem parte de uma distribuição de possíveis resultados.
- Vantagens da abordagem bayesiana: respostas são derivadas dos dados e não de uma sequência hipotética de repetições; permite fazer afirmativas sobre probabilidades de diferentes hipóteses ou valores de parâmetros.
- Dificuldades: na estatística Bayesiana as probabilidades das hipóteses tem de ser definidas a priori.
- Vantagens bayesianas: se há dados anteriores para incorporar à análise; modelos complexos multivariáveis; lacunas de dados; apoio à decisão (eventos raros/catastróficos)

# Abordagem por Estimadores- Bolker


- Estimativa por máxima verossimilhança ( Andrade e Ogliari sec 7.2). Combinado com análise frequencista.
- Dado um modelo estatístico, este método obtém o conjunto de parâmetros que maximizam a probabilidade de ocorrência dos dados observados.
- Geralmente usa-se o logaritmo da máxima verossimilhança (log-likelihood)
- Aceita-se um intervalo de 2 unidades  $\log e^{-2} \sim 1/7.4 = 14\%$
- Outra abordagem: em amostragem repetida, distribuição do log negativo segue qui-quadrado. Usa se 95% da distribuição qui-quadrado ou 1.92 unidades log ou razão  $e^{1.92} = 6.82$  como fator de decréscimo. Fora do intervalo apenas 5% no tempo



# Teste de Hipóteses

- 1 Definir o desenho lógico para testar as hipóteses,
  - verificar se de fato são testáveis
- 2 Definir os tipos de variáveis que estamos medindo
- 3 Definir o tipo de distribuição com que lidamos
- 4 Definir a estatística a ser usada para o teste
- 5 Definir o método (= tipo de teste estatístico) para testar a hipótese

# Qual é a Hipótese Nula?



# Conceito de Hipóteses

- Conceito de hipótese nula e alternativa cap 8 a&o
- Erros tipo 1 e tipo 2
- Tipo 1: rejeitar hipótese nula quando é verdadeira
- Tipo 2: não rejeitar hipótese nula quando é falsa
- Erro tipo 1: significância do teste – 5%
- Erro tipo 2: geralmente aceitável 20%

# Desenho Lógico

- Andrade e Ogliari sec 1.2 e 1.3
- Vieira Bioestatística cap 1,
- Todas as hipóteses contempladas nas categorias experimentais ou observacionais
- Pré- definição das alternativas que testam cada hipótese
- Tamanho amostral compatível com os valores das variáveis e a variação esperada
- Evitar pseudo-replicação

# Exemplos de Distribuições

- Vieira introdução à bioestatística caps 9,10,11,12,13
- Sokal & Rohlf caps 5,6,7,8
- Normal
- Binomial
- $t$
- Qui-quadrado
- $F$
- Poisson



# Exemplos de Distribuições





Figure 3.9 Exponential-based functions. "M-M" in the monomolecular figure is the Michaelis-Menten function with the same asymptote and initial slope.

# Distribuição Normal 3 casos



**FIGURE 6.2** Changes in the two parameters of the normal distribution affect the shape and location of the normal probability density function. **A.**  $\mu = 4$ ,  $\sigma = 1$ ; **B.**  $\mu = 8$ ,  $\sigma = 1$ ; **C.**  $\mu = 8$ ,  $\sigma = 0.5$ .

# Exemplo de Estatísticas

- Bioestat 2
- Mediana (divide distribuição em duas)
- Moda (frequência ou valor mais abundante)
- Variância e desvio padrão (medida de dispersão da pop)
- Erro padrão da média (medida de dispersão na estimativas da média)
- Intervalo de confiança - intervalo que cobre x% da distribuição

# Exemplo de Métodos

- Teste t
- Análise de variância
- Regressão
- Teste de Fisher 2 x2
- Mann-Whitney comparação de ranking
- Kolmogorov-Smirnov comparação de distribuições