



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA 2

EXAMEN FINAL

Apellido y nombre:

Carrera:

Legajo:

PARTE PRÁCTICA

Justifique debidamente todas sus respuestas.

1. Considerar los vectores $v_1 = (1, 2, 2, 3)$; $v_2 = (-2, 1, m, m - 1)$; $v_3 = (4, 1, 1, -2)$, $v_4 = (2, 2, 1, -1)$ de \mathbb{R}^4 . Se pide:

- (a) Determinar para qué valor/valores de m el conjunto $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es linealmente dependiente.
(b) Si (S) es el sistema $Ax = b$ donde b es el vector nulo de \mathbb{R}^4 y $A = (v_1|v_2|v_3|v_4)$ es la matriz cuadrada cuya primer, segunda, tercer y cuarta columna son v_1, v_2, v_3 y v_4 respectivamente, determinar los siguientes conjuntos:

$$CD = \{m \in \mathbb{R} : (S) \text{ es compatible determinado}\}.$$

$$CI = \{m \in \mathbb{R} : (S) \text{ es compatible indeterminado}\}.$$

$$I = \{m \in \mathbb{R} : (S) \text{ incompatible}\}.$$

2. Considerar las matrices A, B y $X \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ donde B es una matriz simétrica y $|B| = 4$.

- (a) Hallar X resolviendo la ecuación matricial dada por $2(X^t B)^t + BX - BA = I$.
(b) Hallar $|X|$ siendo X la matriz que verifica la ecuación del ítem anterior y sabiendo que:

$$BA + I = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -3 \\ -7 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Considere los puntos $A(2, -1, 1)$, $B(4, 0, 2)$ y $C(-3, 1, -2)$. Se pide:

- (a) Hallar las ecuaciones paramétricas y general del plano π que contiene los puntos A , B y C .
(b) Expresar la ecuación de la recta r que es perpendicular al plano π y que pasa por el punto $P(1, 1, 0)$.
(c) Hallar el punto Q que es simétrico a P respecto al plano π .

4. Indicar verdadero o falso. Justificar adecuadamente.

- (a) $\frac{y-1}{16} - \frac{x-2}{9} = 1$ es la ecuación de una hipérbola de centro $(2, 1)$ y focos $(2, -4)$ y $(2, 8)$.
(b) Si $\{w_1, w_2, w_3\}$ es una base de \mathbb{F}^3 entonces $\{w_1, w_1 + 2w_2, w_2 + 3w_3\}$ también es una base de \mathbb{F}^3 .
(c) Si A es una matriz invertible tal que $A^2 = A + I$ entonces $A^{-1} = A - I$.

Complemento para alumnos libres

5. Siete amigos van al cine.
- (a) ¿De cuántas formas pueden sentarse los 7 amigos en una fila de 7 butacas?
 - (b) Al llegar, son informados que quedan sólo 4 entradas. ¿De cuántas formas podrían repartirse estas entradas para ver la película?
6. Sea \mathbb{L} el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a los puntos fijos $(2, 3, 4)$ y $(2, -3, 4)$ es constante e igual a 8.

Identificar el lugar geométrico \mathbb{L} y expresar su ecuación.

PARTE TEÓRICA

1. En los siguientes items, indique la veracidad o falsedad de los enunciados **justificando** adecuadamente.
 - (a) Si A y B son dos conjuntos tales que $|A| = n$ y $|B| = m$ y, $\mathcal{F}(A, B)$ es el conjunto de todas las funciones de A en B , entonces $|\mathcal{F}(A, B)| = n^m$.
 - (b) El determinante de una matriz elemental es no nulo.
 - (c) El determinante de una matriz triangular superior es el producto de los elementos de la diagonal.
2. Desarrolle las ecuaciones paramétricas del plano a partir de tres puntos no alineados. Explique sus elementos. Explique cómo obtenerlas a partir de la ecuación general del plano, y recíprocamente.
3. Desarrolle los conceptos de dependencia e independencia lineal en \mathbb{F}^n , para un cuerpo \mathbb{F} . Explique mediante ejemplos cómo la resolución de sistemas lineales permite determinar (in)dependencia lineal. Defina base de \mathbb{F}^n , si hace falta otro concepto, explíquelo brevemente.
4. Elija una de las siguientes cuádricas: hiperboloide de una hoja o paraboloides elíptico. Deduzca las trazas con los planos coordenados y planos paralelos a los planos coordenados. De un ejemplo y grafique.