

# 微分方程数值解法

## 第十周作业

桑明达 15300180062

2018 年 5 月 21 日

### 1 P147 Poincaré 不等式离散形式 (式 3.1.54)

证明.

$$\begin{aligned}\mathbf{e} &= (e_1, e_2, \dots, e_N) \\ \delta_x^+ \mathbf{e} &= \left( \frac{e_2 - e_1}{h}, \frac{e_3 - e_2}{h}, \dots, \frac{e_N - e_{N-1}}{h} \right) \\ \therefore \sum_{i=1}^N e_i^2 &= \sum_{i=1}^N \left( \sum_{k=0}^{i-1} (e_{k+1} - e_k) \right)^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^N \left( \sum_{k=0}^{i-1} (e_{k+1} - e_k)^2 \right) \left( \sum_{k=0}^{i-1} 1^2 \right) \\ &\leq N \sum_{i=1}^N \left( \sum_{k=0}^{i-1} (e_{k+1} - e_k)^2 \right) \\ &\leq N \sum_{i=1}^N \left( \sum_{k=0}^{N-1} (e_{k+1} - e_k)^2 \right) \\ &= N^2 \sum_{k=0}^{N-1} (e_{k+1} - e_k)^2 \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \left( \frac{e_{k+1} - e_k}{h} \right)^2 \\ \therefore \|\mathbf{e}\|_{l^2} &\leq \|\delta_x^+ \mathbf{e}\|_{l^2}\end{aligned}$$

□

## 2 P151 3 三点差分格式极值原理和最大模误差估计

证明. (1) 由三点差分格式有,

$$-f_i = \frac{d}{dx} \left( a(x) \frac{du}{dx} \right) \Big|_{x=x_i} \approx \frac{1}{h} \left( a(x_{i+\frac{1}{2}}) \frac{u_{i+1} - u_i}{h} - a(x_{i-\frac{1}{2}}) \frac{u_i - u_{i-1}}{h} \right)$$

上式可以化为

$$a(x_{i+\frac{1}{2}}) (u_{i+1} - u_i) = -h^2 f_i + a(x_{i-\frac{1}{2}}) (u_i - u_{i-1})$$

当  $f_i \geq 0$  时, 如果  $u_i$  取得最小值, 因为  $a(x) \geq \alpha > 0$ , 所以上式左边大于等于 0, 右边小于等于 0。得到  $i=0$  或  $n$ , 或者得到  $u_i$  恒为常数, 即  $u(x)$  最小值只能在边界达到。

当  $f_i \leq 0$  时, 如果  $u_i$  取得最大值, 因为  $a(x) \geq \alpha > 0$ , 所以上式左边小于等于 0, 右边大于等于 0。得到  $i=0$  或  $n$ , 或者得到  $u_i$  恒为常数, 即  $u(x)$  最大值只能在边界达到。

极值原理得证。

(2) 记

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_N - 1)^T$$

$$\mathbf{e} = (e_1, e_2, \dots, e_N - 1)^T$$

$$\mathbf{f} = (f_1, f_2, \dots, f_N - 1)^T$$

$$\mathbf{R} = (R_1, R_2, \dots, R_N - 1)^T$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{\frac{3}{2}} + a_{\frac{1}{2}} & -a_{\frac{3}{2}} & & & \\ -a_{\frac{3}{2}} & a_{\frac{5}{2}} + a_{\frac{3}{2}} & -a_{\frac{5}{2}} & & \\ & -a_{\frac{5}{2}} & a_{\frac{7}{2}} + a_{\frac{5}{2}} & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -a_{N-2+\frac{1}{2}} \\ & & & -a_{N-1-\frac{1}{2}} & a_{N-1-\frac{1}{2}} + a_{N-1+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}$$

那么有

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = h^2 \mathbf{f}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{e} = h^2 \mathbf{R}$$

因为  $a(x) \geq \alpha > 0$ , 所以  $\mathbf{A}$  是正定阵, 所以

$$\mathbf{e} = h^2 \mathbf{A}^{-1} \mathbf{R}$$

$$\begin{aligned} \|\mathbf{e}\|_{l^\infty} &= h^2 \|\mathbf{A}^{-1} \mathbf{R}\|_{l^\infty} \\ &\leq h^2 \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{R}\|_{l^\infty} \end{aligned}$$

□

### 3 P164 1 五点差分格式问题

证明. (1)  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{S} & \mathbf{T} & & & \\ \mathbf{T} & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \mathbf{T} & \\ & & & \mathbf{T} & \mathbf{S} \end{pmatrix}$

其中,

$$\mathbf{T} = -h^2 \mathbf{I}$$

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} \frac{4}{h^2} & -\frac{1}{h} & & & \\ -\frac{1}{h} & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & -\frac{1}{h} & \\ & & & -\frac{1}{h} & \frac{4}{h^2} \end{pmatrix}$$

(2)

(3)

□