

Le bon jour, la bonne heure

Fruits sauvages, verger et potager en Île-de-France — quand cueillir et pourquoi

Fenêtres de récolte espèce par espèce, indicateurs objectifs de maturité, heure optimale dans la journée et gestes de cueillette, pour trente-trois fruits et légumes cultivés ou cueillis autour de la boucle de Montesson.



33

espèces détaillées

4

fenêtres horaires

1 h

écart qui coûte un jour

±25 %

de sucre selon le jour

Sommaire et mode d'emploi

Ce guide répond à trois questions pour chaque espèce : quelle période de l'année, quel jour précisément, et à quelle heure de la journée.

Ce que contient le document

CH.	TITRE	CONTENU
1	L'heure	Ce qui se passe dans la plante entre 5 h et 22 h, et pourquoi ça change tout
2	Le jour J	Fruits climactériques ou non, indicateurs objectifs, test amidon-iode, météo des 72 h
3	Chatou	Climat local, plaine de Montesson, calendrier général, droit de la cueillette
4	Les fruits	Framboise, mûre, prunes rouges, jaunes et sauvages, poire, pomme
5	Les sauvages	Ortie, et les règles de la cueillette sauvage
6	Les légumes	Laitue, cresson de fontaine, carotte, radis
7	Top 20	Les vingt fruits et légumes majeurs d'Île-de-France, en fiches condensées
8	Synthèses	Calendrier annuel complet, tables récapitulatives, checklist

Comment lire une fiche

La barre de saison

Douze cases, une par mois. La couleur pleine marque la **pleine saison**, la couleur pâle les périodes de début et de fin où la récolte est possible mais irrégulière. Ces dates valent pour la boucle de Seine : en altitude ou plus au nord, décaler de huit à quinze jours.

Le bloc horaire

Trois cases : la fenêtre optimale, la fenêtre acceptable, et l'horaire à éviter. Ce n'est pas une question de confort du cueilleur mais de physiologie : entre deux horaires, l'écart de conservation atteint couramment 48 heures et l'écart de sucre 15 %.

Le jour J

Chaque fiche donne des indicateurs **observables**, pas des dates de calendrier : couleur de fond, résistance au détachement, couleur des pépins, fermeté au pousse. Une date varie de trois semaines d'une année à l'autre ; un indicateur, jamais.

La fenêtre de tir

C'est le nombre de jours pendant lesquels la récolte reste optimale. Elle va de quatre jours pour le radis à plus de trois semaines pour la pomme de garde. Plus la fenêtre est courte, plus il faut passer souvent.

UNE CONVENTION POUR TOUT LE DOCUMENT

Les heures sont données en **heure légale française**, celle de la montre. En été, le soleil est au zénith à 13 h 50 à Chatou, pas à midi : le décalage de deux heures avec l'heure solaire explique pourquoi la fenêtre du matin s'étend plus tard qu'on ne l'imagine, et pourquoi 15 h est le pire moment de la journée et non 13 h.


1 L'heure de la journée

Une laitue coupée à 7 h et la même coupée à 15 h ne sont pas le même produit. Ce chapitre explique ce qui change dans la plante au fil des heures, et en déduit quatre fenêtres de récolte.

-
- 1.1 — La journée d'une plante, heure par heure
 - 1.2 — Les trois familles et leurs fenêtres
 - 1.3 — La chaleur de champ
 - 1.4 — La rosée : alliée des feuilles, ennemie des fruits
 - 1.5 — Le tableau maître

1.1 — La journée d’une plante, heure par heure

Quatre grandeurs évoluent en sens contraires au cours d’une journée d’été. Aucune heure ne les optimise toutes : il faut arbitrer, et l’arbitrage dépend de ce qu’on récolte.



Journée type de juillet à Chatou — les fenêtres de récolte optimales par famille

Allure des quatre paramètres déterminants sur une journée de juillet. Les barres du bas donnent les fenêtres qui en découlent.

Ce que fait chaque courbe

PARAMÈTRE	MINIMUM	MAXIMUM	CONSÉQUENCE À LA RÉCOLTE
Turgescence pression de l'eau dans les cellules	14–16 h	5–7 h	Une feuille turgescence est croquante et se conserve ; une feuille en déficit ne récupère jamais totalement, même réhydratée
Teneur en sucres °Brix	6–8 h	17–19 h	Un fruit cueilli en fin d'après-midi est mesurablement plus sucré que le même à l'aube : 1 à 2 points de Brix
Température de la pulpe	5–7 h	15–17 h	C'est le facteur n° 1 de la conservation. Chaque degré en plus double presque la vitesse de dégradation
Dureté du sol	6–9 h	15–17 h	Une carotte arrachée dans un sol sec casse ; dans un sol ressuyé du matin, elle vient entière

Le conflit central

Le sucre et la fraîcheur s'opposent frontalement. Le maximum de sucre tombe à 18 h, quand la plante a photosynthétisé toute la journée ; le minimum de température tombe à 6 h, quand la nuit a refroidi les tissus. On ne peut pas avoir les deux.

L'arbitrage se tranche par une question simple : **ce que je récolte, je le mange aujourd'hui ou je le garde ?**

Pour manger le jour même

Cueillir en fin d'après-midi, entre 17 h et 19 h. Le fruit est à son maximum de sucre et d'arômes, la conservation n'a pas d'importance puisqu'il sera consommé dans l'heure. C'est vrai pour les framboises, les mûres, les tomates, les fraises.

Pour garder, transformer ou transporter


Cueillir le matin. On perd un ou deux points de Brix, on gagne deux à quatre jours de conservation. Pour tout ce qui part en confiture, en congélation ou au réfrigérateur, la fraîcheur l'emporte largement sur le sucre.

L'ORDRE DE GRANDEUR QUI TRANCHE

Un écart de deux points de Brix est à peine perceptible en bouche pour un amateur. Un écart de deux jours de conservation, lui, fait la différence entre des framboises intactes le mercredi et une boîte de moisissure. **En cas de doute, cueillir le matin.**

1.2 — Les trois familles et leurs fenêtres

Tout le guide repose sur une classification simple. Ce qu'on récolte est soit une feuille, soit un fruit, soit un organe souterrain — et chacun impose sa fenêtre.



Les quatre cadrans de référence. Les fruits sont les seuls à disposer de deux fenêtres utilisables.

Famille 1 — Les feuilles

Laitue, cresson, épinard, ortie, mâche, chou, herbes aromatiques, blettes.

Ce sont les plus sensibles à l'heure, et de très loin. Une feuille n'a aucune réserve : elle est constituée à 92–95 % d'eau maintenue sous pression dans les vacuoles cellulaires. Dès que la transpiration dépasse l'absorption racinaire, cette pression tombe et la feuille se raménit. Le phénomène est **partiellement irréversible** : une salade déjà flasque au moment de la coupe ne retrouvera jamais son croquant, même plongée dans l'eau glacée.

5 h 30 – 8 h 30

FENÊTRE OPTIMALE

-25 %

DE TURGESCEANCE À 14 H

+48 h

DE CONSERVATION
GAGNÉES

95 %

D'EAU DANS UNE FEUILLE

Famille 2 — Les fruits

Framboise, mûre, prune, pomme, poire, tomate, courgette, haricot, fraise, cerise.

Un fruit est un organe de réserve : il tient sa pression par ses sucres autant que par son eau, il est donc bien plus tolérant qu'une feuille. En contrepartie, il craint deux choses que la feuille ignore : **l'humidité de surface**, qui déclenche les pourritures en moins de vingt-quatre heures, et **la meurtrissure**, invisible au moment du choc et visible deux jours plus tard.

D'où la fenêtre principale de 9 h 30 à 12 h : la rosée a séché, la pulpe n'est pas encore chaude. Et une fenêtre secondaire de 17 h à 20 h, réservée à ce qui sera mangé le jour même.

Famille 3 — Les racines et bulbes

Carotte, radis, betterave, navet, pomme de terre, oignon, poireau, panais.

Ici le facteur limitant n'est pas la plante mais **le sol**. Une racine arrachée dans une terre sèche et durcie casse, se blesse, et la blessure est une porte d'entrée pour les pourritures de conservation. Le sol est à son optimum de ressuyage entre 6 et 10 h, après la recharge nocturne en humidité.


Deux exceptions notables : **l'oignon et l'ail**, qu'il faut au contraire arracher par temps sec et chaud, en milieu de journée, pour que les tuniques extérieures sèchent immédiatement. Et **la pomme de terre**, qu'on sort par temps sec pour la laisser ressuyer deux heures au champ avant de la rentrer — mais jamais en plein soleil, qui la verdit.

LA PLAGE À ÉVITER POUR TOUT LE MONDE

11 h – 17 h en été. Le sol est dur, la pulpe est chaude, les feuilles sont en déficit hydrique, et la chaleur emmagasinée devra être évacuée avant tout stockage. C'est l'heure où l'on a envie d'aller au jardin, et c'est la pire.

1.3 — La chaleur de champ

C'est la notion la plus mal connue des jardiniers amateurs, et pourtant celle qui explique la plus grande part des écarts de conservation.



Une heure à 30 °C au champ coûte environ une journée de conservation

Perte de qualité selon l'heure de récolte et la rapidité de mise au froid. Les trois courbes partent du même point.

Le mécanisme

Un fruit ou un légume reste vivant après la récolte : il continue de respirer, c'est-à-dire de brûler ses propres sucres pour produire l'énergie de son métabolisme. Cette respiration consomme la marchandise. Sa vitesse suit une loi exponentielle avec la température :

TEMPÉRATURE DE LA PULPE	VITESSE DE RESPIRATION	DURÉE DE VIE RELATIVE	SITUATION TYPIQUE
2 °C	× 1	100 %	Réfrigérateur, bac à légumes
10 °C	× 2,5	40 %	Cellier frais, cave
18 °C	× 5	20 %	Cuisine, récolte du matin non rentrée
25 °C	× 9	11 %	Récolte de 14 h laissée à l'ombre
32 °C	× 16	6 %	Cageot au soleil vingt minutes

La règle empirique retenue en logistique du frais est parlante : **une heure passée à 30 °C au champ coûte environ une journée de durée de vie**. Un panier de framboises oublié une heure sur la terrasse a déjà perdu un tiers de sa conservation.

Le classement par sensibilité

SENSIBILITÉ	ESPÈCES	DÉLAI MAXIMAL AVANT MISE AU FRAIS
EXTRÊME	Framboise, mûre, fraise, épinard, ortie, cresson, herbes	30 minutes
FORTE	Laitue, radis, haricot vert, petit pois, courgette, cerise	1 à 2 heures
MOYENNE	Prune, tomate, carotte, betterave, poireau	3 à 4 heures
FAIBLE	Pomme, poire, courge, oignon, pomme de terre	Une demi-journée

Les gestes qui coupent la chaleur de champ

- 1 Ne jamais poser un contenant au soleil**

Même cinq minutes. Un cageot noir au soleil monte à 45 °C en un quart d'heure. Poser à l'ombre d'un arbre ou couvrir d'un linge clair, jamais d'un plastique qui fait serre.
- 2 Cueillir en petites quantités et rentrer souvent**

Deux allers-retours de vingt minutes valent mieux qu'une session de quarante minutes où la première moitié de la récolte chauffe pendant que l'on cueille la seconde.
- 3 Utiliser des contenants ajourés**

Cageot à claire-voie ou panier en osier, jamais un seau plastique fermé : la chaleur et l'éthylène s'y accumulent et accélèrent le mûrissement.
- 4 Le pré-refroidissement des feuilles**

Pour les salades, le cresson et les herbes : un bain de trois minutes dans l'eau froide dès la rentrée, puis essorage. On évacue la chaleur de champ et on restaure une partie de la turgescence. Ne jamais faire ça sur des fruits à peau fine.
- 5 Ne pas empiler**

Trois couches maximum pour les fruits fragiles. Au-delà, le poids écrase les fruits du fond, dont le jus libéré devient un milieu de culture parfait pour la moisissure grise.

1.4 — La rosée

La rosée est exactement ce qu'il faut aux feuilles et exactement ce qu'il ne faut pas aux fruits. C'est elle qui explique le décalage de trois heures entre les deux fenêtres.

Pourquoi elle est bonne pour les feuilles

Une feuille couverte de rosée est une feuille dont la transpiration est nulle : l'air à son contact est saturé en vapeur d'eau. Elle est donc au maximum absolu de sa turgescence. Couper à ce moment, c'est capturer cet état. La feuille garde ensuite un peu de cette avance pendant plusieurs jours.

C'est la raison pour laquelle les maraîchers de la plaine de Montesson coupent les salades avant le lever du jour : la totalité de la récolte destinée aux marchés du matin est faite entre 4 h et 7 h.

Pourquoi elle est mauvaise pour les fruits

Trois raisons qui se cumulent :

- **Les spores germent dans l'eau libre.** *Botrytis cinerea*, la moisissure grise, a besoin d'un film d'eau à la surface du fruit pour germer. Trois heures de feuille humide au-dessus de 15 °C suffisent. Un fruit cueilli mouillé et stocké mouillé est contaminé avant même d'arriver à la cuisine.
- **L'eau efface la pruine.** Sur les prunes et les raisins, la pruine est une couche de cire naturelle qui protège le fruit. Manipulée mouillée, elle part : le fruit perd sa barrière et se ride en deux jours.
- **Le fruit gorgé d'eau est fade.** À l'aube, le fruit a repris de l'eau toute la nuit : ses sucres sont dilués. C'est mesurable, un à deux points de Brix en moins qu'en milieu de journée.

À quelle heure la rosée disparaît-elle ?

SAISON	LEVER DU SOLEIL	ROSÉE SÈCHE VERS	CONSÉQUENCE
Mai – juin, ciel clair	6 h 00	8 h 30 – 9 h 30	Fenêtre fruits dès 9 h 30
Juillet – août, ciel clair	6 h 30	9 h 00 – 10 h 00	Fenêtre fruits de 9 h 30 à 12 h
Septembre, ciel clair	7 h 15	10 h 00 – 11 h 00	Fenêtre resserrée, 11 h à 13 h
Octobre – novembre	8 h 00	11 h 00 – 12 h 30	La fenêtre bascule l'après-midi
Temps couvert, sans vent	—	Parfois jamais	Reporter la récolte des fruits fragiles au lendemain

LE TEST DU DOS DE LA MAIN

Passer le dos de la main sur le feuillage à hauteur de fruit. S'il ressort humide, il est trop tôt pour les fruits — mais c'est exactement le bon moment pour les salades, qui sont à deux mètres de là. La même matinée permet donc de faire les deux, dans le bon ordre : **feuilles d'abord, fruits ensuite.**

LE CAS DE L'AUTOMNE

À partir de fin septembre, la rosée peut persister jusqu'à midi et la nuit devient froide. L'ordre s'inverse alors : on récolte les fruits **l'après-midi**, entre 13 h et 16 h, quand ils sont secs et que la température reste modérée. C'est particulièrement vrai pour les prunelles et les dernières pommes.

1.5 — Le tableau maître

Toutes les espèces du guide, classées par fenêtre horaire. C'est la page à retenir si l'on ne devait en retenir qu'une.

FENÊTRE	ESPÈCES	RAISON PHYSIOLOGIQUE
5 h 30 – 8 h 30 FEUILLES	Laitue, cresson, épinard, ortie, mâche, roquette, blette, herbes aromatiques, chou	Turgescence maximale, rosée encore présente, pulpe froide. La perte est irréversible après 10 h.
5 h 30 – 10 h RACINES	Carotte, radis, betterave, navet, panais, poireau	Sol ressuyé par la nuit : la racine vient entière sans casser. Les fanes sont encore fermes.
9 h 30 – 12 h FRUITS	Framboise, mûre, prune, cerise, groseille, tomate, courgette, haricot, fraise	Rosée évaporée mais pulpe encore fraîche. C'est le compromis, pas un optimum.
6 h – 11 h FRUITS À PÉPINS	Pomme, poire, coing	Peu sensibles à l'humidité de surface mais très sensibles à la meurtrissure : une chair fraîche est plus ferme et marque moins.
17 h – 20 h FRUITS, 2 ^E OPTION	Framboise, mûre, tomate, fraise — uniquement pour consommation le jour même	Maximum de sucres et d'arômes. Aucune conservation possible : la pulpe est chaude.
11 h – 16 h EXCEPTIONS	Oignon, ail, échalote, pruneau après gelée, pomme de terre de conservation	On cherche ici la sécheresse de l'air, pas la fraîcheur : les tuniques doivent ressuyer, les fruits givrés doivent avoir dégelé.
11 h – 17 h INTERDIT	Tout le reste	Pulpe chaude, sol dur, feuillage en déficit hydrique. La récolte de 15 h coûte deux à trois jours de conservation.

Le décalage saisonnier

Ces horaires valent pour juin à août. Il faut les décaler au fil de l'année, en suivant le lever du soleil plutôt que la montre :

PÉRIODE	FEUILLES	FRUITS	RACINES
Mars – avril	7 h – 10 h	11 h – 14 h	8 h – 12 h
Mai – août	5 h 30 – 8 h 30	9 h 30 – 12 h	5 h 30 – 10 h
Septembre – octobre	7 h – 10 h	11 h – 15 h	8 h – 12 h
Novembre – février	10 h – 14 h	12 h – 15 h	11 h – 15 h

LA RÈGLE DE L'HIVER

En hiver, tout s'inverse : on ne récolte **jamais un végétal gelé**. Les cristaux de glace dans les cellules éclatent les parois au moindre contact, et le légume devient une bouillie en dégelant. Attendre que la température soit repassée au-dessus de zéro depuis au moins deux heures, ce qui repète souvent la récolte à la mi-journée. Cela vaut pour la mâche, le poireau, le chou et les dernières carottes.

2


Trouver le jour J

Une date de calendrier est une moyenne ; elle se trompe de trois semaines une année sur trois. Ce chapitre remplace le calendrier par des indicateurs observables sur le fruit lui-même.

-
- 2.1 — Climactérique ou non : la question qui change tout
 - 2.2 — Les six indicateurs objectifs
 - 2.3 — Le test amidon-iode
 - 2.4 — La météo des 72 heures
 - 2.5 — Le calendrier lunaire : ce que disent les essais

2.1 — Climactérique ou non

C'est la distinction fondamentale de la physiologie post-récolte, et elle décide de la stratégie entière : pour certaines espèces on cueille ferme et on attend, pour d'autres il n'y a qu'un seul jour possible.



Évolution de la qualité après la cueillette. À gauche, un fruit climactérique ; à droite, un fruit non climactérique.

Les fruits climactériques

Ils déclenchent, une fois détachés, une brusque bouffée de production d'éthylène appelée **crise climactérique**. Cette hormone gazeuse déclenche en cascade la conversion de l'amidon en sucres, le ramollissement des parois et la synthèse des arômes. Le fruit mûrit donc après la récolte, et parfois mieux qu'il ne l'aurait fait sur l'arbre.

ESPÈCE	ÉTAT À LA CUEILLETTE	MÛRISSEMENT ENSUITE	REMARQUE
Poire	Ferme, encore verte	5 à 12 jours à 18 °C	La seule qu'il ne faut surtout pas laisser mûrir sur l'arbre : chair granuleuse et cœur blet garantis
Pomme	Ferme, couleur de fond virée	Selon variété, 0 à 6 mois	Les variétés de garde s'améliorent nettement après deux à six semaines
Prune	Ferme mais couleur de fond virée	2 à 5 jours	Le sucre n'augmente plus après cueillette : seule la texture évolue
Tomate	Tournante ou rouge	3 à 7 jours	Ne jamais mettre au réfrigérateur avant maturité complète
Coing, kiwi, banane, avocat	Ferme	Variable	Le kiwi et le coing ne sont comestibles qu'après bletissement

UNE NUANCE QUI COMPTE POUR LA PRUNE

La prune ramollit après cueillette, ce qui donne l'impression qu'elle mûrit. En réalité **sa teneur en sucre est figée au moment où on la détache** : une prune cueillie trop tôt deviendra molle mais restera acide toute sa vie. C'est vrai aussi de la cerise, du raisin et de l'abricot. D'où l'importance du jour J pour cette famille.

Les fruits non climactériques

Ils n'ont pas de crise éthylinique. Dès qu'ils sont détachés, leur qualité ne fait plus que décroître : pas de sucre supplémentaire, pas d'arômes supplémentaires, rien. Ce qu'on cueille est exactement ce qu'on mangera, en moins bien.

ESPÈCE	CONSÉQUENCE PRATIQUE	FENÊTRE DE TIR
Framboise, mûre	Cueillir à parfaite maturité, jamais avant. Un fruit pâle restera acide.	1 à 2 jours
Fraise	Même règle : le blanc autour du pédoncule ne rougira jamais	1 à 2 jours
Cerise, groseille, cassis	Attendre la couleur pleine et la légère souplesse	3 à 6 jours
Raisin	Le goût est le seul juge : goûter un grain du bas de la grappe	5 à 10 jours
Agrumes, ananas, concombre, courgette	Idem : aucune amélioration après récolte	Variable
Tous les légumes-feuilles et racines	Ce ne sont pas des fruits : ils se dégradent dès la coupe	—

La conséquence stratégique

Climactériques : récolter en une fois

On peut ramasser tout l'arbre en une ou deux passes, quitte à ce que certains fruits soient un peu fermes : ils finiront de mûrir au cellier. C'est ce qui permet de gérer un pommier de cinquante kilos en un seul après-midi.

Non climactériques : passer souvent

Il faut repasser tous les deux jours, parfois tous les jours par forte chaleur, et ne prendre que les fruits à point. Une ronce ou un rang de framboisiers demande huit à douze passages dans la saison.

2.2 — Les six indicateurs objectifs

Aucun ne suffit seul. Il en faut deux ou trois concordants pour déclencher la récolte ; c'est la méthode utilisée en arboriculture professionnelle.

1 La couleur de fond, jamais la couleur de couverture

Sur une pomme ou une prune, le rouge est la *couleur de couverture* : elle dépend de l'ensoleillement de la face du fruit et ne dit rien de la maturité. Ce qu'il faut lire, c'est la *couleur de fond*, visible du côté ombré ou près du pédoncule : elle passe du vert franc au vert pâle puis au jaune. C'est l'indicateur le plus fiable et le plus souvent ignoré.

2 La couleur des pépins

Ouvrir un fruit témoin. Des pépins blancs ou beiges signifient qu'il est trop tôt ; des pépins brun foncé uniformes signifient que la maturité physiologique est atteinte. Valable pour la pomme, la poire et le coing.

3 La résistance au détachement

Le fruit mûr forme une zone d'abscission à la base du pédoncule. Il doit se détacher par un simple soulèvement, sans tirer. Si l'on doit forcer, il est trop tôt ; si les fruits tombent seuls en nombre, il est trop tard.

4 La fermeté au pouce

Presser délicatement près du pédoncule, avec la pulpe du pouce et non l'ongle. Le fruit doit céder très légèrement. Cette zone est la première à ramollir : elle donne quatre à cinq jours d'avance sur le reste du fruit.

5 Le premier fruit sain tombé au sol

Sur un arbre, la chute de quelques fruits **intacts** — sans trou de ver ni tâche — annonce l'ouverture de la fenêtre de récolte. Les chutes précoces de fruits véreux, elles, n'indiquent rien du tout.

6 Le goût

Le seul juge final. Un fruit qui est visuellement mûr mais acide ou astringent n'est pas mûr. Goûter un fruit sur le bas de l'arbre et un sur le haut : les fruits exposés au soleil mûrissent cinq à huit jours avant ceux de l'intérieur.

Combien d'indicateurs faut-il ?

INDICATEURS CONCORDANTS	DÉCISION
0 ou 1	ATTENDRE Revenir dans cinq à sept jours
2	PREMIÈRE PASSE Récolter uniquement les fruits les mieux exposés
3 ou plus	RÉCOLTE Ouvrir la fenêtre principale
Fruits qui tombent en nombre	TROP TARD Récolter immédiatement, destiner à la transformation

Le réfractomètre, pour aller plus loin

Un réfractomètre à main coûte 12 à 25 € et mesure directement la teneur en sucres du jus, exprimée en degrés Brix. C'est l'outil qui transforme une impression en donnée. Une goutte de jus sur le prisme suffit.

ESPÈCE	BRIX INSUFFISANT	BRIX CORRECT	BRIX EXCELLENT
Framboise	< 8	9-11	> 12
Mûre	< 8	9-12	> 13
Prune rouge	< 12	14-17	> 18
Mirabelle	< 15	17-20 > 22	
Poire	< 10	12-14	> 15
Pomme	< 10	12-14	> 15
Tomate	< 4	4,5-6	> 6,5
Carotte	< 6	7-9	> 10

La mirabelle est, avec la figue, l'un des fruits les plus sucrés produits sous climat tempéré français : elle dépasse couramment 20 °Brix, soit deux fois une tomate et davantage qu'une pomme.

2.3 — Le test amidon-iode

C'est la méthode de référence en arboriculture pour déterminer la date de cueillette des pommes et des poires. Elle coûte trois euros et se fait en trente secondes.



Coupe équatoriale d'une pomme après application de lugol. La zone noire est l'amidon non encore converti ; elle recule du bord vers le cœur au fil de la maturation.

Le principe

Pendant sa croissance, le fruit stocke ses réserves sous forme d'**amidon**. À l'approche de la maturité, une enzyme convertit progressivement cet amidon en sucres solubles, en commençant par la périphérie et en progressant vers le cœur. L'iode colore l'amidon en bleu-noir intense et ne colore pas les sucres : la surface noire restante donne donc une lecture directe de l'avancement.

Le mode opératoire

1

Se procurer du lugol

Solution d'iode iodo-iodurée, disponible en pharmacie sans ordonnance pour quelques euros. À défaut, une solution de teinture d'iode diluée de moitié fonctionne, avec un contraste moins net.

2

Prélever cinq fruits représentatifs

Un à l'extérieur sud, un à l'extérieur nord, un à l'intérieur, un en hauteur, un en bas. Un seul fruit ne dit rien : l'écart entre le fruit le plus exposé et le plus ombré atteint trois points d'indice.

3

Couper à l'équateur

Trancher perpendiculairement à l'axe pédoncule-œil, en plein milieu. La coupe doit être nette, faite d'un seul geste.

4

Appliquer et attendre une minute

Tremper la demi-pomme face coupée vers le bas dans une soucoupe de lugol, ou pulvériser. Laisser développer une minute à l'ombre : la coloration s'intensifie encore pendant trente secondes.

5

Lire l'indice de 1 à 10

1 : toute la chair est noire. 10 : plus aucune trace. Comparer aux quatre schémas de la page. Faire la moyenne des cinq fruits.

Comment interpréter

INDICE MOYEN	SIGNIFICATION	DESTINATION	CONSERVATION ATTENDUE
1-3	Amidon partout, fruit immature	NE PAS RÉCOLTER	—
4-5	Conversion amorcée en périphérie	Pommes de longue garde : Boskoop, Reinette grise, Braeburn	4 à 7 mois
6-7	Il ne reste de l'amidon qu'autour du cœur	Optimum pour la consommation courante et le jus	2 à 4 mois
8-9	Conversion quasi terminée	Consommation immédiate, compote	3 à 6 semaines
10	Plus d'amidon, fruit surmaturé	TROP TARD Jus, compote, cidre	Quelques jours

LE RÉFLEXE QUI FAIT GAGNER DEUX MOIS DE GARDE


Beaucoup de jardiniers cueillent leurs pommes de garde à l'indice 8, parce qu'elles sont alors déjà bonnes à croquer sur l'arbre. En les récoltant à l'indice **4 ou 5**, on perd un peu de goût immédiat et on gagne **deux à trois mois de conservation**. Une Boskoop cueillie à l'indice 4 mi-octobre se mange encore parfaitement en mars.

CAS PARTICULIER DE LA POIRE

Le test fonctionne aussi, mais la poire se récolte plus tôt dans l'échelle : indice **3 à 5** selon la variété. Une poire laissée jusqu'à l'indice 7 sur l'arbre développe presque toujours un cœur blet — un brunissement interne invisible de l'extérieur qu'on ne découvre qu'en coupant.

2.4 — La météo des 72 heures

À maturité égale, le même fruit cueilli deux jours plus tard peut avoir 25 % de sucre en plus. Ce n'est pas la maturation qui change, c'est la dilution.



Effet du délai depuis la dernière pluie sur la concentration en sucres. L'effet est purement dilutif et parfaitement réversible.

Le mécanisme de la dilution

Après une pluie, les racines absorbent massivement et le fruit se gorge d'eau. Sa masse augmente de 5 à 15 % en vingt-quatre heures, mais sa quantité de sucre reste identique : la concentration chute donc mécaniquement. Trois jours de temps sec suffisent à rétablir l'équilibre par transpiration.

CONDITIONS DES 72 DERNIÈRES HEURES	EFFET SUR LE BRIX	VERDICT
Pluie dans les 12 dernières heures	-15 à -25 %	REPORTER
Pluie il y a 24 à 48 h	-8 à -15 %	ATTENDRE
Trois jours secs et ensoleillés	Référence	JOUR J
Cinq à huit jours secs, nuits fraîches	+5 à +12 %	EXCELLENT
Sécheresse prolongée, plus de dix jours	+10 % mais calibre réduit	CORRECT
Orage violent après sécheresse	-20 % + éclatement	RÉCOLTER EN URGENCE

L'effet des nuits fraîches

Un paramètre souvent oublié : l'**amplitude thermique jour-nuit**. La plante fabrique ses sucres le jour et en consomme une partie la nuit pour sa respiration. Plus la nuit est fraîche, moins elle en consomme, et plus le solde net est élevé.

Une séquence de trois journées à 26 °C suivies de nuits à 12 °C produit des fruits nettement plus sucrés que trois journées à 30 °C suivies de nuits à 22 °C. C'est ce qui explique la qualité des fruits de fin août et de septembre, quand les nuits se rafraîchissent alors que les journées restent chaudes.

3 j

DE TEMPS SEC AVANT
RÉCOLTE

-25 %

DE SUCRE APRÈS UNE PLUIE

>12 °C

D'AMPLITUDE, L'IDÉAL

+12 %

APRÈS UNE SEMAINE SÈCHE

L'EXCEPTION DE L'ORAGE

Un orage violent après une période sèche provoque un afflux d'eau brutal que la peau ne peut pas suivre : le fruit **éclate**. Cerises, prunes, tomates et raisins sont particulièrement concernés. Si un orage est annoncé et que les fruits sont à deux jours de la maturité, il vaut mieux les récolter la veille, un peu fermes, que de les retrouver fendus le lendemain.

2.5 — Le calendrier lunaire

Il est trop présent dans la littérature de jardinage pour être passé sous silence. Voici ce qu'il propose, et ce que les essais contrôlés en montrent.

Ce que dit le système

Le calendrier bio-dynamique, formalisé par Maria Thun dans les années 1950, divise le mois sidéral en quatre types de jours selon la constellation devant laquelle passe la Lune :

TYPE DE JOUR	ÉLÉMENT ASSOCIÉ	RECOMMANDATION
Jours fruits	Feu	Récolter fruits et graines ; meilleure conservation annoncée
Jours fleurs	Air	Récolter fleurs, brocolis, artichauts
Jours feuilles	Eau	Récolter salades et légumes-feuilles
Jours racines	Terre	Récolter et stocker carottes, pommes de terre, betteraves

S'y ajoute la distinction lune montante et descendante, et les nœuds lunaires considérés comme défavorables.

Ce que montrent les essais contrôlés

Il faut être direct : **les essais en aveugle et répliqués n'ont pas mis en évidence d'effet reproductible** du calendrier lunaire sur la germination, le rendement ou la conservation. Les travaux qui rapportent un effet sont généralement non répliqués, sans insu, ou ne contrôlent pas les variables météorologiques — or les phases lunaires sont corrélées à la couverture nuageuse et à l'humidité, ce qui suffit à créer des associations trompeuses.

Deux mécanismes physiques sont parfois invoqués :

- **L'attraction gravitationnelle sur la sève.** L'effet de marée de la Lune sur un volume aussi petit qu'une plante est inférieur de plusieurs ordres de grandeur à celui d'une légère brise ou du simple passage d'un camion sur la route voisine.
- **La lumière lunaire.** Elle est réelle et mesurable : la pleine Lune fournit environ 0,1 à 0,3 lux, contre 100 000 lux en plein soleil. Certains effets photopériodiques fins existent chez quelques espèces, mais rien qui concerne le moment de la récolte.

UNE LECTURE HONNÊTE DE SON UTILITÉ

Le calendrier lunaire a un mérite réel qui n'a rien d'astronomique : **il impose une régularité**. Quelqu'un qui suit un calendrier passe au jardin trois fois par semaine à dates fixes, observe ses cultures, et récolte au bon moment parce qu'il est là. C'est probablement la principale explication des résultats rapportés par ses praticiens. Si le système vous fait sortir régulièrement, il rend service — simplement pas pour la raison qu'il avance.

Ce qu'il vaut mieux suivre à la place

VARIABLE	EFFET MESURÉ SUR LA RÉCOLTE	COÛT DE SUIVI
Jours secs depuis la dernière pluie	±25 % de sucre	Gratuit, un coup d'œil au ciel
Heure de la journée	±48 h de conservation	Gratuit, une montre
Indice amidon-iodé	±2 à 3 mois de garde	3 € de lugol
Amplitude thermique des nuits	±10 % de sucre	Un thermomètre mini-maxi à 10 €
Degrés Brix mesurés	Objectivation directe	12 à 25 € de réfractomètre
Phase de la Lune	Non démontré	Gratuit

3

Chatou et la boucle de Seine

Un climat, des sols et une histoire maraîchère qui décalent les dates de huit à quinze jours par rapport aux moyennes nationales, presque toujours en avance.

-
- 3.1 — Le climat local et les dates repères
 - 3.2 — La plaine de Montesson
 - 3.3 — Le calendrier général
 - 3.4 — Où cueillir, et ce que dit le droit

3.1 — Le climat local et les dates repères

Chatou bénéficie d'une conjonction favorable : l'îlot de chaleur urbain parisien, la masse thermique de la Seine et des sols sableux qui se réchauffent vite.

Les trois avantages de la boucle

L'îlot de chaleur

La proximité de l'agglomération parisienne relève les températures nocturnes de 1,5 à 3 °C par rapport à la campagne environnante. Cela avance les floraisons de cinq à dix jours et retarde les premières gelées d'autant.

L'inertie de la Seine

Le fleuve entoure la boucle sur trois côtés. Sa masse d'eau amortit les extrêmes : moins de gelées tardives au printemps, ce qui protège les floraisons de pruniers et de poiriers, les plus vulnérables de toutes.

Les sols sableux alluviaux

Les alluvions de la Seine ont donné des sols légers, filtrants, qui se réchauffent deux à trois semaines avant une terre argileuse. C'est la raison historique de l'implantation maraîchère dans la boucle. Contrepartie : ils sèchent très vite en été.

Le revers : les cuvettes

Les points bas près du fleuve accumulent l'air froid les nuits claires de printemps. Un verger en fond de cuvette peut geler alors qu'un verger à deux cents mètres, sur le cotéau, est épargné.

Les dates repères de l'année

REPÈRE	DATE MOYENNE	AMPLITUDE	CE QUE ÇA DÉCLENCHÉ
Floraison du prunellier	10 mars	± 15 j	Première floraison de l'année, avant les feuilles
Premières pousses d'ortie exploitables	20 mars	± 12 j	Ouverture de la saison de cueillette sauvage
Floraison des pruniers	1 ^{er} avril	± 12 j	Période la plus exposée aux gelées
Floraison des poiriers	8 avril	± 10 j	—
Floraison des pommiers	18 avril	± 10 j	Compter 140 à 165 jours jusqu'à la récolte
Dernière gelée printanière	15 avril	± 20 j	Les saints de glace, 11 au 13 mai, restent la sécurité pour les gels
Solstice	21 juin	—	Bascule photopériodique : montaison des salades et radis
Premières framboises remontantes	25 août	± 10 j	—
Première gelée automnale	8 novembre	± 18 j	Déclenche la récolte des prunelles et sucre les carottes
Fin de la saison de plein champ	30 novembre	—	Ne restent que mâche, poireau, chou, cresson

La règle des jours-degrés

Pour anticiper une récolte plutôt que de la subir, la méthode la plus fiable est le cumul de températures depuis la floraison. Chaque espèce a besoin d'un cumul à peu près constant d'une année sur l'autre :

ESPÈCE	JOURS DE LA FLORAISON À LA RÉCOLTE	CUMUL THERMIQUE
Cerise	60 à 75	~750 °C·j
Prune rouge	105 à 125	~1 350 °C·j
Mirabelle	125 à 140	~1 550 °C·j
Poire Williams	115 à 130	~1 450 °C·j
Poire Conférence	145 à 160	~1 800 °C·j
Pomme Reine des Reinettes	125 à 140	~1 600 °C·j
Pomme Boskoop	165 à 180	~2 000 °C·j

En pratique : noter la date de pleine floraison de chaque arbre dans un carnet, ajouter le nombre de jours du tableau, et commencer les contrôles de maturité une semaine avant la date obtenue. Cette méthode se trompe rarement de plus de cinq jours, contre trois semaines pour un calendrier fixe.

3.2 — La plaine de Montesson

À deux kilomètres de Chatou se trouve l'une des dernières grandes zones maraîchères d'Île-de-France, et c'est un point de repère utile pour caler ses propres dates.

Ce qu'est la plaine

Environ **350 hectares** de terres agricoles enclavés dans un méandre de la Seine, répartis sur Montesson, Carrières-sur-Seine et Sartrouville, à une quinzaine de kilomètres de Paris. C'est un vestige des vastes ceintures maraîchères qui alimentaient la capitale au XIX^e siècle, protégé aujourd'hui par un classement en zone agricole.

Sa spécialité est franche : **la salade à grande échelle**, en plein champ ou sous tunnel selon la saison et la parcelle. Les sols sableux hérités des alluvions de la Seine sont exactement ce qu'il faut à une culture qui demande un ressuyage rapide et un réchauffement précoce. Une grande partie de la production part en circuit court, jusque dans les cantines des collèges des Yvelines.

350 ha

DE TERRES AGRICOLES

3

COMMUNES CONCERNÉES

15 km

DU CENTRE DE PARIS

2 km

DE CHATOU

Pourquoi c'est utile à connaître

- **C'est un indicateur phénologique gratuit.** Quand les maraîchers récoltent une culture en plein champ, c'est que la fenêtre est ouverte pour la même culture au jardin. Un tour de la plaine à vélo par le chemin de halage renseigne mieux qu'un calendrier.
- **Les horaires de coupe sont visibles.** La récolte des salades destinées aux marchés du matin se fait avant le lever du jour, entre 4 et 7 h. C'est la démonstration grandeur nature de la règle exposée au chapitre 1.
- **La vente directe existe.** Plusieurs exploitations écoulent en circuit court : acheter une salade coupée le matin même à deux kilomètres n'a rien à voir avec une salade de grande surface, coupée trois jours avant et transportée.
- **Les lisières sont riches en sauvages.** Les bordures de parcelles, les chemins et les friches de la plaine portent ronces, sureaux, prunelliers et myrobolans.

UNE PRÉCISION QUI ÉVITE UN ALLER-RETOUR INUTILE

La plaine de Montesson produit de la **salade**, pas du cresson. Le cresson de fontaine d'Île-de-France se cultive dans le sud de l'Essonne, principalement autour de Méréville, dans les vallées de la Juine, de l'École et de la Chalouette, là où sourdent des eaux de source à température constante. Cela demande une géologie que la boucle de Seine n'a pas. Le sujet est traité en détail au chapitre 6.


Les cueillettes en libre-service accessibles depuis Chatou

LIEU	DISTANCE	SAISON	CE QU'ON Y TROUVE
Cueillette de Gally Bailly (78)	~18 km	Avril à novembre	Une soixantaine d'hectares, une cinquantaine de variétés : fraises au printemps, légumes d'été, pommes et courges à l'automne
Cueillette de Viltain Jouy-en-Josas (78)	~25 km	Avril à mi-novembre	Environ cinquante hectares sur le plateau de Saclay, fruits, légumes et fleurs, plus une production laitière
Ferme du Logis Jumeauville (78)	~35 km	Saison	Cueillette de fruits et légumes, boutique fermière, confitures et volailles

Ces exploitations font partie du réseau Chapeau de Paille et publient généralement leur calendrier de cueillette chaque semaine : il vaut mieux le consulter avant de se déplacer, car une espèce peut fermer du jour au lendemain quand la parcelle est épuisée.

3.3 — Le calendrier général

Les treize espèces principales du guide sur une seule vue. Les dates sont calées sur la boucle de Seine.



Fenêtres de récolte à Chatou. Les teintes pâles correspondent aux débuts et fins de saison, irréguliers selon les années.

Lecture par saison

PÉRIODE	CE QUI EST PRÊT	CE QU'ON PRÉPARE
Mars - avril	Ortie jeunes pousses, cresson (fin de saison), radis de printemps, premières salades sous abri	Semis de carottes, plantation des salades
Mai - juin	Radis, laitue, premières framboises non remontantes, fraises	Éclaircissage des fruitiers, protection des framboisiers
Juillet - août	Prunes rouges et sauvages, mirabelles, mûres, premières poires, carottes, laitue d'été	Semis de radis d'automne, semis de cresson en cressonnière
Septembre - octobre	Pommes, poires, mûres tardives, framboises remontantes, carottes de conservation, ortie de repousse	Rentrer les fruits de garde, semer la mâche
Novembre - décembre	Prunelles après gelée, dernières pommes de garde, cresson en pleine saison, carottes sucrées par le froid	Rien : c'est la période de repos
Janvier - février	Cresson (optimum gustatif), mâche, poireau, carottes conservées en terre	Taille des fruitiers à pépins

Le mois d'août, en détail

C'est le mois le plus dense de l'année, celui où plusieurs fenêtres courtes se superposent. Un ordre de priorité est utile :

PRIORITÉ	ESPÈCE	FENÊTRE	POURQUOI CETTE PRIORITÉ
1	Mirabelle	8 à 12 jours	Fenêtre la plus courte de l'année et fruit qui tombe seul : ratée, elle est perdue pour douze mois
2	Framboise remontante	Passage tous les 2 jours	Non climactérique et très périssable
3	Mûre	Passage tous les 3 jours	Idem, mais un peu plus tolérante
4	Prune rouge	2 à 3 passages	Climactérique : on peut cueillir un peu ferme
5	Poire Williams	5 à 8 jours	Se cueille ferme et mûrit au cellier
6	Carotte, laitue, radis d'automne	Continu	Fenêtres larges, aucune urgence

LA RÈGLE DES FENÊTRES COURTES

Quand deux récoltes se présentent le même jour, **faire d'abord celle dont la fenêtre est la plus courte**. Une pomme attend trois semaines ; une mirabelle attend trois jours. C'est la seule règle de priorité dont on ait vraiment besoin en août.

3.4 — Où cueillir, et ce que dit le droit

La cueillette de fruits sauvages est encadrée. Les règles sont simples mais souvent méconnues, et certaines protections locales s'y ajoutent.

Les principes généraux

SITUATION	AUTORISÉ ?	CONDITIONS
Terrain privé, avec accord du propriétaire	OUI	Aucune restriction autre que celles posées par le propriétaire
Terrain privé, sans accord	NON	Les fruits appartiennent au propriétaire du sol, même tombés, même sur un terrain non clos
Branche débordant sur la voie publique	NON	Les fruits restent la propriété du propriétaire de l'arbre ; seuls les fruits tombés naturellement sur votre propre terrain vous reviennent
Forêt domaniale	TOLÉRÉ	Cueillette familiale tolérée dans une limite généralement fixée à 5 litres par personne et par jour. Vérifier l'affichage à l'entrée : certaines forêts interdisent totalement
Forêt communale ou départementale	VARIABLE	Dépend de l'arrêté municipal ou du règlement du site
Espace naturel sensible, réserve	SOUVENT NON	Cueillette généralement interdite. Se renseigner avant
Bord de route, talus, délaissé	JURIDIQUEMENT FLOU	Souvent domaine public routier. Mais le vrai problème est sanitaire, pas juridique : voir ci-dessous

Les lieux à éviter pour raison sanitaire

Les bords de route

Reculer d'au moins **cinq mètres** d'une route fréquentée, davantage sur un axe rapide. Les particules issues de l'usure des freins et des pneus — cuivre, zinc, antimoine — se déposent sur les fruits et ne partent pas au lavage sur une surface veloutée comme celle d'une framboise. Les mûres de talus d'autoroute sont à oublier.

Les lisières de parcelles cultivées

La dérive de pulvérisation porte sur cinq à vingt mètres selon le vent et le matériel. Une ronce en bordure immédiate d'une parcelle conventionnelle reçoit une fraction des traitements. Préférer les lisières de bois et les friches.

Les prairies humides pâturées

C'est le point le plus sérieux du guide, traité en détail au chapitre 6 : toute plante récoltée dans ou près d'une eau traversée par un pâturage peut porter des kystes de douve du foie. Cela concerne le cresson au premier chef, mais aussi le pissenlit et la mâche sauvage de ces milieux.

Les friches industrielles et anciens jardins ouvriers

Sols potentiellement chargés en plomb et en hydrocarbures. La boucle de Seine a connu des sablières et diverses activités : dans le doute sur un terrain inconnu, s'abstenir pour les légumes-feuilles et racines, qui accumulent bien plus que les fruits.

Les règles de la cueillette durable

1 Ne jamais prendre plus du tiers d'une station

Les fruits sauvages sont la ressource alimentaire de tout un cortège d'oiseaux et de mammifères à l'entrée de l'hiver. Les prunelles et les églantines, en particulier, sont consommées en novembre et décembre quand il ne reste plus grand-chose d'autre.

2 Ne jamais arracher un pied entier

Pour l'ortie et les plantes à feuilles, couper au-dessus du collet et laisser la souche. Une ortie coupée repousse en trois semaines ; une ortie arrachée ne revient pas.

3 Identifier avec certitude, sans exception

Le doute n'est jamais permis. La règle absolue : si l'on n'est pas certain à cent pour cent de l'espèce, on ne cueille pas et on ne goûte pas. Une photo et une vérification à la maison coûtent moins cher qu'une intoxication.

4 Ne jamais consommer les noyaux

Tous les *Prunus* — prunes, prunelles, mirabelles, cerises, abricots — contiennent de l'amygdaline dans leur amande, qui libère du cyanure à la digestion. Une amande avalée par accident est sans conséquence ; en consommer délibérément ne l'est pas. Ne jamais broyer les noyaux dans une confiture.

5 Laisser le lieu comme on l'a trouvé

Ne pas casser les branches pour atteindre les fruits hauts, ne pas piétiner les stations voisines, refermer les clôtures. Une station respectée produira encore dans dix ans.

4

Les fruits

Sept fiches détaillées, du plus fragile au plus tolérant. Pour chacune : la fenêtre de l'année, les indicateurs du jour J, l'heure optimale et sa justification, le geste de cueillette et la conservation.

-
- 4.1 — Framboise
 - 4.2 — Mûre sauvage
 - 4.3 — Prune rouge
 - 4.4 — Prune jaune et mirabelle
 - 4.5 — Prunes sauvages et prunelles
 - 4.6 — Poire
 - 4.7 — Pomme




Framboise

Rubus idaeus

NON CLIMACTÉRIQUE • TRÈS PÉRISSABLE

FENÊTRE DE TIR

1 à 2 jours



Deux types coexistent et il faut savoir lequel on a, car les dates diffèrent de deux mois. Les **non remontantes** fructifient sur le bois de l'année précédente et donnent de mi-juin à mi-juillet. Les **remontantes** donnent sur les pousses de l'année, de fin août jusqu'aux premières gelées, avec une petite production estivale en prime. À Chatou, la seconde vague est de loin la plus intéressante : les nuits fraîches de septembre donnent des fruits nettement plus sucrés.

MEILLEURE HEURE

9 h 30 – 11 h 30

Rosée évaporée, pulpe encore fraîche
— pour conserver

ACCEPTABLE

17 h – 19 h

Maximum de sucre — à manger le jour même

À ÉVITER

12 h – 17 h

Pulpe à 28 °C, le fruit s'écrase entre les doigts

Le jour J

INDICATEUR	TROP TÔT	À POINT	TROP TARD
Détachement du réceptacle	Il faut tirer	Le fruit vient seul dans la main, le cœur blanc reste sur la plante	Le fruit tombe au moindre contact
Aspect de la surface	Brillante	Mate, veloutée	Terne, un peu fripée
Couleur	Rouge clair, pointes pâles	Rouge profond uniforme	Rouge sombre, presque violacé
Fermeté	Dure	Cède très légèrement	Molle, jus qui perle
Brix	< 8		> 13 mais texture perdue

L'INDICATEUR UNIQUE À RETENIR

Le réceptacle blanc — ce petit cœur conique — doit rester sur la plante. C'est ce qui donne à la framboise sa forme de dé. Si le cœur part avec le fruit, il n'est pas mûr : on a arraché au lieu de cueillir. Ce seul critère suffit et ne trompe jamais.

4.1 (suite) — Framboise : geste et conservation

Pourquoi cette heure précisément

La framboise est le fruit le plus exigeant du guide, pour trois raisons cumulatives :

- **Elle est creuse.** Contrairement à la mûre, elle se détache de son réceptacle et devient un dé de vingt drupéoles maintenues ensemble par presque rien. Sa surface d'échange avec l'air est énorme rapportée à sa masse : elle se déshydrate et chauffe plus vite que n'importe quel autre fruit.
- **Elle respire énormément.** Son taux de respiration est parmi les plus élevés de tous les fruits tempérés. À 20 °C, elle consomme ses propres réserves à une vitesse qui réduit sa durée de vie à vingt-quatre heures.
- **Elle est une cible parfaite pour *Botrytis*.** Cueillie avec un film de rosée sur ses poils, elle est moisie le lendemain, quel que soit le froid appliqué ensuite. Le premier fruit atteint contamine tout le contenant en trente-six heures.

Le geste

1 Approcher par en dessous

Placer le pouce et l'index de part et d'autre du fruit, sans le pincer. Le contact doit être latéral et léger : une pression frontale marque la pulpe.

2 Tirer dans l'axe, très doucement

Le fruit mûr se détache par simple traction douce dans l'axe du pédoncule. Aucun effort. Si le fruit résiste, le laisser et revenir dans deux jours : il sera parfait.

3 Déposer, ne pas jeter

Poser dans le contenant, ne jamais laisser tomber. Une chute de dix centimètres suffit à écraser les drupéoles du dessous.

4 Trois couches maximum

Un contenant plat et large plutôt qu'un seau. Au-delà de trois couches, le poids écrase le fond, le jus libéré devient un milieu de culture, et toute la récolte est perdue.

5 Écarter les fruits douteux dès la cueillette

Un fruit fendu, un fruit avec une tache brune, un fruit tombé au sol : on les met à part et on les consomme dans l'heure. Un seul fruit atteint contamine la boîte entière.

Après la cueillette

ACTION	DÉLAI	DÉTAIL
Mise au froid	30 minutes maximum	Bac à légumes, 2 à 4 °C. C'est l'action la plus rentable : elle double la durée de vie
Ne pas laver	—	Laver avant stockage garantit la moisissure. On lave juste avant de consommer, rapidement, sans faire tremper
Conservation au frais	2 à 3 jours	Contenant ouvert ou percé : l'humidité confinée accélère les pourritures
Congélation	Le jour même	Étaler sur un plateau, congeler deux heures, puis mettre en sac : les fruits restent séparés. Douze mois
Confiture, coulis	Sous 24 h	C'est la destination des fruits légèrement trop mûrs ou abîmés

Rythme de passage

2 j ENTRE DEUX PASSAGES	1 j PAR TEMPS > 28 °C	8 à 12 PASSAGES SUR LA SAISON	30 min DÉLAI AVANT LE FROID
-----------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------------

L'ERREUR LA PLUS COÛTEUSE

Cueillir toute la production d'un coup le samedi après-midi parce que c'est le seul moment disponible. On obtient un mélange de fruits verts et de fruits blets, cueillis à chaud, qui sera perdu à 60 % le mardi. Mieux vaut deux passages de dix minutes en semaine, à la bonne heure, qu'une grande session au mauvais moment.




Mûre sauvage

Rubus fruticosus

NON CLIMACTÉRIQUE • RONCE DES HAIES

FENÊTRE DE TIR

2 à 3 jours



La ronce est partout dans la boucle : lisières de bois, talus, friches, bordures de la plaine de Montesson. La production s'étale de mi-juillet à fin septembre, avec un optimum très net **du 5 août au 10 septembre**. Les premières mûres, celles de la pointe de chaque grappe, sont les plus grosses et les plus sucrées : elles mûrissent en premier et concentrent les réserves.

MEILLEURE HEURE

10 h – 12 h

Rosée séchée, fruit sec et ferme — pour conserver

ACCEPTABLE

17 h – 19 h

Sucre maximal — pour manger ou faire une confiture le soir

À ÉVITER

Après la pluie

Fruit gorgé d'eau, fade, et qui fermente en 24 h

Le jour J

INDICATEUR	TROP TÔT	À POINT	TROP TARD
Aspect de surface	Noir brillant, comme vernissé	Noir mat, sans reflet	Terne et grisâtre
Couleur	Rouge ou noir tacheté de rouge	Noir uniforme jusqu'au pédoncule	Noir, drupéoles affaissées
Détachement	Il faut tirer fort	Vient seule, avec son réceptacle	Tombe au moindre frôlement
Fermeté	Dure et croquante	Souple, sans être molle	S'écrase, coule
Goût	Acide, astringent	Sucré avec une pointe d'acidité	Fade, parfois fermenté

BRILLANT OU MAT : LE SEUL CRITÈRE QUI COMPTE

C'est l'erreur universelle du cueilleur débutant. Une mûre **brillante** est noire mais pas mûre : elle est acide et ferme. La perte de brillance accompagne le dernier stade de maturation, quand les parois cellulaires se relâchent et que la surface devient légèrement irrégulière. On peut trier à distance : les mates d'abord, les brillantes dans trois jours.

Distinguer mûre et framboise sur le terrain

CRITÈRE	MÛRE (RONCE)	FRAMBOISE SAUVAGE
Réceptacle après cueillette	Reste dans le fruit : la mûre est pleine	Reste sur la plante : la framboise est creuse
Couleur à maturité	Noire	Rouge
Tige	Arquée, très épineuse, s'enracine au bout	Dressée, aiguillons fins
Feuille, face inférieure	Verte ou légèrement pâle	Nettement blanchâtre, feutrée
Habitat en Île-de-France	Partout, très commune	Rare à l'état sauvage, plutôt en clairière fraîche

Aucune des deux n'a de sosie toxique en Île-de-France, ce qui fait de la mûre l'une des cueillettes les plus sûres pour commencer.

4.2 (suite) — Mûre : où cueillir et le mythe de la Saint-Michel

Choisir sa station

SITUATION	QUALITÉ	COMMENTAIRE
Lisière de bois, exposition sud ou ouest	EXCELLENTE	Soleil pour le sucre, fraîcheur du sol de sous-bois pour le calibre. La meilleure combinaison
Friche ouverte, plein soleil	BONNE	Fruits très sucrés mais petits, surtout en année sèche
Sous-bois ombragé	MOYENNE	Gros fruits mais acides, mûrissement tardif et irrégulier
Bord de chemin de halage	VARIABLE	Correct si le passage motorisé est nul ; vérifier l'absence de traitement des berges
Talus de route fréquentée	À ÉVITER	Dépôts d'usure de freins et de pneus sur une surface veloutée impossible à laver
Bordure de parcelle cultivée	À ÉVITER	Dérive de pulvérisation sur cinq à vingt mètres

La hiérarchie dans la grappe

Une inflorescence de ronce mûrit du sommet vers la base. Le fruit terminal, appelé **mûre de tête**, mûrit une à deux semaines avant les autres, il est deux fois plus gros et sensiblement plus sucré. Les derniers fruits de la base, en septembre, sont petits et acides. En pratique : les premières cueillettes d'août sont les meilleures, celles de fin septembre sont à réserver à la gelée ou au sirop.

La Saint-Michel : folklore et réalité

Une tradition répandue dans toute l'Europe du Nord veut qu'on ne cueille plus de mûres après le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, parce que le diable y aurait craché. C'est du folklore, mais il repose sur une observation juste :

- Fin septembre, les nuits deviennent humides et les journées plus courtes : le fruit ne sèche plus entre deux rosées.
- *Botrytis* et diverses moisissures colonisent alors les fruits, souvent de manière peu visible à l'œil.
- Les fruits tardifs, récoltés sur les positions basses de la grappe, sont de toute façon petits et acides.


La règle utile n'est donc pas une date mais un état : **arrêter quand les fruits restent humides toute la journée**. Selon les années, cela tombe entre le 20 septembre et le 15 octobre à Chatou.

Après la cueillette

DESTINATION	DÉLAI	PRÉPARATION
Consommation fraîche	2 à 3 jours	Au frais, non lavées, contenant plat, deux couches
Congélation	Le jour même	Congeler à plat avant la mise en sac. La mûre supporte très bien la congélation, contrairement à la framboise qui rend beaucoup d'eau
Gelée et confiture	Sous 48 h	La mûre est pauvre en pectine : associer à de la pomme, ou ajouter du jus de citron
Sirop, liqueur	Sous 48 h	Destination idéale des fruits de septembre, plus acides

LE TRI À L'EAU SALÉE

Les mûres sauvages hébergent fréquemment de petites larves de mouche du vinaigre, sans aucun danger mais peu appétissantes. Les faire tremper vingt minutes dans de l'eau légèrement salée — une cuillère à soupe par litre — fait remonter les larves à la surface. Rincer ensuite à l'eau claire. À ne faire qu'au moment de l'utilisation, jamais avant stockage.




Prune rouge

Prunus domestica · *P. salicina*

CLIMACTÉRIQUE · 2 À 3 PASSAGES

FENÊTRE DE TIR

8 à 12 jours



Les prunes rouges de jardin — type Ruby, Santa Rosa, ou les nombreuses variétés locales non nommées des vergers de la boucle — donnent de début juillet à mi-août. Elles sont climactériques : on peut les cueillir légèrement fermes et les laisser finir au cellier. Mais attention à une nuance qui trompe beaucoup de monde : **elles ramollissent après cueillette, elles ne sucent plus**. Le taux de sucre est figé à l'instant où l'on détache le fruit.

MEILLEURE HEURE

8 h – 11 h

Pulpe fraîche, prune intacte, chair ferme qui marque moins

ACCEPTABLE

18 h – 20 h

Acceptable pour consommation immédiate

À ÉVITER

12 h – 17 h

Chair chaude et molle : chaque doigt laisse une marque brune

Le jour J

INDICATEUR	TROP TÔT	À POINT	TROP TARD
Couleur de fond côté ombré, près du pédoncule	Vert franc	Jaune ou orangé sous le rouge	Jaune foncé, presque brun
Pruine	Présente	Présente et complète	Absente par endroits, peau qui se ride
Fermeté près du pédoncule	Dure partout	Cède très légèrement au pouce	Molle sur tout le fruit
Détachement	Il faut tirer, le pédoncule reste sur l'arbre	Vient par soulèvement, pédoncule attaché	Tombe au moindre secouement
Chutes au sol	Aucune, ou uniquement des fruits véreux	Quelques fruits sains tombés	Chute massive
Brix	< 12	14 à 17	> 18

NE JAMAIS FROTTER UNE PRUNE

La **pruine** est cette pellicule bleutée et poudreuse qui couvre le fruit. Ce n'est ni de la poussière ni un traitement : c'est une cire produite par le fruit lui-même, qui limite la déshydratation et fait barrière aux champignons. La frotter pour faire briller le fruit — réflexe très courant — divise sa conservation par deux. On ne lave une prune qu'au moment de la manger.

4.3 (suite) — Prune rouge : récolte et conservation

La stratégie des passages échelonnés

Un prunier ne mûrit pas d'un bloc. L'écart entre les fruits du sommet, en plein soleil, et ceux de l'intérieur du houppier atteint **dix à douze jours**. Vouloir tout récolter en une fois garantit un mélange de fruits acides et de fruits blets.

PASSAGE	MOMENT	CIBLES	DESTINATION
1	J	Sommet et faces sud et ouest, fruits à couleur de fond jaune	Consommation fraîche sous 5 jours
2	J + 5	Le gros de l'arbre : c'est la récolte principale	Fraîche et transformation
3	J + 10	Intérieur du houppier, faces nord et est	Confiture, tarte, congélation

Le geste

1 Saisir par le pédoncule quand c'est possible

Prendre la queue entre le pouce et l'index plutôt que le fruit : la pruine reste intacte et il n'y a aucune marque de doigt.

2 Sinon, tenir le fruit dans la paume

Toute la main refermée sans serrer, jamais du bout des doigts. Une prune tenue à trois doigts montre trois tâches brunes deux jours plus tard.

3 Soulever, ne pas tirer

Relever le fruit vers le haut, dans l'axe. Le pédoncule d'un fruit mûr se détache seul au niveau de sa zone d'abscission.

4 Utiliser un panier à fond souple

Un linge plié au fond du cageot suffit. Trois à quatre couches maximum.

5 Pour les branches hautes, la bâche

Étendre une bâche ou un vieux drap sous la branche et secouer **doucement**. Seuls les fruits parfaitement mûrs tombent : c'est un excellent test de maturité en plus d'une méthode de récolte. Les fruits ainsi obtenus se consomment sous 48 heures.

Conservation

MÉTHODE	DURÉE	CONDITIONS
Finition à température ambiante	2 à 5 jours	18 à 20 °C, sur une seule couche, à l'abri du soleil. C'est là que la texture s'améliore
Réfrigérateur, une fois mûre	1 à 2 semaines	4 °C. Sortir deux heures avant de manger : les arômes ne s'expriment pas à froid
Congélation	10 à 12 mois	Dénoyauter avant. La peau devient molle : réserver à la cuisson
Séchage	12 mois	Couper en deux, dénoyauter, 8 à 12 h à 60 °C
Confiture	2 ans	Les prunes un peu fermes donnent une meilleure tenue que les blettes

NE JAMAIS RÉFRIGÉRER UNE PRUNE ENCORE FERME

Le froid appliqué avant la fin du mûrissement bloque définitivement la crise climactérique : le fruit ne ramollira plus jamais correctement et développe un brunissement interne, la *chill injury*. Une prune se termine à température ambiante, **puis** se met au froid. La même règle vaut pour la tomate et la pêche.




Prune jaune et mirabelle

Prunus domestica subsp. syriaca

CLIMACTÉRIQUE • LE FRUIT LE PLUS SUCRÉ DU GUIDE

FENÊTRE DE TIR

8 à 12 jours



Trois fruits distincts se cachent derrière l'appellation : la **mirabelle**, petite, ronde, jaune d'or tachetée de roux, mi-août à début septembre ; la **reine-claude dorée**, plus grosse, vert-jaune, fin juillet à fin août ; et les diverses **prunes jaunes** de vergers anciens, très variables. Toutes partagent une caractéristique : elles atteignent des teneurs en sucre exceptionnelles, couramment 18 à 22 °Brix, ce qui les place au-dessus de la pomme et de la poire.

MEILLEURE HEURE

9 h – 11 h

Rosée séchée, fruits secs :
indispensable pour la récolte au drap

ACCEPTABLE

17 h – 19 h

Bon aussi, si le temps est sec depuis le
matin

À ÉVITER

Tôt le matin

Fruits humides de rosée : ils
fermentent dès le lendemain

Le jour J

INDICATEUR	TROP TÔT	À POINT	TROP TARD
Les taches de rousseur	Peau jaune unie	Constellation de petits points roux sur toute la face exposée	Taches confluentes, brunes
Couleur de fond	Vert pâle	Jaune d'or franc	Jaune ambré
Réaction au secouement	Rien ne tombe	Quelques fruits tombent à la secousse douce	Une pluie de fruits
Adhérence du noyau	Le noyau adhère à la chair	Le noyau se détache proprement	—
Brix	< 15	17 à 20	> 22, chair déjà farineuse

LES TACHES DE ROUSSEUR, L'INDICATEUR DÉCISIF

Sur une mirabelle, ces petits points roux ne sont pas un défaut : ce sont des zones où les cellules de surface se sont lignifiées à l'approche de la maturité. Une mirabelle jaune unie n'est **jamais** mûre, même si elle est belle. Les fruits les plus tachetés sont les plus sucrés, souvent de trois à quatre points de Brix au-dessus des autres.

4.4 (suite) — Mirabelle : la récolte au drap

C'est la seule espèce du guide pour laquelle la méthode traditionnelle — secouer l'arbre — est aussi la meilleure méthode.

Pourquoi le secouage fonctionne ici et nulle part ailleurs

La mirabelle forme une zone d'abscission particulièrement nette : à maturité, le lien entre le pédoncule et le rameau se rompt tout seul. Une secousse modérée fait donc tomber **exactement les fruits mûrs et aucun autre**. L'arbre trie lui-même, ce qui évite la principale difficulté de la récolte manuelle : distinguer à l'œil un fruit à point d'un fruit à deux jours près, sur plusieurs milliers de fruits.

1 Étendre les draps sous l'arbre

Deux vieux draps, une bâche légère ou un filet de récolte, remontant légèrement sur les bords pour que les fruits ne roulent pas. Couvrir toute la projection du houppier.

2 Secouer branche par branche, doucement

Saisir une charpentière et imprimer trois ou quatre secousses fermes mais brèves. Ne pas secouer le tronc : on fait tomber les fruits verts et on abîme les jeunes pousses.

3 Ramasser immédiatement

Les fruits ne doivent pas rester au sol : le contact avec la terre humide et les guêpes les dégradent en quelques heures.

4 Trier en trois tas

Intacts pour la consommation fraîche, légèrement marqués pour la tarte du soir, fendus ou piqués pour la confiture immédiate. Ne jamais mélanger.

5 Recommencer trois à quatre jours plus tard

Deux ou trois secouages espacés couvrent toute la fenêtre. C'est la méthode la plus rapide qui existe : un arbre adulte se récolte en vingt minutes.

Ce que la récolte au drap interdit

- **La conservation longue.** Un fruit tombé, même sur un drap, subit un choc imperceptible qui déclenchera une pourriture en trois à cinq jours. Les mirabelles ramassées ainsi se consomment ou se transforment sous 48 heures.
- **Le transport.** Elles ne supportent pas d'être déplacées en cageot profond. Si l'on veut donner ou vendre, il faut cueillir à la main, fruit par fruit, deux à trois jours avant le stade de chute.

La fenêtre la plus courte du guide

8 à 12 j

DE FENÊTRE TOTALE

3 à 4 j

ENTRE DEUX SECOUAGES

48 h

DE CONSERVATION APRÈS
CHUTE


22 °Brix

ATTEIGNABLES

La mirabelle est le fruit qu'on rate le plus souvent, pour une raison simple : sa fenêtre tombe pendant les vacances, elle dure une dizaine de jours, et il n'y a pas de rattrapage. C'est la seule espèce du guide pour laquelle il vaut la peine de **noter une date dans un agenda** et de passer voir l'arbre tous les trois jours à partir du 5 août.

Conservation et transformation

MÉTHODE	DURÉE	NOTE
Fraîche, cueillie à la main	4 à 6 jours	Au frais, une seule couche
Fraîche, récoltée au drap	48 heures	Consommer ou transformer vite
Congélation dénoyautée	12 mois	Excellente tenue. C'est la meilleure façon d'étaler une récolte massive de dix jours sur toute l'année
Confiture	2 ans	Très riche en sucre naturellement : réduire l'apport à 600 g par kilo de fruits
Tarte, clafoutis	—	Poser les demi-fruits face bombée vers le bas : le jus reste dans le fruit
Eau-de-vie	—	Usage traditionnel lorrain. La distillation domestique est réglementée



Prunes sauvages

Prunus cerasifera · *Prunus spinosa*


DEUX ESPÈCES, DEUX SAISONS OPPOSÉES

FENÊTRES

juil. et nov.

Deux espèces bien distinctes se partagent le nom de prune sauvage en Île-de-France, et elles n'ont ni la même saison, ni le même usage, ni la même heure de récolte.

Le myrobolan, ou prunier-cerise



Prunus cerasifera. Petites prunes rondes de 2 à 3 cm, rouges ou jaunes selon les pieds, sur un arbre à port étalé sans épines. C'est probablement l'arbre fruitier sauvage le plus commun de la région : il a été massivement planté comme porte-greffe et en haies d'alignement, et il s'est naturalisé partout. Sa floraison blanche très précoce, dès la fin février, le rend facile à repérer et à noter pour l'été suivant.

Le fruit est acidulé, juteux, avec un noyau qui adhère à la chair. Il est excellent en confiture et en gelée, correct à croquer quand il est bien mûr. Récolte de fin juin à mi-août selon les pieds, avec une grande variabilité d'un arbre à l'autre.

MEILLEURE HEURE

9 h – 11 h

Comme toutes les prunes : rosée
séchée, pulpe fraîche

ACCEPTABLE

17 h – 19 h

Correct par temps sec

À ÉVITER

12 h – 17 h


Fruit chaud, peau qui éclate au
moindre contact

INDICATEUR	À POINT
Souplesse	Le fruit cède nettement sous le pouce : un myrobolan ferme est immangeable tellement il est acide
Couleur	Rouge sombre ou jaune ambré uniforme, sans zone verte
Chute	Une secousse fait tomber les fruits mûrs : le drap fonctionne aussi ici
Goût	Acidulé mais franchement sucré. S'il rape la langue, attendre une semaine

IDENTIFICATION : MYROBOLAN OU PRUNELLIER ?

La confusion est fréquente et sans danger, mais elle change tout pour la date de récolte. Le **myrobolan** n'a pas de vraies épines, ses fruits font 2 à 3 cm et sont rouges ou jaunes, et ils mûrissent en juillet. Le **prunellier** est hérissé d'épines acérées, ses fruits font 1 à 1,5 cm et sont bleu-noir à forte pruine, et ils ne sont bons qu'en novembre.

4.5 (suite) — La prunelle et le rôle du gel



Prunus spinosa, l'épine noire. Petits fruits bleu-noir de 1 à 1,5 cm, couverts d'une pruine épaisse, portés par un arbuste très épineux des haies et des lisières. C'est la première floraison de l'année dans la boucle, autour du 10 mars, sur des rameaux encore nus.

Pourquoi il faut attendre les gelées

Une prunelle cueillie en septembre est **immangeable** : elle est bourrée de tanins qui assèchent violemment la bouche. Ces tanins ne disparaissent pas avec le temps, mais le gel les rend inoffensifs par un mécanisme physique :

- Les cristaux de glace qui se forment dans les cellules **éclatent les parois et les vacuoles** où les tanins sont séquestrés.
- Libérés dans le cytoplasme, ces tanins **se lient aux protéines et aux pectines** du fruit et forment des complexes insolubles, qui ne réagissent plus avec les protéines de la salive — or c'est cette réaction qui donne la sensation d'astringence.
- Le fruit ramollit, son jus devient extractible, et sa saveur bascule vers un goût fruité profond.

LE REMÈDE DU CONGÉLATEUR

Si les gelées tardent — ce qui devient la norme à Chatou, où la première gelée recule d'année en année — on obtient **exactement le même résultat** en plaçant les prunelles 48 heures au congélateur à -18°C . Le mécanisme est identique. On peut donc récolter dès la mi-octobre, avant que les oiseaux ne prennent tout, et faire le gel à la maison.

MEILLEURE HEURE

11 h – 15 h

La seule espèce à récolter en milieu de journée : il faut que le givre ait fondu

ACCEPTABLE

15 h – 16 h

Encore correct tant qu'il fait jour

À ÉVITER

Tôt le matin

Fruits givrés : ils s'écrasent au contact et le jus se perd

C'est l'exception qui confirme la règle du chapitre 1. En novembre, la température du matin est négative : un fruit gelé manipulé se transforme en bouillie. Il faut attendre le dégel complet, ce qui repousse la fenêtre au milieu de la journée.

Le geste, avec des épines de trois centimètres

- 1 Gants épais obligatoires**
Les épines du prunellier sont de véritables rameaux transformés, dures et acérées. Les piqûres s'infectent facilement. Gants de rosier, manches longues.
- 2 Travailler par le dessous**
Approcher la main sous la grappe plutôt que de face : les épines pointent vers l'extérieur et vers le haut.
- 3 Rouler le fruit entre les doigts**
La prunelle mûre se détache par un léger roulement latéral. Ne pas tirer : on ramène le rameau et ses épines.

4

Ou tendre un drap et frapper la branche

Un bâton et un drap au sol, comme pour l'olive. C'est nettement plus rapide et cela épargne les mains. Fonctionne bien après une vraie gelée.

5

Laisser au moins deux tiers de la station

Les prunelles sont une ressource hivernale majeure pour les grives, merles et fauvettes. Une haie entièrement dépouillée en novembre pèse réellement sur la faune locale.

Usages

PRÉPARATION	NOTE
Gelée de prunelle	L'usage classique. Très riche en pectine : prise facile, sans ajout
Vin de prunelle, liqueur	Macération dans l'alcool ou le vin, 6 à 10 semaines. Tradition répandue dans toute l'Europe
Sirop	Bon compromis pour qui ne veut pas d'alcool
Fruit frais	Possible après gel, mais reste rustique. Peu de gens en mangent plus de trois
JAMAIS les noyaux	Comme tous les <i>Prunus</i> , l'amande contient de l'amygdaline. Ne jamais broyer les noyaux dans une préparation




Poire

Pyrus communis

CLIMACTÉRIQUE • NE JAMAIS LAISSER MÛRIR SUR L'ARBRE

FENÊTRE DE TIR

5 à 10 jours



La poire est le fruit le plus contre-intuitif du guide. Toutes les autres espèces gagnent à rester sur l'arbre le plus longtemps possible ; la poire, non. Une poire laissée mûrir sur l'arbre développe presque toujours une **chair granuleuse** et un **cœur blet** — un brunissement interne invisible de l'extérieur, qu'on ne découvre qu'en coupant le fruit.

MEILLEURE HEURE

8 h – 11 h

Chair fraîche donc plus ferme : elle marque beaucoup moins

ACCEPTABLE

17 h – 19 h

Acceptable, la poire est peu sensible à l'humidité de surface

À ÉVITER


Après une nuit de gel

Meurtrissures internes invisibles au moment de la cueillette

Les variétés et leurs dates en Île-de-France

VARIÉTÉ	RÉCOLTE	MÛRISSEMENT APRÈS	CONSERVATION	USAGE
Williams	10 – 25 août	5 à 8 jours	2 à 3 semaines	Table, conserve, eau-de-vie
Beurré Hardy	1 ^{er} – 15 sept.	8 à 12 jours	4 à 6 semaines	Table
Conférence	10 – 25 sept.	10 à 15 jours	2 à 4 mois	La plus polyvalente et la plus fiable en Île-de-France
Doyenné du Comice	25 sept. – 10 oct.	15 à 20 jours	2 à 3 mois	La plus fine de bouche
Passe-Crassane	10 – 25 oct.	Plusieurs semaines	4 à 5 mois	Poire d'hiver, se mange en janvier

Le jour J



Le test du pédoncule : on soulève le fruit à l'horizontale et on pivote d'un quart de tour. Jamais de traction vers le bas.

INDICATEUR	TROP TÔT	À POINT	TROP TARD
Test du pédoncule	Résiste, la branche plie	Se détache par soulèvement et quart de tour	Les fruits tombent seuls
Couleur de fond	Vert franc	Vert clair à jaunâtre	Jaune
Pépins	Blancs ou beiges	Brun foncé uniforme	Brun noir, chair molle autour
Lenticelles	Vertes et peu visibles	Brunes et bien marquées	—
Indice amidon	< 2		> 6

4.6 (suite) — Poire : le mûrissement au cellier

La moitié du travail se fait après la récolte. C'est cette étape, presque toujours négligée, qui sépare une poire fondante d'une poire de bois.

Le protocole

1 Récolter ferme, trié par lots

Séparer dès l'arbre les fruits parfaits des fruits marqués. Un seul fruit blessé dans une caisse accélère le mûrissement de tous les autres par diffusion d'éthylène, et déclenche les pourritures.

2 Passage au froid pour les variétés d'automne

Conférence, Comice et Passe-Crassane ont besoin d'un séjour au froid — 0 à 4 °C pendant deux à six semaines — pour déclencher correctement leur crise climactérique. Sans ce passage, elles restent dures et se rident. Un garage frais ou une cave suffit ; le bac à légumes du réfrigérateur aussi.

3 Sortir par petits lots

Ne sortir que ce qu'on mangera dans la semaine. Une fois à 18–20 °C, le compte à rebours démarre : 5 à 20 jours selon la variété.

4 Le test du col

C'est le seul test valable pour savoir si une poire est prête. Presser très doucement avec le pouce **autour du pédoncule**, jamais sur la joue du fruit. Quand cette zone cède légèrement, la poire est à point. Presser la joue ne dit rien et laisse une marque.

5 Accélérer si besoin

Une pomme mûre ou une banane placée dans un sac papier avec les poires libère de l'éthylène et réduit le délai de moitié. Ne pas utiliser de sac plastique fermé : la condensation déclenche les pourritures.

Pourquoi le cœur blet apparaît

Le brunissement interne résulte d'un manque d'oxygène au centre du fruit. À mesure que la poire mûrit, ses tissus se densifient et la diffusion des gaz vers le cœur ralentit. Si la respiration reste intense — ce qui est le cas quand le fruit est chaud, donc sur l'arbre en septembre — le centre bascule en anaérobiose et brunit.

D'où les deux règles : **cueillir ferme**, avant que la densification ne soit avancée, et **mûrir au frais plutôt qu'au chaud** pour ralentir la respiration. Une poire mûrie à 15 °C est meilleure qu'une poire mûrie à 22 °C, même si c'est plus long.

5 à 20 j

DE MÛRISSEMENT SELON
VARIÉTÉ

15 °C

TEMPÉRATURE IDÉALE DE
MÛRISSEMENT

2 à 6 sem.

DE FROID POUR LES
VARIÉTÉS D'AUTOMNE

Le col

LA SEULE ZONE À PALPER

L'ERREUR CLASSIQUE DU POIRIER DE JARDIN

Attendre que les poires soient bonnes à croquer sur l'arbre. Elles ne le seront jamais : soit elles tombent avant, soit elles sont blettes au cœur quand elles ramollissent. Une poire qui résiste encore un peu au test du pédoncule mi-septembre est **prête à être cueillie**, même si elle est immangeable en l'état. C'est normal, et c'est là toute la différence entre la poire et la pomme.




Pomme

Malus domestica

CLIMACTÉRIQUE • TEST AMIDON-IODE

FENÊTRE DE TIR

10 à 20 jours



La pomme est le fruit le plus tolérant du guide : fenêtre large, conservation longue, faible sensibilité à l'heure de récolte. C'est pourtant celle où le choix de la date a le plus de conséquences, non pas sur le goût immédiat mais sur la **durée de garde** : deux semaines d'écart à la récolte se traduisent par trois mois d'écart au cellier.

MEILLEURE HEURE

8 h – 11 h

Chair fraîche, donc plus ferme : elle marque nettement moins

ACCEPTABLE

16 h – 19 h

Acceptable : la pomme est peu sensible à l'humidité

À ÉVITER

Après une nuit < 0 °C

Meurtrissures internes invisibles qui bruniront au stockage

Les variétés et leurs dates en Île-de-France

VARIÉTÉ	RÉCOLTE	INDICE AMIDON	CONSERVATION	NOTE
Reine des Reinettes	25 août – 10 sept.	6–7	6 à 8 semaines	Excellente en tarte, se garde mal
Elstar, Gala	5 – 25 sept.	6–7	2 à 3 mois	Table
Belle de Boskoop	1 ^{er} – 20 oct.	4–5	5 à 7 mois	La reine de la garde et de la pâtisserie en Île-de-France
Reinette grise du Canada	5 – 25 oct.	4–5	4 à 6 mois	S'améliore nettement après Noël
Idared, Braeburn	10 – 30 oct.	4–5	5 à 7 mois	Bonne tenue, goût neutre

Le jour J : quatre indicateurs concordants

INDICATEUR	TROP TÔT	À POINT	TROP TARD
Indice amidon-iode	1–3	4–5 pour la garde, 6–7 pour la table	8–10
Couleur de fond	Vert franc	Vert pâle à jaunâtre	Jaune franc
Pépins	Blancs	Brun foncé	Brun noir
Test de rotation	Il faut tirer	Soulèvement + quart de tour	Chute spontanée en nombre
Premières chutes	Uniquement des fruits véreux	Quelques fruits sains au sol	Le sol est jonché

LE ROUGE NE VEUT RIEN DIRE

La couleur rouge d'une pomme est de l'anthocyane synthétisée sous l'effet de la lumière et des nuits fraîches. Une pomme à l'ombre du houppier peut être parfaitement mûre et rester verte ; une pomme en plein soleil peut être rouge vif trois semaines avant maturité. Il faut regarder la **couleur de fond** du côté ombré du fruit, et rien d'autre.

4.7 (suite) — Pomme : récolte et cellier

Le geste

1 La pomme dans la paume, pas entre les doigts

Envelopper le fruit dans toute la main. Trois doigts qui pressent laissent trois meurtrissures qui bruniront en 48 heures et deviendront des points de pourriture au stockage. C'est la première cause de perte au cellier.

2 Soulever et pivoter

Relever le fruit vers le haut jusqu'à l'horizontale, puis tourner d'un quart de tour. Le pédoncule se rompt à sa zone d'abscission. Ne jamais tirer vers le bas : on arrache le dard, c'est-à-dire le bourgeon fructifère de l'année suivante.

3 Garder le pédoncule sur le fruit

Une pomme sans queue a une plaie ouverte au sommet, qui est la porte d'entrée n° 1 des pourritures de conservation. Ces fruits-là se mangent en premier, ils ne se stockent pas.

4 Déposer, ne jamais laisser tomber

Même dans un panier rembourré. Une chute de vingt centimètres crée une meurtrissure interne invisible.

5 Ne jamais récolter après une nuit de gel

Les cellules gelées éclatent au moindre contact. Le fruit paraît intact et brunit en profondeur trois jours plus tard. Attendre le dégel complet, soit souvent la mi-journée fin octobre.

Le cellier

PARAMÈTRE	CIBLE	POURQUOI
Température	2 à 5 °C	Chaque degré en moins ralentit la respiration. En dessous de 0 °C, on abîme la chair
Humidité	85 à 92 %	Trop sec, les pommes se rident ; trop humide, elles pourrissent. Une bassine d'eau dans une cave sèche suffit
Obscurité	Totale	La lumière accélère la dégradation des arômes
Aération	Légère et constante	Évacue l'éthylène émis par les fruits, qui autrement les fait mûrir tous ensemble
Disposition	Une seule couche, sans contact	Un fruit qui pourrit contamine ses voisins par contact direct
Voisinage	Pas de pommes de terre	Les pommes de terre absorbent les arômes et l'éthylène des pommes les fait germer

Le tri du mois

Passer les caisses en revue une fois par mois et retirer tout fruit présentant une tâche. Une pomme atteinte contamine ses voisines en trois à quatre semaines ; le contrôle mensuel suffit à casser la chaîne. Un cellier bien tenu perd 5 % de sa récolte ; un cellier jamais trié en perd 40 %.

Le tableau de destination

ÉTAT DU FRUIT	DESTINATION	DÉLAI
Parfait, pédoncule intact, indice 4-5	Cellier, longue garde	5 à 7 mois
Parfait, indice 6-7	Cellier, consommation courante	2 à 4 mois
Sans pédoncule	Consommation rapide	3 à 5 semaines
Légèrement marqué	Compote, tarte	Sous 2 semaines
Tombé au sol, intact	Jus, compote	Sous 1 semaine
Véreux ou tavelé	Jus ou compost ; retirer la partie atteinte	Immédiat

5

L'ortie

La plus abondante et la plus nutritive des sauvages comestibles de la boucle, avec une règle de récolte stricte qu'il vaut mieux connaître : on ne cueille pas une ortie après sa floraison.

-
- 5.1 — Fiche et fenêtres de récolte
 - 5.2 — La règle de la floraison
 - 5.3 — Geste, lieux et préparation




Ortie dioïque

Urtica dioica

SAUVAGE • DEUX FENÊTRES PAR AN

PARTIE RÉCOLTÉE

4 à 6 feuilles



L'ortie est probablement la plante sauvage comestible la plus répandue de la boucle de Seine : lisières, pieds de haies, friches, bords de chemins, et surtout les sols riches en azote — anciens tas de fumier, abords de composts, zones régulièrement fertilisées. Elle n'a pas de sosie toxique en France : ses seules confusions possibles, les lamiers, sont comestibles et se distinguent immédiatement puisqu'ils ne piquent pas.

MEILLEURE HEURE

8 h – 10 h

Turgescence maximale, rosée évaporée : la récolte tient 24 h de plus

ACCEPTABLE

18 h – 20 h

Correct, mais les feuilles sont déjà légèrement flétries

À ÉVITER

11 h – 17 h

Feuilles flétries qui ne récupèrent pas : bonnes pour la soupe, pas pour le reste

Les deux fenêtres de l'année

FENÊTRE	PÉRIODE	CE QU'ON RÉCOLTE	QUALITÉ
Printemps	20 mars – 15 mai	Jeunes pousses entières de 15 à 25 cm, avant floraison	Optimale : tendreté maximale, teneur en protéines la plus élevée de l'année
Automne	1 ^{er} sept. – 20 oct.	Repousses tendres après fauche ou coupe estivale	Très bonne, légèrement moins que le printemps
Toute la saison	Mai – août	Uniquement les 4 à 6 feuilles terminales des pousses non fleuries	Correcte, mais il faut trier plante par plante
JAMAIS	—	Les feuilles des pieds en fleurs ou montés à graine	Voir la section suivante

Ce qui fait sa valeur

5,5 g

DE PROTÉINES / 100 G
FRAIS

× 4

LE FER D'UN ÉPINARD

3 sem.

POUR REPOUSSER APRÈS
COUPE

0 €

COÛT DE LA RESSOURCE

L'ortie est l'un des rares végétaux sauvages à teneur protéique réellement significative, et sa richesse en fer, calcium et vitamine C en fait historiquement une plante de soudure : elle sortait quand les réserves de l'hiver étaient épuisées et que rien d'autre n'avait encore levé.

POURQUOI ELLE PIQUE, ET COMMENT ÇA S'ARRÊTE

Les poils urticants sont des ampoules de silice terminées par une pointe qui se brise au contact et injecte un mélange d'histamine, d'acétylcholine et d'acide formique. Quatre méthodes neutralisent complètement ces poils : la **cuisson**, même brève ; le **blanchiment** trente secondes ; le **flétrissement** de douze heures ; et le **broyage** ou mixage, qui les détruit mécaniquement. Une soupe, un pesto ou une quiche ne piquent absolument pas.

5.2 — La règle de la floraison

C'est la seule vraie contrainte sanitaire de l'ortie, et elle est simple : on ne consomme pas les feuilles d'une ortie qui a fleuri.

Le mécanisme

À partir de la floraison, qui s'étale de juin à septembre, les feuilles âgées développent des **cystolithes** : des concrétions minérales de carbonate de calcium et de silice qui s'accumulent dans certaines cellules de l'épiderme. Ces particules sont dures, anguleuses et ne se dégradent pas à la cuisson.

Une consommation abondante et répétée de feuilles âgées est traditionnellement déconseillée pour cette raison, en particulier chez les personnes ayant une fragilité rénale. Ce n'est pas un poison violent et une assiette occasionnelle ne présente pas de risque notable ; c'est une règle de bon sens ancienne que la littérature ethnobotanique rapporte de manière constante, et il n'y a aucune raison de s'en écarter puisque la solution est gratuite.

Comment reconnaître une ortie fleurie

OBSERVATION	VERDICT
Tige lisse, feuilles d'un vert franc, aucune inflorescence à l'aisselle des feuilles	RÉCOLTER LA PLANTE ENTIÈRE
Grappes pendantes vertâtres à l'aisselle des feuilles, sur la moitié basse de la tige	4 À 6 FEUILLES TERMINALES SEULEMENT
Grappes sur toute la hauteur, feuilles basses foncées et coriaces	NE PAS RÉCOLTER
Plante montée à graine, grappes brunies	NE PAS RÉCOLTER

L'ASTUCE QUI DONNE DES ORTIES TENDRES TOUT L'ÉTÉ

Rabattre une station à dix centimètres du sol à la cisaille, début juin. Trois semaines plus tard, elle produit des pousses neuves, non fleuries, exactement comme au printemps. On peut répéter l'opération deux ou trois fois dans la saison. La plante ne souffre pas : c'est une vivace à rhizome, elle est faite pour ça — c'est d'ailleurs ainsi qu'elle prospère dans les prairies fauchées.

Les autres précautions de lieu

LIEU	VERDICT	RAISON
Lisière de bois, friche, pied de haie éloigné des cultures	OUI	Situation idéale
Abords d'un compost ou d'un ancien tas de fumier	PRUDENCE	C'est là qu'elle pousse le mieux, mais elle y accumule des nitrates. Consommation occasionnelle sans problème, pas quotidienne
Bord de route	NON	Dépôts métalliques sur des feuilles velues, impossibles à laver
Bordure de parcelle cultivée	NON	Dérive de pulvérisation
Prairie humide pâturée ou bord de ruisseau en zone d'élevage	NON, OU CUISSON OBLIGATOIRE	Risque de douve du foie : voir chapitre 6. L'ortie n'est pas aquatique mais peut être éclaboussée en zone inondable
Zone fréquentée par les chiens	NON	Vaut pour toute cueillette à hauteur de patte, en particulier en milieu périurbain

5.3 — Ortie : geste, conservation, préparation

Le matériel et le geste

1 Gants et ciseaux, ou la technique à main nue

Des gants de jardinage épais et une paire de ciseaux suffisent. Pour ceux qui préfèrent la main nue : les poils urticants pointent vers le haut et l'extérieur ; une saisie ferme **de bas en haut**, en remontant le long de la tige, les couche sans les briser. La méthode fonctionne, mais elle demande de l'assurance : une hésitation et l'on pique.

2 Couper les 15 à 25 premiers centimètres au printemps

Sur une jeune pousse non fleurie, la tige entière est tendre. Couper franchement, en laissant au moins deux paires de feuilles à la base pour la repousse.

3 Ne prendre que les feuilles terminales en été

Sur une plante développée, pincer les 4 à 6 dernières feuilles du sommet. Elles sont toujours jeunes, quelle que soit la date.

4 Ne pas tasser dans le sac

Un sac en tissu ou un panier aéré. Tassées dans un sac plastique, les orties chauffent, noircissent et prennent une odeur ammoniacée en deux heures — c'est le début de la fermentation, exactement le processus du purin d'ortie.

5 Trier à la maison avant lavage

Retirer les tiges dures, les feuilles piquées d'insectes, les débris. Puis rincer à l'eau froide, sans faire tremper.

Conservation

MÉTHODE	DURÉE	DÉTAIL
Fraîche au réfrigérateur	2 à 3 jours	Dans un linge humide, en boîte. Au-delà, les feuilles noircissent par les bords
Blanchie puis congelée	10 à 12 mois	30 secondes à l'eau bouillante, refroidissement immédiat à l'eau glacée, essorage à la main, mise en portions. La méthode la plus utile : la récolte de printemps couvre l'année
Séchée	12 mois	À l'ombre, en bouquets suspendus ou à plat, 3 à 5 jours. Pour les tisanes et la poudre à saupoudrer
Pesto, soupe, quiche	Le jour même	Toutes les préparations détruisent les poils urticants
Purin pour le jardin	—	C'est la destination des feuilles âgées et fleuries, qu'on ne consomme pas : 1 kg de feuilles pour 10 L d'eau, 8 à 15 jours, dilution à 10 % en arrosage

LE FLÉTRISSEMENT DE DOUZE HEURES

Une astuce peu connue : des orties laissées étalées douze heures à l'air libre perdent totalement leur pouvoir urticant, les ampoules de silice se vidant en se desséchant. On peut alors les manipuler à main nue et même les consommer crues, finement ciselées. C'est la seule façon de faire une salade d'orties fraîches.

Ce qu'on en fait

PRÉPARATION	QUANTITÉ POUR 4	NOTE
Soupe	300 g de feuilles	Avec pomme de terre et oignon. La recette la plus classique et la plus tolérante
Pesto	150 g	Blanchir 30 s, mixer avec huile, ail, parmesan et graines de tournesol
Quiche, gratin	400 g	Remplace parfaitement l'épinard, avec plus de caractère
Gnocchis, pâtes vertes	200 g	Bien essorer, sinon la pâte ne tient pas
Tisane	1 c. à s. sèche	Infusion 10 minutes

6

Les légumes

Quatre espèces où l'heure de récolte compte plus que partout ailleurs, et un cas — le cresson — qui demande un avertissement sanitaire sérieux.

-
- 6.1 — Laitue et salades
 - 6.2 — Cresson de fontaine
 - 6.3 — Cresson : le risque de douve du foie
 - 6.4 — Carotte
 - 6.5 — Radis




Laitue et salades

Lactuca sativa

LÉGUME-FEUILLE • LA PLUS SENSIBLE À L'HEURE

PERTE À 14 H

-25 %



C'est la production emblématique de la plaine de Montesson, à deux kilomètres d'ici, et c'est aussi le légume où l'heure de coupe fait la différence la plus spectaculaire. En plein champ, la saison va de mai à octobre ; sous tunnel, elle couvre pratiquement toute l'année, avec un creux en décembre et janvier.

MEILLEURE HEURE

5 h 30 – 8 h 30

Turgescence maximale : c'est la seule fenêtre qui vaille

ACCEPTABLE

20 h – 21 h

Après récupération du soir, nettement moins bon que le matin

À ÉVITER

11 h – 18 h

Perte de turgescence partiellement irréversible

Pourquoi l'heure compte autant

Une laitue est constituée à **95 % d'eau** maintenue sous pression dans les vacuoles. Cette pression, la turgescence, est ce qui donne le croquant. Dès que la transpiration foliaire dépasse l'absorption racinaire — ce qui arrive dès 9 ou 10 h en été — la pression tombe et la feuille s'affaisse.

Le point clé : **cette perte est partiellement irréversible**. Une laitue coupée déjà flasque peut être réhydratée dans l'eau froide, mais elle ne retrouvera que 70 à 80 % de son croquant initial, et elle se conservera nettement moins longtemps. Une laitue coupée turgescence et refroidie tout de suite garde sa tenue une semaine.

95 %

D'EAU DANS UNE FEUILLE

-25 %

DE TURGESCECE À 14 H

4 h – 7 h

COUPE DES MARAÎCHERS

+3 j

DE CONSERVATION GAGNÉS

Le jour J

INDICATEUR	TROP TÔT	À POINT	TROP TARD
Fermeté de la pomme	Molle, feuilles écartées	Résiste légèrement à une pression douce du plat de la main	Dure comme une balle : la montaison est amorcée à l'intérieur
Aspect du cœur	Encore ouvert	Fermé, bien blanchi	Une tige commence à pousser au centre
Latex à la coupe	Peu abondant	Blanc, fluide	Très abondant et amer : signe de montaison
Feuilles extérieures	Vertes	Vertes, saines	Jaunissantes ou tachées

Le geste et l'après

1 Couper au ras du sol, d'un coup net

Un couteau bien aiguisé, une seule passe. Une coupe déchiquetée brunit en quelques heures. Ne pas arracher : la motte de terre salit tout le reste de la récolte.

2 Rincer immédiatement la coupe

Le latex blanc qui perle s'oxyde à l'air et brunit le trognon en deux heures. Un passage rapide sous l'eau froide, ou une seconde coupe en biseau une fois à la maison, règle complètement le problème.

3 Retirer les deux feuilles extérieures sur place

Elles sont souvent terreuses ou abîmées et elles serviront de compost. Cela évite de salir le reste et allège le lavage.

4 Ne jamais poser au soleil

Même deux minutes. Poser à l'ombre, feuilles vers le bas, ou couvrir d'un linge humide.

5 Bain froid de trois minutes à la rentrée

On évacue la chaleur de champ et on restaure une partie de la turgescence. Essorer ensuite soigneusement : l'eau résiduelle entre les feuilles fait pourrir.

6 Stocker en boîte avec un linge

Boîte hermétique, un torchon propre au fond pour absorber l'excès d'humidité, au bac à légumes. Sept à dix jours pour une laitue coupée le matin, trois à quatre pour la même coupée l'après-midi.

Les autres salades

ESPÈCE	SAISON	HEURE	SPÉCIFICITÉ
Laitue pommée, batavia	Mai – oct.	5 h 30 – 8 h 30	Référence
Feuille de chêne, à couper	Avr. – oct.	5 h 30 – 8 h 30	Se récolte feuille à feuille : le pied repousse 3 à 4 fois
Roquette	Mars – mai, sept. – oct.	6 h – 9 h	Monte à graine dès que les jours s'allongent : pas de créneau estival
Mâche	Oct. – mars	11 h – 14 h	Exception hivernale : on attend le dégel complet, sinon les feuilles gelées s'écrasent
Chicorée, scarole, frisée	Sept. – déc.	8 h – 11 h	Plus robuste, tolère une récolte plus tardive
Épinard	Avr. – juin, sept. – nov.	6 h – 9 h	Aussi sensible que la laitue ; ne jamais laisser plus de 30 min hors du frais




Cresson de fontaine

Nasturtium officinale

SEMI-AQUATIQUE · CULTURE EN CRESSONNIÈRE

PLEINE SAISON

décembre



Le cresson de fontaine est une plante semi-aquatique dont seules les racines sont immergées. Il lui faut une eau claire, peu profonde, à courant lent et à température constante — c'est-à-dire une eau de source. Cette exigence explique une géographie très particulière : en Île-de-France, la production se concentre dans le **sud de l'Essonne**, dans les vallées de la Juine, de l'École et de la Chalouette.


UNE PRÉCISION GÉOGRAPHIQUE

Il n'y a pas de cressonnière à Montesson ni dans la boucle de Seine. La plaine de Montesson produit de la **salade**, sur sols sableux drainants. La cressiculture demande des vallées à fond plat alimentées par des sources et des puits artésiens, une géologie qu'on trouve à Méréville, à environ soixante-cinq kilomètres au sud de Chatou.

La cressiculture en Île-de-France

Cressonnière traditionnelle — fosses alimentées en eau de source, pente 1 à 3 cm/m

Semis en juillet · première coupe 5 à 6 semaines après · puis tous les 25 jours



Coupe d'une cressonnière traditionnelle. Les fosses sont décaissées à même la terre, avec une pente faible qui assure un écoulement lent et constant.

DONNÉE	VALEUR
Première région productrice	Île-de-France
Surfaces cultivées en région	~23 hectares
Part de l'Essonne dans la production nationale	30 à 40 %
Dimensions d'une fosse	2 à 3 m × 50 à 80 m
Profondeur, pente	30 à 40 cm, 1 à 3 cm/m
Hauteur d'eau	6 à 7 cm
Semis	Juillet
Première coupe	5 à 6 semaines après le semis
Coupes suivantes	Environ tous les 25 jours
Nombre de coupes par fosse et par saison	5 à 6
Poids d'une botte	~350 g

La culture du cresson à Méréville est inscrite à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, et une démarche collective vise l'obtention d'une indication géographique protégée. La récolte reste presque entièrement manuelle : elle se fait au couteau, dans l'eau, en cuissardes.

MEILLEURE HEURE

7 h – 9 h

Turgescence maximale : le cresson flétrit encore plus vite qu'une laitue

ACCEPTABLE

18 h – 19 h

Acceptable en saison froide

À ÉVITER

11 h – 17 h

Tiges creuses qui se vident : la reprise est impossible

6.2 (suite) — Cresson : saison, achat, conservation

Quand il est le meilleur

Les coupes sont possibles d'août à juin, mais la qualité varie fortement. La **pleine saison est d'octobre à avril**, avec un optimum reconnu en **décembre**. Ce n'est pas un hasard :

- **Le froid concentre les composés soufrés.** Le piquant caractéristique du cresson vient de glucosinolates transformés en isothiocyanates. Leur teneur augmente en saison froide : le cresson d'hiver est plus typé que celui de fin d'été.
- **La croissance ralentit.** Une tige qui pousse lentement est plus dense, plus riche en matière sèche, moins aqueuse.
- **Pas de montaison.** Dès que les jours s'allongent, le cresson fleurit : les tiges durcissent et deviennent fibreuses. C'est la fin de la saison, en mai-juin.

Le jour J, pour qui en cultive

INDICATEUR	À POINT
Hauteur	15 à 20 cm au-dessus de l'eau
Feuilles	Vert foncé, larges, charnues, sans jaunissement à la base
Tiges	Fermes et cassantes ; si elles plient sans casser, elles sont fibreuses
Fleurs	Aucune. Les petites fleurs blanches en croix signalent la fin de la coupe
Goût	Piquant franc et frais. Un goût amer signale une tige trop âgée

Acheter du cresson

CRITÈRE	BON SIGNE	MAUVAIS SIGNE
Aspect général	Botte serrée, feuilles dressées	Feuilles retombées, botte molle
Couleur	Vert foncé uniforme	Jaunissement à la base des tiges
Tiges	Cassantes, gorgées d'eau	Souples, creuses, fibreuses
Odeur	Fraîche, poivrée	Odeur de vase ou de renfermé
Origine	Cressonnière identifiée, circuit court	Origine non précisée

LE CRESSON NE SE STOCKE PAS

C'est un produit qui se vend et se consomme frais : les cressiculteurs eux-mêmes ne le stockent pas. À la maison, compter **deux à trois jours maximum**, tiges plongées dans un verre d'eau comme un bouquet, au réfrigérateur, ou enveloppé dans un linge humide. Au-delà, il jaunit et perd tout son piquant.

Ne pas confondre avec le cresson alénois

CRITÈRE	CRESSON DE FONTAINE	CRESSON ALÉNOIS
Nom latin	<i>Nasturtium officinale</i>	<i>Lepidium sativum</i>
Milieu	Aquatique, racines dans l'eau courante	Terrestre, culture en terre ou sur coton
Feuilles	Arrondies, charnues, composées	Fines, découpées, en jeunes pousses
Goût	Piquant frais	Plus âcre et poivré
Risque de doute	OUI SI SAUVAGE	AUCUN
Usage	Salade, soupe, potage	Condiment, germes, décoration


6.3 — Cresson : le risque de douve du foie

C'est le seul avertissement réellement sérieux de ce guide. Il ne concerne pas le cresson acheté en cressonnière, mais le cresson sauvage cueilli au bord d'une eau — une pratique courante et qui expose à une parasitose bien réelle en France.

LA RÈGLE EN UNE PHRASE

On ne consomme jamais cru un végétal récolté dans ou au bord d'une eau susceptible d'avoir traversé une zone pâturée. Seule une cuisson à cœur détruit le parasite. Ni le lavage, ni le vinaigre, ni le froid, ni le séchage ne fonctionnent.

Le parasite et son cycle



Cycle de *Fasciola hepatica*. Le végétal n'est pas infecté : il sert de support aux kystes, qui s'y fixent et y survivent plusieurs mois.

Fasciola hepatica, la grande douve du foie, est un ver plat parasite dont le cycle passe obligatoirement par deux hôtes : un ruminant — bovin, ovin, caprin — et un petit escargot d'eau douce, la limnée tronquée. Les œufs sont éliminés dans les déjections du bétail ; s'ils atteignent une eau stagnante ou à courant lent, ils éclosent et infestent la limnée. Les larves qui en sortent nagent, puis **s'enkystent sur les végétaux** émergeant de l'eau. Le kyste, appelé métacercaire, y reste viable plusieurs mois.

L'être humain se contamine en mangeant ces végétaux crus. En France, le cresson sauvage est de très loin l'aliment le plus fréquemment en cause : on estime à environ **trois cents le nombre de cas annuels**. C'est peu à l'échelle du pays, mais c'est une maladie longue et pénible, et elle est entièrement évitable.

Les autres plantes concernées

PLANTE	RISQUE	CONTEXTE
Cresson de fontaine sauvage	ÉLEVÉ	Premier véhicule de la fasciolose en France
Berle, ache, menthe aquatique	ÉLEVÉ	Même milieu, même exposition
Pissenlit de prairie humide	MODÉRÉ	Si la prairie est inondable et pâturée
Mâche sauvage, patience, salicaire des zones humides	MODÉRÉ	Idem
Cresson cultivé en cressonnière	TRÈS FAIBLE	Cultures suivies et contrôlées, eau de source captée. Une contamination reste possible à titre exceptionnel en cas d'inondation de la parcelle
Cresson alénois, cultivé en terre	NUL	Pas de contact avec l'eau libre

Ce qui marche et ce qui ne marche pas

MÉTHODE	EFFICACE ?	EXPLICATION
Cuisson à cœur	OUI	Le kyste est détruit par la chaleur. Soupe, potage, poêlée : aucun risque
Lavage à grande eau	NON	Le kyste est fixé à la surface, il ne part pas au rinçage
Vinaigre, jus de citron	NON	Aucun effet sur la paroi du kyste
Eau javellisée, permanganate	NON	Inefficace aux concentrations utilisables en alimentaire
Congélation domestique	NON FIABLE	Contrairement à d'autres parasites, la résistance au froid est bonne
Séchage	NON	Le kyste survit à la dessiccation partielle

IL N'EXISTE AUCUN PROCÉDÉ D'ASSAINISSEMENT D'UN VÉGÉTAL CONTAMINÉ

C'est la position des autorités sanitaires françaises : une fois les kystes fixés, on ne peut pas « nettoyer » la plante. La seule décision possible est binaire : **cuire, ou ne pas consommer**.

6.3 (suite) — Reconnaître une situation à risque

La grille de décision

SITUATION	CRU ?	CUIT ?
Cresson acheté en cressonnière ou chez un producteur identifié	OUI	OUI
Cresson de grande surface, origine France	OUI	OUI
Cresson sauvage, ruisseau en forêt, aucun élevage en amont connu	DÉCONSEILLÉ	OUI
Cresson sauvage, cours d'eau traversant des pâtures	NON	OUI
Cresson sauvage, origine du cours d'eau inconnue	NON	OUI
Plantes de prairie inondable pâturée	NON	OUI

La difficulté pratique est qu'on ne connaît presque jamais le parcours complet d'un cours d'eau en amont d'un point de cueillette. Un ruisseau qui paraît traverser un bois peut avoir traversé une pâture deux kilomètres plus haut. C'est pourquoi la règle prudente, et celle que retiennent la plupart des cueilleurs expérimentés, est simple : **tout cresson sauvage se cuit**. Ce n'est pas une privation : le velouté de cresson est probablement sa meilleure préparation.

Ce que la maladie provoque

Ces informations sont données à titre d'information générale et ne remplacent pas un avis médical. La fasciolose évolue en deux phases :

PHASE	DÉLAI	MANIFESTATIONS RAPPORTÉES
Incubation	1 à 2 semaines	Silencieuse
Phase aiguë migration des jeunes douves vers le foie	2 à 3 mois	Fièvre, fatigue, douleurs de la région hépatique, nausées, douleurs articulaires et musculaires, réactions allergiques, forte hyperéosinophilie sanguine
Phase chronique douves installées dans les voies biliaires	Mois à années	Douleurs épigastriques, nausées, intolérance aux graisses, inflammation et obstruction des canaux biliaires, ictère, anémie

La sévérité dépend directement du nombre de kystes ingérés. Chez l'humain, qui est un hôte mal adapté pour ce parasite, beaucoup d'infections restent discrètes et ne sont découvertes qu'incidemment. Il existe un traitement spécifique ; le diagnostic repose sur la sérologie et sur le contexte alimentaire, ce qui rend important de **mentionner une consommation de cresson sauvage à son médecin** en cas de symptômes de ce type dans les mois qui suivent.

UNE REMARQUE DE PROPORTION

Trois cents cas par an dans un pays de soixante-huit millions d'habitants, ce n'est pas une raison de renoncer à la cueillette sauvage. C'est une raison d'appliquer une règle simple, qui ne coûte rien : **ce qui pousse dans l'eau se mange cuit**. Tout le reste du guide — mûres, prunelles, orties de lisière, myrobolans — ne présente aucun risque de ce type.




Carotte

Daucus carota subsp. sativus

RACINE • MEILLEURE APRÈS LES GELÉES

GAIN DE SUCRE AU FROID

+15 à 20 %



La carotte a la particularité d'être le seul légume du guide dont la qualité **s'améliore avec le froid**. Les premières gelées déclenchent une conversion de l'amidon en sucres solubles — un mécanisme de cryoprotection, les sucres abaissant le point de congélation de la sève. Les carottes de novembre et décembre sont mesurablement plus sucrées que celles d'août.

MEILLEURE HEURE

6 h – 10 h

Sol ressuyé par la nuit : la racine vient entière sans casser

ACCEPTABLE

18 h – 20 h

Correct si le sol a été arrosé dans la journée

À ÉVITER

13 h – 17 h

Sol dur et sec : la racine casse et la plaie fait pourrir

Le jour J

TYPE	DURÉE DEPUIS SEMIS	DIAMÈTRE AU COLLET	INDICATEUR VISUEL
Primeur, botte	70 à 90 jours	1,5 à 2,5 cm	Le collet affleure et commence à verdir légèrement
Consommation courante	100 à 130 jours	3 à 4 cm	Collet bien sorti, épaules larges et colorées
Conservation	140 à 180 jours	4 à 6 cm	Fanes qui commencent à jaunir, après la première gelée

Le meilleur indicateur reste le plus simple : **dégager la terre au doigt autour d'un collet** et regarder le diamètre. C'est gratuit, immédiat et sans risque pour la plante : on rebouche et on attend si c'est trop tôt.

Le geste, et pourquoi il rate si souvent

- 1 Arroser la veille au soir si le sol est sec**
Dix litres par mètre carré. Une carotte arrachée en terre sèche casse à mi-longueur presque systématiquement, et la partie restée en terre pourrit.
- 2 Décompacter avant de tirer**
Enfoncer une fourche-bêche à dix centimètres du rang et soulever légèrement, sans retourner. La terre se fissure et libère les racines.
- 3 Tirer par le collet, pas par les fanes**
Saisir la base des fanes au ras de la racine, tirer verticalement en tournant très légèrement. Tirer par le haut des fanes les arrache et laisse la carotte en terre.

4

Couper les fanes immédiatement

C'est l'étape la plus souvent oubliée, et la plus coûteuse. Les fanes continuent de transpirer en pompant l'eau de la racine : une carotte gardée avec ses fanes se ride trois fois plus vite. Couper à un centimètre du collet, sans entamer la chair.

5

Ne pas laver pour le stockage

Brosser la terre sèche à la main. Laver ouvre les lenticelles et raccourcit fortement la conservation. On lave au moment de cuisiner.

Conservation

MÉTHODE	DURÉE	CONDITIONS
En terre, sous paillage	Jusqu'en février	Vingt centimètres de paille ou de feuilles mortes sur le rang. On prélève au fur et à mesure. La meilleure méthode : la carotte continue de sucrer et ne se ride pas
Silo de sable	4 à 6 mois	Caisse de sable légèrement humide, cave à 2-8 °C, carottes non lavées sans contact entre elles
Réfrigérateur	3 à 5 semaines	Fanes coupées, sac percé, bac à légumes
Congélation	10 mois	Blanchir 3 minutes en rondelles avant de congeler
Avec fanes	2 jours	À éviter, sauf pour la présentation le jour même

LE GAIN DU FROID, EN CHIFFRES

Une carotte récoltée en septembre titre 6 à 7 °Brix. La même variété laissée en terre jusqu'après deux ou trois gelées monte à **8 à 9 °Brix**. C'est un écart parfaitement perceptible en bouche, et il ne coûte rien : il suffit de ne pas récolter trop tôt et de pailler le rang.




Radis

Raphanus sativus

RACINE • LA FENÊTRE LA PLUS COURTE DU GUIDE

FENÊTRE DE TIR

4 à 6 jours



Le radis pousse en dix-huit à vingt-cinq jours en été, trente à quarante au printemps, et il se gâte en moins d'une semaine. C'est le légume qui punit le plus sévèrement le retard : passé la fenêtre, il devient creux, spongieux et violemment piquant. Comme vu dans les guides précédents, il ne faut pas le semer en juin-juillet : au-dessus de 25 °C il monte à graine avant d'avoir formé sa racine.

MEILLEURE HEURE

6 h – 9 h

Sol frais, racine gorgée d'eau, piquant à son minimum

ACCEPTABLE

19 h – 20 h

Correct après une journée couverte

À ÉVITER

12 h – 17 h

Racine déshydratée : piquant maximal et texture cotonneuse

Pourquoi l'heure change son goût

Le piquant du radis vient de **glucosinolates**, stockés intacts dans les cellules. Quand la cellule est brisée — à la morsure — une enzyme les transforme en isothiocyanates, les molécules qui piquent. Deux effets se conjuguent au fil de la journée :

- **La déshydratation concentre.** Une racine qui a perdu 10 % de son eau en milieu de journée a mécaniquement 10 % de glucosinolates en plus par gramme.
- **Le stress hydrique en fait produire davantage.** Ces composés font partie de la défense de la plante : leur synthèse augmente sous contrainte, chaleur ou sécheresse.

D'où un résultat facile à vérifier soi-même : un radis du même rang, récolté à 7 h puis à 15 h, n'a pas le même goût. Celui de l'après-midi pique nettement plus.

Le jour J

INDICATEUR	TROP TÔT	À POINT	TROP TARD
Diamètre au collet	< 1,5 cm	2 à 2,5 cm pour un rond, 1,5 à 2 cm pour un demi-long	> 3 cm
Épaules hors de terre	Invisibles	Bien dégagées, colorées	Craquelures visibles sur les épaules
Fanes	Petites	Dressées, vert franc	Une tige florale s'élève au centre
Fermeté au toucher	Molle	Ferme et pleine	Légère, un peu molle : elle est creuse

LA FENÊTRE DE QUATRE JOURS

Il n'y a pas de rattrapage. Un radis laissé quatre jours de trop devient **creux** : la racine continue de grossir alors que le p  riderme ne suit plus, et il se forme une cavit   centrale spongieuse. Le go  t devient   cre. C'est irr  versible. En pleine saison, il faut passer tous les deux jours et r  colter au fur et    mesure, pas d'un coup.

Le geste et la suite

1 Arroser copieusement la veille au soir

C'est ce qui fait la diff  rence entre un radis croquant et un radis fibreux. Le radis a besoin d'une humidit   r  guli  re ; les   coups d'arrosage sont la premi  re cause de piquant excessif et de racines creuses.

2 Tirer d'un coup sec, verticalement

Le radis vient sans effort en sol frais. En sol sec, on casse les fanes.

3 Couper les fanes tout de suite

M  me raison que pour la carotte : elles pompent l'eau de la racine. Un radis en botte se ramollit en une journ  e, un radis   queut   tient une semaine.

4 Bain d'eau froide de cinq minutes

Il   vacue la chaleur de champ et redonne du croquant. Puis essorage et bo  te au frais.

5 Ne pas jeter les fanes

Elles sont comestibles et excellentes en soupe ou en pesto,    condition d'  tre jeunes et non tach  es. Les utiliser le jour m  me : elles fl  trissent tr  s vite.

18    25 j

DU SEMIS    LA R  COLTE EN
  T  

4    6 j

DE FEN  TRE OPTIMALE

2 j

ENTRE DEUX PASSAGES

7 j

DE CONSERVATION, FANES
COUP  ES

7

Le top 20 d'Île-de-France

Vingt espèces majeures de la région, en fiches condensées : période, jour J, heure et indicateur clé. Chacune est rattachée à sa variété patrimoniale francilienne quand elle existe — plus de trois cents variétés portent le nom d'une commune de la région.

-
- 7.1 — Les six fruits
 - 7.2 — Les quatre légumes de printemps
 - 7.3 — Les six légumes d'été
 - 7.4 — Les quatre légumes d'automne et d'hiver
 - 7.5 — Les grands absents du classement

7.1 — Les six fruits

Six espèces fruitières qui comptent en Île-de-France, en plus des prunes, poires, pommes, framboises et mûres détaillées au chapitre 4.

01 Fraise *Fragaria × ananassa*

Fraise de Paris

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Rouge sur 100 % de la surface,
collerette relevée

MEILLEURE HEURE

8 h – 10 h

INDICATEUR CLÉ

Aucun blanc sous la collerette

Pourquoi. La fraise est strictement non climactérique : le sucre ne monte plus d'un dixième après la cueillette. Une fraise ramassée blanche à l'épaule le restera. Elle contient 90 % d'eau et respire intensément : à 25 °C elle perd en trois heures ce qu'elle perdrait en un jour à 5 °C. C'est le fruit où l'heure de cueillette compte le plus.

Comment. Pincer le pédoncule à un centimètre entre l'ongle du pouce et l'index, sans jamais tirer sur le fruit : la chair se déchire et le jus attire la pourriture grise. Deux couches maximum dans la barquette, et surtout **ne jamais laver avant stockage**.

02 Cerise *Prunus avium* et *P. cerasus*

Cerise de Montmorency

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Couleur pleine, fermeté qui
commence à céder

MEILLEURE HEURE

7 h – 10 h

INDICATEUR CLÉ

Le pédoncule quitte la branche, pas
le fruit

Pourquoi. Non climactérique également : chaque jour laissé sur l'arbre apporte environ un demi-degré Brix, jusqu'au point de rupture. Ce point, c'est la pluie : une cerise mûre absorbe l'eau par la peau et éclate en quelques heures. **Ne jamais récolter dans les vingt-quatre heures qui suivent une averse**, et vider l'arbre si une pluie est annoncée.

Comment. Cueillir impérativement avec le pédoncule : une cerise équeutée s'oxyde par la plaie et tient à peine vingt-quatre heures. Tirer la queue vers le haut en la faisant pivoter, sans arracher le dard porteur qui produira les fruits de l'année suivante.

03 Groseille et cassis *Ribes rubrum, R. nigrum*

—

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Huit à dix jours *après la coloration*
complète

MEILLEURE HEURE

9 h – 11 h

INDICATEUR CLÉ

Les grains du bout de grappe sont
colorés


Pourquoi. C'est l'erreur la plus répandue : on récolte dès que c'est rouge, donc trop tôt, donc acide, et on en conclut que la groseille est acide par nature. L'acidité chute de moitié pendant les dix derniers jours, pendant lesquels la couleur ne bouge plus du tout. Le bon repère n'est donc pas la couleur mais **les grains de l'extrémité de la grappe**, qui mûrissent les derniers.

Comment. Cueillir la grappe entière par son pédoncule, jamais grain par grain : chaque grain crevé fermente et contamine les voisins. Pour le cassis, un peigne à myrtilles divise le temps de récolte par trois sans dégâts notables.

04 Raisin de table *Vitis vinifera*

Chasselas de Thomery

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Rafle brunie et lignifiée, pépins bruns

MEILLEURE HEURE

10 h – 12 h

INDICATEUR CLÉ

16 à 18 °Brix au réfractomètre


Pourquoi. Le raisin est le cas le plus tranché de fruit non climactérique : il ne contient aucune réserve d'amidon, tout son sucre lui vient de la feuille jusqu'à la seconde où on le coupe. Une grappe cueillie trop tôt restera acide toute sa vie. La rafle qui brunit signale que les échanges avec la plante sont terminés : c'est le seul indicateur fiable.

Comment. Sécateur, en gardant deux centimètres de rafle, et on tient la grappe par cette rafle et jamais par les grains : la pruine, cette pellicule cireuse blanchâtre, est la protection naturelle du fruit. Attendre que la rosée soit évaporée, sans quoi la grappe pourrit par l'intérieur en trois jours.

05 Coing *Cydonia oblonga*

—

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Jaune uniforme, duvet qui s'efface au
doigt

MEILLEURE HEURE

10 h – 14 h

INDICATEUR CLÉ

Parfum perceptible à un mètre de
l'arbre

Pourquoi. Le coing est climactérique et se cueille donc dur, pour finir de mûrir deux à quatre semaines en cave. La vraie contrainte est le gel : en dessous de -3 °C la chair brunit et le fruit est perdu. En boucle de Seine la première gelée tombe autour du 8 novembre, ce qui donne une marge confortable mais pas illimitée.

Comment. Cueillir à la main en soulevant, jamais en gaulant : la moindre meurtrissure noircit et se propage. Manipuler comme un œuf malgré la dureté apparente. **Stocker à l'écart des autres fruits** : le coing dégage énormément d'éthylène et ferait mûrir toute la cave en une semaine.

06 Noix *Juglans regia*



J F M A M J J A S O N D



JOUR J

**Quand 80 % des noix sont tombées
seules**

MEILLEURE HEURE

9 h – 12 h

INDICATEUR CLÉ

**Le brou se fend et s'ouvre
spontanément**

Pourquoi. Deux récoltes distinctes pour la même espèce. Fin juin, la noix verte entière se cueille pour le vin de noix, traditionnellement à la Saint-Jean, quand la coque interne n'est pas encore formée — on doit pouvoir la traverser à l'aiguille. En septembre-octobre, la noix sèche se ramasse au sol : l'arbre trie lui-même, le brou ne se fend que sur les fruits aboutis.

Comment. Ramasser tous les deux jours sur sol ressuyé, jamais après la pluie. Débrouiller le jour même : le brou tache indélébiment et fait rancir l'amande. Sécher deux à trois semaines en cagette, en une seule couche, dans un local ventilé : l'humidité doit passer de 25 % à 8 % pour une conservation d'un an.

7.2 — Les quatre légumes de printemps

Ce sont les quatre espèces où l'erreur de timing coûte le plus cher : leurs fenêtres se comptent en jours, parfois en heures pour l'asperge.

07 Asperge *Asparagus officinalis*

Asperge d'Argenteuil

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Turion de 18 à 22 cm, pointe encore serrée

MEILLEURE HEURE

6 h – 8 h

INDICATEUR CLÉ

La pointe ne doit pas être ouverte

Pourquoi. L'asperge est le légume le plus urgent du potager : en pleine saison, par temps chaud, un turion pousse de **cinq à quinze centimètres par jour**. Un jour de retard donne une pointe ouverte et une base fibreuse. La lignification démarre à l'instant où la pointe s'écaille, et elle continue après la coupe : d'où l'heure très matinale, qui permet de récolter un turion encore froid. **Arrêt impératif à la Saint-Jean**, le 24 juin : au-delà, la griffe n'a plus le temps de reconstituer ses réserves pour l'année suivante.

Comment. Gouge à asperge enfoncée le long du turion, section à trois ou cinq centimètres sous le collet sans blesser la griffe, puis rebouchage immédiat de la butte. Plonger les turions **debout** dans l'eau froide : couchés, ils se recourbent en deux heures par géotropisme.

08 Petit pois *Pisum sativum*

Petit pois de Clamart

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Gousse pleine mais encore vert vif

MEILLEURE HEURE

6 h – 9 h

INDICATEUR CLÉ

Grains jointifs sans être comprimés


Pourquoi. Le petit pois est le champion de la perte de qualité après récolte. Ses sucres se convertissent en amidon dès la séparation de la plante, et cette conversion va **six fois plus vite à 25 °C qu'à 5 °C**. Un pois cueilli à quatorze heures et écosé le soir a perdu près de la moitié de son sucre : c'est toute la différence entre le pois du jardin et celui du commerce. La fenêtre de récolte ne dépasse pas trois ou quatre jours.

Comment. Tenir la tige d'une main et détacher la gousse de l'autre : à une seule main, on arrache la tige. Écosser dans l'heure, ou refroidir immédiatement les gousses fermées. Cuire le jour même, ou blanchir et congeler dans les deux heures.

09 Épinard *Spinacia oleracea*

Monstrueux de Viroflay

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Feuilles de 12 à 18 cm, avant
montaison

MEILLEURE HEURE

6 h – 8 h 30

INDICATEUR CLÉ

L'entre-nœud central ne doit pas
s'allonger

Pourquoi. Comme toutes les feuilles, l'épinard se récolte au moment où sa turgescence est maximale, c'est-à-dire à l'aube après une nuit de réhydratation. Avec 92 % d'eau, il flétrit en deux heures à 25 °C, et ce flétrissement n'est que partiellement réversible. Second point de vigilance : la montaison, qui rend les feuilles amères en quatre jours à peine une fois l'allongement enclenché.

Comment. Deux écoles : couper feuille à feuille au ras du pétiole en laissant le cœur, ce qui donne trois à quatre coupes sur un même pied ; ou couper le pied entier à trois centimètres du sol, ce qui autorise une repousse complète. Bain d'eau froide de trois minutes, essorage, puis boîte hermétique.

10 Navet *Brassica rapa*

Navet de Croissy

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

12 à 15 cm de long pour le demi-long

MEILLEURE HEURE

7 h – 10 h

INDICATEUR CLÉ

Le collet affleure et le calibre est
atteint

Pourquoi. Le navet demi-long de Croissy est né à deux kilomètres d'ici, à Croissy-sur-Seine : racine blanche cylindrique et pointue, chair douce et sucrée, variété précoce qui résiste à la chaleur et ne creuse pas. Comme tous les navets, il devient fibreux et piquant au-delà du calibre optimal, par accumulation de glucosinolates : la fenêtre utile est d'une semaine environ. Le navet d'automne, lui, gagne nettement en douceur après une première gelée légère.

Comment. Arroser la veille au soir, puis tirer verticalement d'un geste franc. Couper les fanes immédiatement : elles pompent l'eau de la racine et la rendent molle en une journée. Conservation en cave dans du sable sec, plusieurs mois. Les jeunes fanes se mangent en soupe, le jour même.

7.3 — Les six légumes d'été

Trois d'entre eux — oignon, pomme de terre, et dans une moindre mesure la tomate de conservation — font exception à la règle du matin : ils demandent la chaleur et un sol sec.

11 Haricot vert *Phaseolus vulgaris*

Chevrier d'Arpajon

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Gousse ferme qui casse net, grains non dessinés

MEILLEURE HEURE

8 h – 11 h

INDICATEUR CLÉ

Feuillage parfaitement sec

Pourquoi. L'heure répond ici à une contrainte sanitaire autant qu'à une contrainte de qualité : manipuler un feuillage de haricot mouillé propage la graisse, une bactériose qui se transmet de pied en pied par simple contact humide. On attend donc que la rosée soit évaporée. Côté qualité, le point de non-retour est le dessin des grains sous la gousse : à partir de là, les fils se forment et rien ne revient en arrière.

Comment. Tenir la tige, pincer le pédoncule. Passer **tous les deux ou trois jours sans en sauter un seul** : chaque gousse laissée à grossir envoie à la plante le signal que la reproduction est faite, et la floraison s'arrête. C'est le récolteur assidu qui prolonge la production d'un mois.

12 Courgette *Cucurbita pepo*

—

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

15 à 20 cm, deux jours de fenêtre

MEILLEURE HEURE

8 h – 10 h

INDICATEUR CLÉ

L'ongle marque encore la peau sans effort


Pourquoi. Même logique que le haricot, en plus brutal : un seul fruit oublié et laissé grossir coûte environ deux semaines de production sur le pied entier, parce que la plante considère sa mission accomplie dès qu'une graine viable est en formation. Le test de l'ongle est infaillible : dès que la peau résiste, la courgette est déjà sur le versant fibreux. Passer tous les deux jours en pleine saison.

Comment. Couteau ou sécateur en laissant deux centimètres de pédoncule ; ne jamais arracher, la plaie sur la tige est une porte d'entrée pour l'oïdium. Les fleurs mâles se cueillent le matin, grandes ouvertes, en laissant toujours une fleur sur trois pour la pollinisation.

13 Tomate *Solanum lycopersicum*



J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Couleur pleine, pédoncule qui cède
au quart de tour

MEILLEURE HEURE

9 h – 12 h

INDICATEUR CLÉ

Souplesse légère près du pédoncule

Pourquoi. Climactérique : elle continue à rougir et à s'attendrir hors du pied, mais elle n'accumule plus de sucre. On peut donc cueillir au stade tournant si une pluie est annoncée — l'éclatement guette — sans grande perte gustative. La véritable erreur est ailleurs : **ne jamais réfrigérer une tomate**. En dessous de 12 °C, les composés volatils responsables de l'arôme sont détruits, et ils ne reviennent pas au réchauffement.

Comment. Soulever et pivoter d'un quart de tour. Conserver à 15–18 °C, pédoncule vers le bas pour éviter que le point d'attache ne s'affaisse. En fin de saison, récolter tout avant la première nuit à 5 °C et laisser mûrir à l'intérieur, dans le noir, avec une pomme pour accélérer.

14 Betterave *Beta vulgaris*



J F M A M J J A S O N D



JOUR J

6 à 8 cm de diamètre

MEILLEURE HEURE

7 h – 10 h

INDICATEUR CLÉ

L'épaule affleure au-dessus du sol

Pourquoi. La betterave monte régulièrement en sucre jusqu'à son calibre optimal, autour de douze à seize degrés Brix, puis la chair développe des cernes ligneux qui ne disparaîtront jamais à la cuisson. Le calibre est donc l'indicateur, pas l'âge. Une betterave de plus de dix centimètres est presque toujours fibreuse au cœur.

Comment. Point capital et souvent ignoré : **ne jamais couper les fanes à ras et ne pas blesser la peau**. On laisse trois centimètres de pétiole. Une betterave entamée « saigne » à la cuisson et rend une chair pâle et délavée au lieu du rouge profond attendu. Les jeunes fanes se cuisinent comme des blettes.

15 Oignon de garde *Allium cepa*

Oignon des Vertus

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Quand 50 à 70 % des fanes se
couchent seules

MEILLEURE HEURE

11 h – 16 h

INDICATEUR CLÉ

Le collet se dessèche naturellement

Pourquoi. Première des deux grandes exceptions horaires du guide : ici, **on veut la chaleur et un sol parfaitement sec**. Le ressuyage des tuniques externes exige du soleil, et un oignon rentré humide pourrit par le collet en cave. Autre point contre-intuitif : **ne jamais coucher les fanes à la main** pour hâter la récolte ; ce geste interrompt la migration des réserves vers le bulbe et divise la durée de conservation.

Comment. Arracher, puis laisser huit à dix jours à même le rang en plein soleil, en retournant les bulbes à mi-parcours. Puis deux semaines à l'abri, dans un local très ventilé. Tresser ou stocker en cagette : bien ressuyé, l'oignon des Vertus se garde jusqu'en avril.

16 Pomme de terre *Solanum tuberosum*



J F M A M J J A S O N D



JOUR J

**2 à 3 semaines après dessèchement
du feuillage**

MEILLEURE HEURE

11 h – 16 h

INDICATEUR CLÉ

**La peau ne s'enlève plus au
frottement du pouce**

Pourquoi. Seconde exception horaire. Le délai après la mort du feuillage n'est pas une facilité : c'est exactement le temps que met la peau à se subériser, c'est-à-dire à former la barrière qui empêchera la pourriture en cave. Une pomme de terre arrachée trop tôt se blesse au moindre contact et ne passe pas Noël. Le test du pouce est sans appel : si la peau se détache, il faut attendre.

Comment. Fourche-bêche plantée à vingt-cinq centimètres du pied. Laisser ressuyer deux heures au sol, **pas davantage** : au-delà, le soleil verdit les tubercules, ce qui signale la formation de solanine. Trier, ne jamais laver, et stocker dans une cave noire à six ou huit degrés.


7.4 — Les quatre légumes d'automne et d'hiver

En saison froide, toute la logique horaire s'inverse : on ne récolte plus à l'aube mais en milieu de journée, parce qu'un végétal gelé manipulé est un végétal perdu.

17 Poireau *Allium porrum*

Poireau de Gennevilliers

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Fût de 2 à 3 cm de diamètre

MEILLEURE HEURE

10 h – 15 h

INDICATEUR CLÉ

Aucune urgence : il se conserve en terre


Pourquoi. Le poireau est le légume le plus tolérant du guide : il n'a pas de jour J, il attend. Mieux, les variétés d'hiver gagnent en douceur après les gelées, par conversion d'une partie de leurs réserves en sucres solubles — le même mécanisme antigél que chez la carotte. La seule vraie contrainte est mécanique : **arracher un poireau pris dans une terre gelée casse le fût**. D'où l'heure tardive, quand le sol a dégelé.

Comment. Fourche-bêche à quinze centimètres, soulever puis tirer : tiré sec, le poireau se déchire au collet. Ne couper ni les racines ni le vert avant stockage, ce sont deux réserves d'eau. Trois semaines au frais, ou plusieurs mois en jauge dans du sable.

18 Chou pommé et chou de Milan *Brassica oleracea*

Milan de Pontoise

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Pomme ferme sous la pression du pouce

MEILLEURE HEURE

10 h – 14 h

INDICATEUR CLÉ

Aucune fente au collet


Pourquoi. Le risque du chou n'est pas de récolter trop tôt mais trop tard : une pomme arrivée à maturité qui reçoit une forte pluie absorbe l'eau plus vite qu'elle ne peut s'étendre, et éclate. Une pomme fendue s'infecte en quelques jours. Surveiller donc après chaque épisode pluvieux d'automne. Le Milan de Pontoise, lui, s'améliore franchement après une gelée.

Comment. Couteau bien affûté sous la pomme, en laissant deux feuilles enveloppantes qui font office d'emballage naturel. **Laisser le trognon en terre** : il produit en six à huit semaines une couronne de petits choux secondaires, parfaitement comestibles.

19 Mâche *Valerianella locusta*

Mâche verte d'Étampes

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Rosette de 8 à 10 feuilles bien formée

MEILLEURE HEURE

11 h – 14 h

INDICATEUR CLÉ

La rosette doit avoir complètement dégelé


Pourquoi. La mâche est l'exception la plus stricte du guide. C'est une salade, donc en principe une récolte d'aube ; mais elle se récolte en plein hiver, et **une rosette manipulée alors qu'elle est gelée est irrécupérable** : les cristaux de glace percent les parois cellulaires, et la plante se transforme en bouillie au dégel, en moins de vingt-quatre heures. On attend donc le milieu de journée. Son goût, en revanche, s'améliore nettement après une gelée.

Comment. Couteau passé sous le collet pour prélever la rosette entière, qui tient bien mieux qu'effeuillée. Ne pas laver avant stockage : le sable se retire au dernier moment, en trois bains successifs d'eau froide sans jamais frotter.

20 Potiron et courges *Cucurbita maxima*

Potiron jaune de Paris

J F M A M J J A S O N D



JOUR J

Pédoncule liégeux et fendillé

MEILLEURE HEURE

11 h – 16 h

INDICATEUR CLÉ

L'ongle ne marque plus l'écorce, son creux

Pourquoi. Le pédoncule est **la seule barrière contre la pourriture** pendant tout l'hiver : une courge récoltée sans son pédoncule, ou dont le pédoncule se détache, ne se conserve pas au-delà de quelques semaines. Il doit être sec, liège, craquelé. Récolter impérativement avant la première gelée, qui abîme l'écorce et ouvre la porte aux moisissures.

Comment. Sécateur en conservant **cinq à dix centimètres de pédoncule en forme de T**. Puis ressuyage de dix jours à vingt ou vingt-cinq degrés : cette étape durcit l'écorce et convertit une partie de l'amidon en sucre — une courge mangée le jour de sa récolte est fade. Ensuite, cave sèche à douze ou quinze degrés, quatre à huit mois.

7.5 — Les grands absents du classement

Six espèces qui ont fait l'histoire maraîchère francilienne sans entrer dans le top 20, soit parce qu'elles ont quasiment disparu de la région, soit parce qu'elles relèvent d'une technique très particulière.

ESPÈCE	SAISON	HEURE	POURQUOI ELLE N'EST PAS DANS LE CLASSEMENT
Artichaut de Paris	Juin – oct.	7–10 h	Récolter quand les écailles du bas commencent à s'écarter, jamais après. Peu rustique en Île-de-France : il faut le pailler l'hiver, ce qui l'a fait disparaître des cultures commerciales régionales.
Champignon de Paris	Toute l'année	Indifférente	Cultivé en carrière souterraine à température constante : la notion d'heure de récolte n'a aucun sens. Se cueille quand le voile sous le chapeau est encore fermé.
Endive	Nov. – mars	Indifférente	Forcée à l'obscurité en cave ou en salle : même raison. La racine, elle, s'arrache au champ en novembre, après la première gelée.
Rhubarbe	Avril – juin	7–10 h	On ne coupe pas : on tire et on tourne le pétiole à la base, sinon le moignon pourrit et contamine la souche. Jamais plus d'un tiers des pétioles à la fois, et arrêt fin juin.
Sureau noir	Fleurs : mai–juin Baies : sept.	10–12 h	Les fleurs se cueillent en plein soleil, sèches, quand le parfum est le plus fort. Les baies ne se consomment jamais crues : elles contiennent un hétéroside cyanogène détruit par la cuisson.
Châtaigne	Oct. – nov.	9–12 h	Ramassage au sol uniquement, tous les deux jours. Test de l'eau impératif : les fruits qui flottent sont véreux ou creux. Peu présente en boucle de Seine, plus fréquente en forêt de Rambouillet ou de Montmorency.

Trois cents variétés portent le nom d'une commune

L'Île-de-France a été, pendant trois siècles, le premier bassin maraîcher d'Europe, nourri par la demande des Halles de Paris et par le fumier des chevaux de la capitale. Chaque village a sélectionné sa variété, et ces noms sont restés : plus de trois cents variétés potagères portent le nom d'une commune francilienne, Paris seule en revendiquant une cinquantaine.

Autour de la boucle de Seine

Navet de Croissy, laitue romaine ballon de Bougival, asperge d'Argenteuil, épinard monstrueux de Viroflay, oseille de Chambourcy. Toutes nées à moins de quinze kilomètres de Chatou.

Le reste de la région

Petit pois de Clamart, haricot chevrier d'Arpajon, cerise de Montmorency, cresson de Méréville, chou milan de Pontoise, oignon des Vertus, chasselas de Thomery, carotte de Meaux, poire de Groslay, mâche verte d'Étampes.

POURQUOI ÇA COMPTE POUR LA RÉCOLTE

Ces variétés ont été sélectionnées **pour ce climat précis** : sols alluviaux, gelées tardives d'avril, étés modérément chauds. Leurs dates de récolte correspondent aux fenêtres données dans ce guide sans correction, ce qui n'est pas le cas des variétés méridionales ou néerlandaises du commerce. C'est un argument pratique, pas seulement patrimonial.

8

Synthèses

Tout le guide ramené à quatre tables : le calendrier des douze mois, le classement par heure de récolte, la largeur des fenêtres de tir, et la sensibilité à la chaleur de champ. Puis la liste de contrôle à garder en tête avant de sortir.

-
- 8.1 — Le calendrier des douze mois
 - 8.2 — Toutes les espèces classées par heure
 - 8.3 — La largeur de la fenêtre de tir
 - 8.4 — Sensibilité à la chaleur de champ
 - 8.5 — La liste de contrôle

8.1 — Le calendrier des douze mois

Ce qu'il y a à récolter chaque mois autour de Chatou, et le rendez-vous à ne pas manquer — celui dont la fenêtre est si étroite qu'on la rate une année sur deux.

MOIS	À RÉCOLTER	LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Janvier	Mâche, poireau, chou de Milan, cresson (pleine saison), topinambour	Rien d'urgent. Récolter entre 11 h et 14 h , jamais sur végétal gelé.
Février	Mâche, poireau, chou, cresson, panais	Dernière quinzaine pour la mâche avant montaison. Le cresson est à son optimum gustatif.
Mars	Épinard, premières salades, cresson, poireau tardif	Vers le 20 mars : les premières orties , quinze à vingt centimètres, avant floraison.
Avril	Asperge (à partir du 10), épinard, laitue, radis, ortie	L'asperge démarre . Passage quotidien à partir du 15 : cinq à quinze centimètres de pousse par jour.
Mai	Asperge, fraise, petit pois, navet, radis, laitue, cerise (fin de mois)	La fraise et l'asperge en même temps , toutes deux à récolter tôt. Priorité à l'asperge : 6-8 h, puis la fraise 8-10 h.
Juin	Cerise, fraise, petit pois, groseille, courgette, laitue, ortie (2^e coupe)	Arrêt de l'asperge le 24 juin, Saint-Jean, sans exception. Et vers le 24 : noix vertes pour le vin de noix.
Juillet	Groseille, cassis, framboise, myrobolan, haricot, courgette, betterave, pomme de terre primeur	Passage tous les deux jours sur haricots et courgettes . Un fruit oublié arrête la production.
Août	Mûre (à partir du 5), mirabelle, prune rouge, framboise remontante, tomate, poire Williams, oignon	Le mois le plus dense. Mirabelle : huit à douze jours de fenêtre, deux ou trois secouages espacés de trois jours.
Septembre	Mûre, poire Conférence, pomme Reine des Reinettes, raisin, noix, tomate, courge	Poire Conférence du 10 au 25 : test du pédoncule tous les deux jours. Ne jamais la laisser mûrir sur l'arbre.
Octobre	Pomme Boskoop, poire Comice, coing, châtaigne, potiron, betterave, navet, noix	Boskoop du 1^{er} au 20 , test amidon-iode à l'appui : indice 4-5 pour la longue garde.
Novembre	Prunelle (après gelée), coing, poireau, mâche, chou, courge, endive	La prunelle après la première gelée , ou 48 h au congélateur. Tout rentrer avant la première nuit à -3 °C.
Décembre	Mâche, poireau, chou, cresson, endive	Le cresson est à son meilleur . Le froid concentre les glucosinolates : c'est le mois du goût maximal.

LES QUATRE DATES FIXES DE L'ANNÉE

20 mars : premières orties. 24 juin : arrêt de l'asperge et noix vertes. 5 août : ouverture des mûres. Première gelée, autour du 8 novembre : prunelles, et limite absolue pour les coings et les courges. Ces quatre dates ne bougent que de quelques jours d'une année sur l'autre, contrairement à toutes les autres.

8.2 — Toutes les espèces classées par heure

La table de référence du guide. Si vous ne devez en retenir qu'une, c'est celle-ci : elle donne pour chaque espèce la fenêtre horaire et la raison physiologique qui la justifie.

CRÉNEAU	ESPÈCES	CE QU'ON OPTIMISE
5 h 30 – 8 h 30	Laitue et salades, épinard, ortie, blette, herbes aromatiques, jeunes fanes	Turgescence maximale. La plante a réhydraté ses cellules toute la nuit ; c'est le seul moment où elle est pleine d'eau. La perte de turgescence n'est que partiellement réversible.
6 h – 8 h	Asperge	Turion encore froid, pointe serrée. La lignification démarre avec la chaleur et ne s'arrête plus.
6 h – 9 h	Petit pois, radis, navet, carotte, betterave, pomme de terre primeur	Sol encore souple et humide de la nuit : les racines sortent sans casser. Et pulpe froide, donc conversion des sucres ralentie.
7 h – 10 h	Cerise, rhubarbe, artichaut	Fruits et pétioles fragiles : on veut la fraîcheur sans la rosée résiduelle.
8 h – 11 h	Fraise, framboise, groseille, cassis, courgette, haricot vert	Le compromis fruit. La rosée est évaporée — indispensable, elle fait germer le <i>Botrytis</i> en trois heures — mais la chaleur de champ n'est pas encore installée.
9 h – 12 h	Tomate, prune, mûre, poire, pomme	Fruits à conserver : on veut le fruit sec et encore frais. Pour les fruits à pépins, le pédoncule cède mieux quand la plante n'est pas en stress hydrique.
10 h – 12 h	Raisin, sureau (fleurs), noix	Rosée complètement partie. Pour le sureau, le parfum des fleurs est maximal en plein soleil.
11 h – 16 h	Oignon, échalote, ail, pomme de terre de conservation, courge, prune	Les exceptions. Ces récoltes exigent chaleur et sol sec : ressuyage des tuniques, subérisation de la peau, ou simple dégel du fruit.
11 h – 14 h (hiver)	Mâche, poireau, chou, cresson, panais, topinambour	L'inversion hivernale. On attend le dégel complet : un végétal gelé manipulé voit ses parois cellulaires percer par les cristaux, et il se transforme en bouillie au réchauffement.
17 h – 20 h	Tous les fruits <i>destinés à être mangés le jour même</i>	Pic de concentration en sucres après une journée de photosynthèse : +1 à +2 °Brix par rapport au matin. Mais conservation divisée par deux ou trois.
11 h – 17 h (été)	Plage interdite pour tout le reste. Feuillage en déficit hydrique, pulpe à 30 °C ou plus, et chaque heure passée à cette température coûte environ un jour de conservation.	

8.3 — La largeur de la fenêtre de tir

Combien de jours séparent le « pas encore » du « trop tard ». C'est cette durée qui détermine la fréquence de passage, et donc l'organisation de la saison.

FENÊTRE	ESPÈCES	PASSAGE	CONSÉQUENCE D'UN RETARD
1 jour	Asperge en pleine saison	Quotidien	Pointe ouverte et base fibreuse : le turion est perdu pour la table
1 à 2 j	Framboise, courgette	Tous les 2 j	Framboise : fermentation sur pied. Courgette : arrêt de floraison du pied entier
2 à 3 j	Mûre, haricot vert, fraise	Tous les 2-3 j	Fils dans le haricot, fruits blets et pourriture grise pour les baies
3 à 4 j	Petit pois, radis	Tous les 2 j	Pois farineux, radis creux et âcre : irrécupérable dans les deux cas
4 à 7 j	Cerise, groseille, cassis, laitue, épinard	2 fois/semaine	Éclatement après pluie pour la cerise, montaison et amertume pour les feuilles
8 à 12 j	Prune rouge, mirabelle	3 passages échelonnés	Chute au sol : la mirabelle ne pardonne pas, d'où les secouages espacés de 3 à 4 jours
5 à 10 j	Poire	Tous les 2 j à l'approche	Chair granuleuse et cœur blet par anérobiose centrale : le fruit se gâte de l'intérieur
10 à 20 j	Pomme, tomate, betterave, chou	Hebdomadaire	Perte de conservation pour la pomme, cernes ligneux pour la betterave, éclatement pour le chou
3 à 6 sem.	Coing, potiron, oignon, pomme de terre, navet d'hiver	Une seule fois	La contrainte n'est plus la maturité mais la météo : il faut rentrer avant les gelées
Illimitée	Poireau, carotte, mâche, cresson, panais	À la demande	Ils se conservent en terre et s'améliorent même au froid : aucun jour J


1 j	2 j	8-12 j	∞
ASPERGE EN POINTE DE SAISON	CADENCE DE PASSAGE SUR 6 ESPÈCES	PRUNES, EN 3 PASSAGES	POIREAU, CAROTTE, MÂCHE

La règle des trois passages

Pour toutes les espèces à fenêtre large — prunes, poires, pommes — la bonne pratique n'est jamais de vider l'arbre en une fois. Les fruits d'un même arbre ne mûrissent pas ensemble : ceux du haut et du sud ont dix jours d'avance sur ceux du bas et du nord. **Trois passages espacés de cinq jours** donnent trois fois plus de fruits à maturité juste qu'une récolte unique, et étalent la consommation sur trois semaines au lieu d'une.

8.4 — Sensibilité à la chaleur de champ

La chaleur de champ, c'est la température interne du végétal au moment où on le détache. Elle commande la vitesse de respiration, et la respiration commande la conservation. La relation est exponentielle, pas linéaire.



Une heure à 30 °C au champ coûte environ une journée de conservation

Vitesse de respiration relative en fonction de la température de la pulpe. À 32 °C, un fruit consomme ses réserves seize fois plus vite qu'à 2 °C.

SENSIBILITÉ	ESPÈCES	DÉLAI AVANT REFROIDISSEMENT	CE QUI SE PASSE SI ON TARDE
EXTRÊME	Framboise, mûre, fraise, petit pois, épinard, asperge	30 minutes	Framboise : fermentation visible en trois heures. Petit pois : 40 % du sucre perdu en une demi-journée
FORTE	Laitue et salades, haricot vert, groseille, cassis, cerise, courgette, radis	1 à 2 heures	Flétrissement partiellement irréversible pour les feuilles, ramollissement pour les baies
MOYENNE	Prune, tomate, poire, raisin, carotte, betterave, navet	3 à 6 heures	Perte d'un à deux jours de conservation par heure passée à plus de 30 °C
FAIBLE	Pomme, coing, chou, poireau, potiron, oignon, pomme de terre, noix	Une journée	Aucun effet notable ; pour l'oignon, la courge et la pomme de terre, la chaleur est même nécessaire au ressuyage

La règle du panier

1 Un panier à l'ombre, jamais au soleil

Un cageot laissé vingt minutes en plein soleil monte à 40 °C à l'intérieur, même si l'air ambiant est à 24 °C. C'est le geste qui détruit le plus de récoltes, et il est gratuit à corriger : un drap clair posé dessus suffit.

2 Trois couches maximum pour les fruits mous

Le poids des couches supérieures écrase les fruits du fond, et chaque fruit crevé contamine ses voisins en quelques heures. Un cageot large et plat vaut mieux qu'un seau.

3

Ne jamais laver avant stockage

L'eau résiduelle dans les anfractuosités est le milieu de culture idéal de la pourriture grise. On lave au moment de consommer, pas avant. Seule exception : le bain d'eau froide de trois minutes pour les salades et les racines, suivi d'un essorage complet.

4

Refroidir vite, puis maintenir

L'essentiel du bénéfice se joue sur la première heure. Un bac d'eau froide, une cave, un réfrigérateur : peu importe le moyen, seule compte la rapidité. Rappel : **pas de réfrigérateur pour la tomate**, ni pour les prunes non mûres.

8.5 — La liste de contrôle

Ce qu'il faut se demander avant de sortir avec un panier. Sept questions, dans l'ordre.

1 Est-ce que je vais manger ce soir ou conserver ?

C'est la première question, et elle change tout. Pour manger le jour même : fin d'après-midi, 17–19 h, le fruit est à son maximum de sucre. Pour conserver : le matin, sans exception. Il n'y a pas d'heure qui optimise les deux.

2 Qu'est-ce qu'il a fait ces 72 dernières heures ?

Trois jours secs avant la cueillette : c'est le jour J. Une pluie récente : le fruit a gonflé d'eau et perdu 15 à 25 % de son taux de sucre, et la cerise ou la tomate risquent d'éclater. Une forte amplitude thermique entre nuit et jour est le meilleur signal.

3 Est-ce que le végétal est sec ?

Pour les fruits, impératif : le *Botrytis* germe en trois heures sur une surface humide. Pour les haricots, c'est une question sanitaire. Pour les feuilles, au contraire, la rosée est un avantage : c'est le signe de la turgescence maximale.

4 Ai-je trois indicateurs concordants ?

Couleur de fond, résistance au détachement, fermeté près du pédoncule, couleur des pépins, premier fruit sain tombé, goût. Un seul indicateur se trompe souvent ; trois qui concordent ne se trompent presque jamais. La couleur de couverture, elle, ne compte pas.

5 Mon panier est-il à l'ombre ?

Vingt minutes de cageot au soleil et la récolte du matin ne vaut plus mieux que celle de quatorze heures. Un drap clair, un coin d'ombre, ou un aller-retour : n'importe lequel des trois.

6 Est-ce que je prélève plus d'un tiers ?

En cueillette sauvage — mûres, orties, prunelles, sureau — on ne prélève jamais plus d'un tiers d'une station, et on ne déracine pas. Cinq litres par personne et par jour en forêt domaniale. Et les fruits d'un terrain privé appartiennent au propriétaire du sol, même tombés au sol.

7 Quand est-ce que je repasse ?

La dernière question est la plus négligée. On note la date du prochain passage avant de rentrer : deux jours pour les framboises et les courgettes, cinq jours pour la deuxième cueillette de prunes, une semaine pour les pommes. C'est la régularité qui fait la récolte, pas l'intensité.

Les cinq phrases à retenir

1. Les feuilles à l'aube, les fruits en fin de matinée, les racines tôt, et rien entre onze et dix-sept heures en été.
2. Une heure à trente degrés coûte un jour de conservation. Le panier à l'ombre vaut tout le matériel du monde.
3. La couleur de couverture ment, la couleur de fond dit la vérité. Et le meilleur indicateur reste la résistance au détachement : un fruit mûr se rend.
4. Trois jours secs avant, c'est le jour J. Une pluie la veille, c'est un quart du sucre en moins.
5. En hiver, tout s'inverse : on récolte à midi, jamais sur un végétal gelé.