Capsule 4 - Comparer deux modèles

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

La mémoire des erreurs améliore-t-elle la prévision?

> La qualité d’une prévision dépend du modèle et de l’information disponible.


Objectifs de la capsule

- Comparer deux modèles.
- Relier le résultat au cas guidé.
- Nommer une limite de l’interprétation.

Le raisonnement

- La régression ordinaire et la régression avec erreurs AR(1) utilisent les mêmes prédicteurs.
- L’erreur AR(1) relie la partie non expliquée à la période précédente.
- Comparer MAE et RMSE sur les mêmes mois.

Comparaison des douze mois de 2025



La ligne noire représente les ventes observées.

À retenir

Prédicteurs

Les valeurs externes réalisées en 2025 donnent une comparaison conditionnelle.

Validation

Les mêmes douze mois ne sont pas un nouveau test indépendant.

Production autonome 9.4

À partir de la démonstration fournie, comparez la régression ordinaire et la régression avec erreurs AR(1) sur les mêmes douze mois à l'aide de la MAE et de la RMSE. Indiquez que les prédicteurs de validation sont les valeurs effectivement observées.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Les deux modèles utilisent les mêmes observations et prédicteurs.
- Les scores sont en dollars.
- Je présente cette comparaison comme conditionnelle aux valeurs réalisées.

Références et crédits

Matériel du cours MQT-2101, Université Laval. Données fictives simulées pour l'enseignement.

Hyndman et Athanasopoulos (2021), *Forecasting: Principles and Practice*, 3e édition.