
A11 numerical self-differences: 13 stored ray clocks, no added time samples
L - M
M - H
axis: t/M
equator: t/M
diagonal: t/M
R/M
signed A11 difference
4e-04
4e-06
0e+00
-4e-06
-4e-04
1e-04
1e-06
-1e-06
-1e-04
2e-04
2e-06
-2e-06
-2e-04
6e-05
6e-07
-6e-07
-6e-05
3e-05
3e-07
-3e-07
-3e-05


A22 numerical self-differences: 13 stored ray clocks, no added time samples
L - M
M - H
L - M
M - H
L - M
M - H
axis: t/M
equator: t/M
diagonal: t/M
R/M
signed A22 difference
2e-04
2e-06
0e+00
-2e-06
-2e-04
6e-05
6e-07
0e+00
-6e-07
-6e-05
5e-04
5e-06
0e+00
-5e-06
-5e-04
1e-04
1e-06
0e+00
-1e-06
-1e-04
1e-04
1e-06
0e+00
-1e-06
-1e-04
3e-05
3e-07
0e+00
-3e-07
-3e-05


Aww numerical self-differences: 13 stored ray clocks, no added time samples
L - M
M - H
axis: t/M
equator: t/M
diagonal: t/M
R/M
signed Aww difference
2e-04
2e-06
0e+00
-2e-06
-2e-04
6e-05
6e-07
-6e-07
-6e-05


Gamma1 numerical self-differences: 13 stored ray clocks, no added time samples
L - M
M - H
axis: t/M
equator: t/M
diagonal: t/M
R/M
signed Gamma1 difference
5e-07
5e-09
0e+00
-5e-09
-5e-07
1e-07
1e-09
-1e-09
-1e-07
2e-11
2e-13
-2e-13
-2e-11
4e-11
4e-13
-4e-13
-4e-11
3e-07
3e-09
-3e-09
-3e-07
8e-08
8e-10
-8e-10
-8e-08


Gamma2 numerical self-differences: 13 stored ray clocks, no added time samples
L - M
M - H
axis: t/M
equator: t/M
diagonal: t/M
R/M
signed Gamma2 difference
8e-09
8e-11
0e+00
-8e-11
-8e-09
2e-09
2e-11
-2e-11
-2e-09
4e-07
4e-09
-4e-09
-4e-07
1e-07
1e-09
-1e-09
-1e-07
3e-07
3e-09
-3e-09
-3e-07
8e-08
8e-10
-8e-10
-8e-08


chi numerical self-differences: 13 stored ray clocks, no added time samples
L - M
M - H
axis: t/M
equator: t/M
diagonal: t/M
R/M
signed chi difference
2e-08
2e-10
0e+00
-2e-10
-2e-08
3e-08
-3e-10
-3e-08
7e-09
7e-11
-7e-11
-7e-09


K numerical self-differences: 13 stored ray clocks, no added time samples
L - M
M - H
axis: t/M
equator: t/M
diagonal: t/M
R/M
signed K difference
2e-04
2e-06
0e+00
-2e-06
-2e-04
6e-05
6e-07
-6e-07
-6e-05
3e-04
3e-06
-3e-06
-3e-04
5e-05
5e-07
-5e-07
-5e-05


lapse numerical self-differences: 13 stored ray clocks, no added time samples
L - M
M - H
axis: t/M
equator: t/M
diagonal: t/M
R/M
signed lapse difference
1e-05
1e-07
0e+00
-1e-07
-1e-05
2e-06
2e-08
-2e-08
-2e-06


phi numerical self-differences: 13 stored ray clocks, no added time samples
L - M
M - H
axis: t/M
equator: t/M
diagonal: t/M
R/M
signed phi difference
2e-06
2e-08
0e+00
-2e-08
-2e-06
5e-07
5e-09
-5e-09
-5e-07


Ex numerical self-differences: 13 stored ray clocks, no added time samples
L - M
M - H
axis: t/M
equator: t/M
diagonal: t/M
R/M
signed Ex difference
3e-05
3e-07
0e+00
-3e-07
-3e-05
8e-06
8e-08
-8e-08
-8e-06
1e-11
1e-13
-1e-13
-1e-11
2e-05
2e-07
-2e-07
-2e-05
7e-06
7e-08
-7e-08
-7e-06