Charakterystyka czasowa

Marcin Gruchała 248982 Jan Bronicki 249011

1 Cel ćwiczenia.

Badanie charakterystyk czasowych, dla różnych równań

2 Rozwiązanie analityczne równania różniczkowego i jego wykres.

$$\ddot{x}(t) + \dot{x}(t) - 2x(t) = u(t), u(t) = 1, \dot{x}(0) = 0, x(0) = 2$$

Rozwiązanie swobodne:

$$\begin{split} \ddot{x}_s(t) + \dot{x}_s(t) - 2x_s(t) &= 0 \\ x_s(t) = Ae^{\lambda t}, \dot{x}_s(t) = \lambda Ae^{\lambda t}, \ddot{x}_s(t) = \lambda^2 Ae^{\lambda t} \\ \lambda^2 Ae^{\lambda t} + \lambda Ae^{\lambda t} - 2Ae^{\lambda t} &= 0/: Ae^{\lambda t} \\ \lambda^2 + \lambda - 2 &= 0 \\ \Delta = 9, \lambda_1 = -2, \lambda_2 &= 1 \\ x_s(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^t - \text{rozwiązanie swobodne} \end{split}$$

Rozwiazanie wymuszone:

$$\begin{split} \ddot{x}_w(t) + \dot{x}_w(t) - 2x_w(t) &= 1 \\ u(t) &= 1, \dot{u}(t) = 0, \ddot{u}(t) = 0 \\ x_w(t) &= C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0 + C_3 \cdot 0 \\ \dot{x}_w(t) &= 0, \ddot{x}_w(t) = 0 \\ -2C_1 &= 1 \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{2} \Rightarrow X_w(t) = -\frac{1}{2} - \text{rozwiązanie wymuszone} \end{split}$$

Rozwiązanie ogólne:

$$x(t) = x_s(t) + x_w(t)$$

$$x(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^t - \frac{1}{2} - \text{rozwiązanie ogólne}$$

Rozwiązanie szczególne:

$$x(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^t$$

$$\dot{x}(t) = -2A_1 e^{-2t} + A_2 e^t$$

$$x(0) = A_1 + A_2 - \frac{1}{2} = 2$$


$$\dot{x}(0) = -2A_1 + A_2 = 0$$

$$A_1 = \frac{A_2}{2}$$

$$\frac{A_2}{2} + A_2 - \frac{1}{2} = 2 \Rightarrow A_2 = \frac{5}{3} = \frac{10}{6} \Rightarrow A_1 = \frac{5}{6}$$

$$x(t) = \frac{5}{6} e^{-2t} + \frac{10}{6} e^t - \frac{1}{2} - \text{rozwiązanie szczególne}$$


Wykres:



3 Badanie wpływu parametrów.

3.1 A, α, x_0

$$x(t) = Ae^{\alpha t} + x_0$$




Wnisoki:

Parametr A nie ma wpływu na stabilność układu. Wpływa na to czy wkyres maleje czy rośnie w zależności od tego czy jest ujemny czy dodatni oraz gdzie spotyka się z osią pionową.

Parametr α wpływa na stabilnośc układu. Dla $\alpha>0$ układ jest nie stabilny a dla $\alpha<0$ układ jest stabilny. Parametr x_0 nie wpływa na stabilość układu. Decydyuje o wartości na jakiej układ się ustabilizuje. Przesuwa wykres w górę lub w dół zależnie od wartości parametru.

3.2
$$\alpha, \omega, \varphi$$

$$x(t) = Ae^{\alpha t}cos(\omega t + \phi) + x_0$$



Wnioski:

Parametr α wpływa znacząco na zanikanie funkcji. Dla $\alpha < 0$ funkcja zanika do zera (układ się stabilizuje). Dla $\alpha > 0$ funkcja będzie uciekać od zera(układ jest nie stabilny).

Parametr ω wpływa na częstotliwośc oscylacji funkcji. Dla dużych ω oscylacje funkcji będą się pojawiać częściej funkcja będzie bardzije zagęszczona.


Parametr ϕ wpływa na przesunięcie fazowe funkcji.


3.3
$$\alpha_i, A_i$$


$$x(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + x_o$$

Wnioski:

Sumowanie parametr α_i wpływa znacząco na to czy funkcja zanika. Dla dwuch parametrów α_i o ujemnych znakach funkcja zanika, lecz gdzy tylko jeden z parametrów α_i jest dodatni to funkcja już nie zanika. Sumowanie parametru A_i jest bardzo intuicyjne. Gdy dwie składowe mają taki sam znak ich wpływ na kształt funkcji jest zsumowany. W przypadku gdzie parametry A_i mają różne znaki najbardziej znaczący jest ten który ma większą wartość bezwzglęną.







Wnioski:

Sumowanie parametru α_i ma duży wpływ na to czy funkcja zanika. Dla dwuch parametrów $\alpha_i < 0$ funkcja zanika, w sytuacji gdzie tylko jeden z parametrów $\alpha_i < 0$ a drugi parametr $\alpha_i > 0$ to funkcja nie zanika. Sumowanie parametru A_i w tej funkcji działa analogicznie do funkcji w podpunkcjie 3.3a. Jeśli znaki parametrów A_i są takie same ich efekt się dodaje, jeśli znaki parametrów A_i są różne to najważniejszy jest parametr z większą wartością bezwzględną.

4 Wnioski.

Jak pokazały powyższe przykłady znaając jeden z parametrów funkcji możemy w mniejszym lub większym stopniu oszcacować jego wygląd. Można to przełożyć na ocenianie opisów modeli i w szybki sposób stwierdzić czy model się ustabilizuje czy nie, ponieważ niektóre parametry nie mają wpływu na to czy funkcja zanika do jakiejś wartości czy nie.

5 Załączniki.

```
clear all;
t=1:0.001:2;
x=5/6*exp(-2*t)+10/6*exp(t)-1/2;
hold on;
plot(t,x,'m');
v=5/6*exp(-2*t)+10/6*exp(t);
plot(t,v,'b');
xw=0;
for i=1:1:length(t)
    xw(i)=-1/2;
end
plot(t,xw,'r');
legend('Xs+Xw','Xs','Xw');
ylabel('x');
xlabel('t');
```

```
1 clear;
 2 close all:
 5 %x_sz=Ae^alpha*t+x0;
 7 subplot(3,1,1);
8 x_sz=0:0.001:2;
9 t=0:0.001:2;
10 a=-2:
11 xw=-0.5;
12
13 A1=2;
14 for i=1:1:(length(t))
15
          x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
16 end
17 plot(t,x_sz,'m-');
18 hold on;
20 A1=5;
21 for i=1:1:(length(t))
22 x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
23 end
24 plot(t,x_sz,'b-');
26 ********************************
27 A1=-3;
28 for i=1:1:(length(t))
            x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
29
30 end
31 plot(t,x_sz,'r-');
33 A1=0;
34 for i=1:1:(length(t))
35 x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
36 end
37 plot(t,x_sz,'k--');
39 title('\alpha=-2, x_{0}=-0.5');
40 legend('A=2','A=5','A=-3','A=0, x_{0}=-0.5');
41 xlabel('t');
42 ylabel('x');
43 grid on;
45
46
47
48
49
50
52 subplot(3,1,2);
53
54 A1=-2;
55 xw=-3;
56
57 a=1;
58 for i=1:1:(length(t))
59
               x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
60 end
61 plot(t,x_sz,'m-');
62 hold on;
64 a=0.5;
65 for 1=1:1:(length(t))
           x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
66
67 end
68 plot(t,x_sz,'b-');
69 hold on;
70 perastrana transcriptora provincia del provincia del
```

```
64 a=0.5;
 65 for i=1:1:(length(t))
 66    x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
 67 end
 68 plot(t,x_sz,'b-');
 69 hold on;
 70 programmy pro
  71 a=-2;
 72 for i=1:1:(length(t))
 73
             x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
  74 end
 75 plot(t,x_sz,'r-');
 76 *******************************
  77 a=0;
 78 for i=1:1:(length(t))
 79 x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
 80 end
 81 plot(t,x_sz,'k-');
 82 *********************************
 83 A1=0:
 84 for i=1:1:(length(t))
 85     x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
 86 end
  87 plot(t,x_sz,'k--');
  88 title('A=-2, x_{0}=-3');
  89 legend({'\alpha = 1','\alpha = 0.5','\alpha = -1','\alpha=0','x_{0}=-3'},
            'Location','southwest');
  90 xlabel('t');
 91 ylabel('x');
  92 grid on;
 93
 94
  95
 96
 98 subplot(3,1,3);
 99 A1=-2;
100 a=-1;
101
102 xw=3;
103 for i=1:1:(length(t))
104     x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
105 end
106 plot(t,x_sz,'m-');
107
108 hold on;
109 A1=0:
110 for i=1:1:(length(t))
111
              x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
112 end
113 A1=-2;
114 pl=plot(t,x_sz,'m--');
117 for i=1:1:(length(t))
118
            x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
119 end
120 plot(t,x_sz,'b-');
121
122 hold on;
123 A1=0;
124 for i=1:1:(length(t))
           x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
125
126 end
127 A1=-2;
128 p2=plot(t,x_sz,'b--');
130 xw=0;
131 for i=1:1:(length(t))
132 x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
133 end
134 plot(t,x_sz,'r-');
```

```
131 for i=1:1:(length(t))
132 x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
133 end
134 plot(t,x_sz,'r-');
135
136 A1=0;
137 for i=1:1:(length(t))
138 x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
139 end
140 A1=-2;
141 p3=plot(t,x_sz,'r--');
143 xw=-2;
144 for i=1:1:(length(t))
145 x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
146 end
147 plot(t,x_sz,'k-');
148 A1=0;
149 for i=1:1:(length(t))
150
    x_sz(i)=A1*exp(a*t(i))+xw;
151 end
152 A1=-2;
153 p4=plot(t,x_sz,'k--');
156 title('A=-2, \alpha =-1');
157 legend([p1,p2,p3,p4],{'x_{0} = 3','x_{0} = 1','x_{0} = 0','x_{0}=-1'},'Location',
    'southeast');
158 xlabel('t');
159 ylabel('x');
160 grid on;
```