

# Cyproterone(安得卡錠)用藥須知

.....

處方成分：Cyproterone Acetate

英文品名：ANDROCUR TABLET 50 MG

中文品名：安得卡錠 50 毫克

## 作用

攝護腺癌、嚴重性慾過強及女性之嚴重的男性化徵狀、青春痘、多毛症。

## 用法

- 1.每日 1-3 次服用，飯後與水吞服。
- 2.必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

## 忘記服藥時要怎麼辦？

想起來的時候，儘快補吃。若已接近下次服藥時間，則不要補吃，依照原定時間服藥，千萬不要服用雙倍的藥量。

## 藥品要怎麼存放？

室溫保存。

## 服藥的注意事項

- 1.服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥物過敏。
- 2.服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是其他荷爾蒙製劑或口服抗糖尿病藥，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
- 3.如果您有或曾經有腎及肝臟、糖尿病、血液等疾病，應告知您的醫師。

- 4.如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
- 5.請勿自行將藥拿給別人吃，以免發生意外。
- 6.請儲存於緊密容器，室溫儲存，並慎防兒童取用。
- 7.如果您計劃手術，包括牙科手術，請事先告知您的醫師或牙醫，您正服用本藥。
- 8.本藥會引起疲倦、體力衰退，而降低專注能力，在開車或操作機械要小心。

## 飲食的注意事項

服藥期間避免飲酒。

## 副作用與處理方式

可能會發生下列副作用：

- 1.周邊水腫、體重增加。
- 2.噁心、腹瀉、消化不良。
- 3.頭暈、頭痛、熱潮紅、夜盜汗。
- 4.乳房脹大疼痛、月經不規則。
- 5.性功能障礙。

如果您有以下任何症狀，請立即告知醫師：

- 1.嚴重水腫、心臟不適、呼吸困難。
- 2.行走不穩、靜脈栓塞。
- 3.皮膚或眼睛泛黃、疲勞、茶色尿液。
- 4.視力受損。

以上藥品資訊無法代表全部資訊，如您有任何疑問，請向醫師或藥師詢問。

.....

院 址：台中市台灣大道四段 966 號 (原 台中市中港路三段 118 號)

諮詢專線：(04) 24632000 # 55214(早上) # 52131(晚上或假日)

網 址：www.ccgh.com.tw 2013/05/01 2013/5/1