持續性黃體荷爾蒙製劑

普寶胎注射液 125 毫克/毫升

Progeston Depot Intramuscular 125mg

一般 Progesterone 油性劑·一次大量投與在體內也很快被排泄失去其作用·故要維持長時間的有效血中濃度很困難,而黃體荷爾蒙劑適應症·常都須長期治療。為達此目的而發展出本劑—強力之持續性黃體荷爾蒙製劑·其藥效持續 8-10 日·此種持續性藥效與高濃度的製劑·對於女性因黃 體荷爾蒙不足所引起諸症候,具有優越的治療效果。本劑無不良副作用·它可用於孕婦·而對子宮內之胎兒無不良影響。

【成 分】

每安瓿 (1ml) 含有 Hydroxyprogesterone Caproate 125mg 為淡黃色油性澄明注射液。

【賦 形 劑】

Benzyl Alcohol · Benzyl Benzoate · Ethyl oleate · Sesame Oil

【適應症】

無月經、機能性子宮出血、黃體機能不全不妊症、危迫流產、習慣性流產。

【用法用量】

本藥限由醫生使用。 通常成人一週一次 Hydroxyprogesterone Caproate 量 65-125mg, 肌肉注射。

【注意事項】

- 1. 患有嚴重之肝障礙及肝疾患者,請勿使用。
- 2. 患有心疾患、腎疾患或有此等症狀之既往歷之患者(或有鈉或體液貯留之現象)請慎重使用。
- 3. 副作用:
 - (1) 過敏症:如有發疹等過敏症 ,請停止使用。
 - (2) 肝臟: 偶有肝機能異常之現象發生,請注意觀察,如有此現象請減量使用或暫時停藥。
 - (3) 電解質代謝: 偶有浮腫、體重增加等症狀之發現,請注意觀察,如有此現象,須減量使用或暫時停藥。
 - (4) 精神神經系:偶有頭痛、嗜睡等症狀之發生。
 - (5) 其他:偶有倦怠感發生。
- 4. 使用上之注意:
 - (1) 有產生局部硬結的可能。
 - (2) 肌注時請注意下列事項:
 - 1. 避開神經走行部位
 - 2. 如需連續使用請左右邊交互注射。
 - 3. 請確實觀察注射器反吸時無血液逆流現象。
- 5. 其他:黃體荷爾蒙劑之使用與先天異常兒之出生無因果關係,但對於曾經生過心臟、四肢等之先天異常兒之母 親與對照群相比,其於妊娠初期使用黃體荷爾蒙劑者其比率略有差別,此乃免疫學調查之報告。
- 【包 裝】1毫升玻璃安瓿裝·100支以下盒裝。

【儲存條件】遮光、25℃以下保存

藥 商:一成藥品股份有限公司

地 址:新北市汐止區新台五路一段 77 號 19 樓之 8

製 造 廠:大豐製藥股份有限公司

製造廠廠址:彰化縣彰化市延平里岸頭巷 11 號