

性别重置技术临床应用质量控制指标（2017年版）

医疗 词条 手术

五月 limelight insider

May '18

性别重置技术临床应用质量控制指标（2017年版）

一、术中输血率

定义：性别重置技术手术对象术中接受400ml及以上输血治疗的手术例数占同期性别重置技术总例数的比例。

计算公式：术中输血率 = 性别重置技术手术对象术中接受400ml及以上输血治疗的手术例数 / 同期性别重置技术总例数 × 100%

意义：反映医疗机构性别重置技术水平的重要指标之一。

二、术后输血率

定义：性别重置技术手术对象术后接受400ml及以上输血治疗的例数占同期性别重置技术总例数的比例。

计算公式：术后输血率 = 性别重置技术手术对象术后接受400ml及以上输血的例数 / 同期性别重置技术总例数 × 100%

意义：反映医疗机构性别重置技术水平的重要指标之一。

三、术中自体血输注率

定义：性别重置技术手术对象术中接受400ml及以上自体血（包括自体全血及自体血红细胞）输注例数占同期术中接受400ml及以上输血治疗的总例数的比例。

计算公式：术中自体血输注率 = 术中接受400ml及以上自体血（包括自体全血及自体血红细胞）输注例数 / 同期术中接受400ml及以上@输血治疗的总例数 × 100%

意义：自体血的应用可以显著降低异体输血带来的风险，是反映医疗机构医疗质量的重要结构性指标之一。

四、手术对象满意度

定义：性别重置术后随访手术对象满意的例数占同期性别重置手术总例数的比例。

计算公式：手术对象满意度 = 性别重置术后随访手术对象满意的例数 / 同期性别重置手术总例数 × 100%

意义：反映手术对象对性别重置手术的满意度,是反映医疗机构该项医疗技术临床应用水平的指标之一。

五、术后1年随访率

定义：性别重置术后1年完成随访的例数占同期性别重置手术总例数的比例。

计算公式：术后1年随访率 = 性别重置术后1年完成随访的例数 / 同期性别重置手术总例数 × 100%

意义：反映性别重置技术手术对象的远期疗效及管理水平。

##六、术后2周内感染率

定义：性别重置术后2周内发生感染的例数占同期性别重置手术总例数的比例。

计算公式：术后2周内感染率 = 性别重置术后2周内发生感染的例数 / 同期性别重置手术总例数 × 100%

意义：反映医疗机构性别重置技术水平和安全性重要指标之一。

七、尿瘘发生率

定义：性别重置术后尿瘘发生的例数占同期性别重置手术总例数的比例。

计算公式：尿瘘发生率 = 性别重置术后尿瘘发生的例数 / 同期性别重置手术总例数 × 100%

意义：反映医疗机构性别重置技术水平和安全性重要指标之一。

八、再造尿道狭窄率

定义：性别重置术后半年内发生再造尿道狭窄的例数占同期女变男性别重置手术总例数的比例。

计算公式：再造尿道狭窄率 = 性别重置术后半年内发生再造尿道狭窄的例数 / 同期女变男性别重置手术总例数 × 100%

意义：反映医疗机构性别重置技术水平和安全性重要指标之一。

九、再造阴道狭窄率

定义：性别重置术后半年内发生再造阴道狭窄的例数占同期男变女性别重置手术总例数的比例。

计算公式：再造阴道狭窄率 = 性别重置术后半年内发生再造阴道狭窄的例数 / 同期男变女性别重置手术总例数 × 100%

意义：反映医疗机构性别重置技术水平和安全性重要指标之一。

十、直肠阴道瘘发生率

定义：性别重置术后发生直肠阴道瘘的例数占同期性别重置手术总例数的比例。

计算公式：直肠阴道瘘发生率 = 性别重置术后直肠阴道瘘发生的例数 / 同期性别重置手术总例数 × 100%

意义：反映医疗机构性别重置技术水平和安全性重要指标之一。

十一、皮瓣坏死发生率

定义：性别重置术后，再造器官应用的皮瓣发生坏死（部分或全部）的例数占同期性别重置手术总例数的比例。

计算公式：皮瓣坏死发生率 = 性别重置术后再造器官应用的皮瓣发生坏死的例数 / 同期性别重置手术总例数 × 100%

意义：反映医疗机构性别重置技术水平和安全性重要指标之一。

十二、术后1周内死亡率

定义：术后1周内死亡是指性别重置手术对象术后1周内死亡（包括因不可逆疾病而自动出院）。术后1周内死亡率是指术后1周内手术对象死亡人数占同期性别重置手术对象总数的比例。

计算公式：

术后1周内死亡率 = 术后1周内手术对象死亡人数 / 同期性别重置手术对象总数 × 100%

意义：反映医疗机构性别重置技术水平和安全性重要指标之一。

Mar 2018

1 / 1

Mar 2018

Mar 2018