

劳拉西泮

Supportive Care

品牌名称:

Ativan®

其他名称:

Lorazepam Intensol

通常用于:

治疗癫痫、恶心呕吐和焦虑

关于劳拉西泮

劳拉西泮是一种苯二氮卓类药物。这种药物用于减缓中枢神经系统 (CNS) 的活动。劳拉西泮有助于在癌症治疗过程中控制癫痫病发作、减少恶心和呕吐、减少焦虑，并在进行医疗操作之前使患者保持镇定。

长期使用这种药物可能会上瘾。请仔细遵循给药剂量说明。

可以以液体的形式进行静脉输液或注射

可以以液体的形式注入肌肉

可以作为片剂口服

可以作为口服液服用

可以在鼻内给药（鼻内）

可能出现的副作用

感觉困倦

并非所有使用劳拉西泮的患者都会出现

疲劳或虚弱

头晕

呼吸速率低于正常

视力模糊

腹泻

便秘

头痛

口干

排尿问题

这些副作用。常见的副作用以粗体形式显示，但也可能出现其他副作用。请将所有可疑的副作用都报告给医生或药剂师。

可能的迟发效应

部分患者长期使用劳拉西泮时可能产生耐药性或依赖性。

对于幼儿，在医疗操作之前经常使用这种药物可能会导致长期大脑问题。

家庭小贴士

务必与您的医生或药剂师讨论这些建议和其他建议。

如果患者长期服用劳拉西泮，则不应在没有医疗监护的情况下停止服用劳拉西泮。医生可以缓慢减少剂量，以减少因停药而造成的不良影响。

患者在服用此药期间应避免饮酒。

服用劳拉西泮的育龄女性患者应在怀孕前与医生沟通。

如果患者处于妊娠期或哺乳期，应如实告知医生。

在家中使用的劳拉西泮：

服用量切勿超出推荐量。

这种药物可能使您头晕或昏昏欲睡，并可能增加跌倒的风险。在您确定这种药物对您的影响之前，切勿驾车或做任何可能有危险的事情。

如果发生胃部不适，请随餐服用劳拉西泮片剂。

这种药物的液体剂型可在服用前加入少量水、果汁、布丁或苹果酱。使用药物附带的测量工具。

舌下含服片应在舌下融化。2 分钟后吞下。等待融化彻底后再吞下。

在室温下储存片剂。

劳拉西泮液体应储存在冰箱中。

如有漏服，请尽快补服。如果已经接近下一次服药时间，则跳过此次服药。不要同时服用 2 次的剂量。

长期使用这种药物可能会上瘾。注意误用迹象。

请勿与任何人分享这种药物，也不要出于非医嘱的原因提供这种药物。

请勿服用过期药物。

遵循安全储存和处置说明。

务必检查药物标签。许多药物看起来都一样。未经咨询医生或药剂师，请勿服用任何新药，包括非处方药或补充剂。与您的医生或药剂师讨论漏服、过敏或紧急医疗情况的应对方法。此信息并非完整指南，也不能替代与您的医疗服务提供者之间的交流。