# Androcur/Procur (醋酸环丙孕酮片)

药物 词条

misaka4e21 御坂0x4e21 limelight sysadmin

Jan '19

## 基本信息

商品名称:安得卡 (Androcur) 、Procur、华典

通用名称: 醋酸环丙孕酮片 (Cyproterone acetate tablets)

生产企业:

Delpharm Lille SAS (法国) Bayer Pharma AG (德国)

Bayer Weimar GmbH und Co. KG (德国)

Douglas (新西兰)

湖北葛店人福药业有限责任公司

#### ▼ 多图杀猫









## 药物类别

#### 抗雄激素

竞争雄激素受体

### 孕激素

抑制促性腺激素释放激素,降低体内性激素产量

## 有效成分

醋酸环丙孕酮 (Cyproterone acetate)

分子式: C<sub>24</sub>H<sub>29</sub>ClO<sub>4</sub> 分子量: 416.94 g/mol

## 包装规格

3板/盒, 15片/板, 10mg/片 5板/盒, 10片/板, 50mg/片 3板/盒, 10片/板, 100mg/片

## 给药途径

口服给药

## 每日用量

推荐用量	资料来源
50-100 mg	Endocrine Society
50-100 mg	Royal College of Psychiatry
50-100 mg	University of Boston
25-50 mg	Vancouver Coastal Health
50-150 mg	Callen Lorde Community Health Center
100-150 mg	Anne Lawrence

## 说明书



## 用药建议

在绝大多数情况下,每日 25-50 mg 的醋酸环丙孕酮足够。如果睾酮稍高于女性范围但 FSH和 LH 已经很低,也不需增加抗雄剂量。

醋酸环丙孕酮会增加抑郁的风险, 机理有二:

降低血浆维生素 B12 浓度。建议每天补充至少 100 微克的维生素 B12。 孕激素作用。建议尽量压低剂量。

All her

醋酸环丙孕酮在不少人中会增加催乳素的产生,严重者会伴有心情不稳等症状。负责制造催乳素的垂体也可能会在吃醋酸环丙孕酮+雌激素的过程中增生,甚至发展为垂体瘤。 这玩意伤肝。你的酒量很可能严重下降。

#### Harriet\_Li ♥ Harriet\_薛定猫养的鳄鱼 limelight 副站长

**Sep '18** 

话说Douglas家产的Procur是不是最好也加上就是俗称的澳色

#### waterdrop \*Domestic Goddess\* hitorino 离任版主

**Sep '18** 

不是酒量的问题,是你用此药的时候最好是滴酒不沾,你的肝脏会谢谢你。哪怕没有任何长期用药的一般顺性别人士,最新研究都表明喝酒没有丝毫好处,再低的量都会对身体器官有冲击。

#### misaka4e21 御坂0x4e21 limelight sysadmin

**Sep '18** 

你觉得一个见到有人不开心就让充电 4.2V 的裸足医生 @artoria2e5 会在乎肝? (

#### waterdrop \*Domestic Goddess\* hitorino 离任版主

**Sep '18** 

我知道,就像国内普遍的self-medication状况一样。而且有大环境的隐性强迫问题,我自己也是那么过来的。。不过我觉得还是该说出来。至少大家该知道应当如何,至于怎么去实现,只能按自己的情况来了。但有目标和没目标的区别还是挺大的。

#### artoria2e5 怪阿姨 A2 limelight.moe 监察员

Sep '18

充电 4.2V 我也是建议了低剂量和看到没有吃螺啊。喝了会晕倒比喝了伤肝更有说服力不是吗……我甚至 没有建议 100+ 剂量。

(我现在想砍了你。)

#### waterdrop \*Domestic Goddess\* hitorino 离任版主

Sep '18

是说碳酸锂吗? 那好像不是太好玩的东西诶

#### artoria2e5 怪阿姨 A2 limelight.moe 监察员

Sep '18

所以才建议低剂量 (无法监测血锂水平按保守; 低了也并不是完全没有用) 并且避免螺 (同样水平会高剂量还要减) 啊。好玩又不是重点,别那么急着去死才是。好了现在你给我让开我要宰一只东西。

喵星上的来客 喵君 Jan '19

想试试澳色.....

不知道和土色有什么区别

Harriet Li ♥ Harriet\_薛定猫养的鳄鱼 limelight 副站长

Jan '19

理论上应该没啥区别(成分一样),个人吃下来似乎也差不多(当然不排除我这种糙汉稀里糊涂忽略了什么不同之处)

**喵星上的来客 喵君** Jan '19

纠结该入土色还是澳色, 之前吃了一盒土色了

artoria2e5 怪阿姨 A2 limelight.moe 监察员

Jan '19

哪个便宜用哪个......( 另外我自己对药瓶有偏爱(觉得省地方

**喵星上的来客 喵君** Jan '19

最后还是入华典了

Rongrong 非典型Rong布球

Aug '19

华典(国色)说明书

核准日期: 2006年11月02日 **修改日期:2009年01月04日** 

(B584)

的监名符2 通用名:個版环丙孕物内 英文名:Cyproterone Acetate Tablets 设满项套:CusuanHuanbingyuntong Plan

[項的] 市品主要成份为醫裝环內孕酮,其化学名利为6-氯-10,2m 至甲基-3,20-二孕酮-4,6-二烯-176-醛聚酯。 其化学结构式为:

w B ~~

[数据] 水品为白色或类白色片。

● 用于男性 能抵性愈發性的決局。 而報知以來是解析。一帳从每次1件、每日2次开坡治疗。 如果有必要并別量至至每次2件、每日2次,甚至2时间的每次 2件、每日2次。仅需要效果的。但常量以最低可能处理求维持 疗效。或若每次1/2件、每日2次日至4年。但確定推择的健康年 組織的「本學成成的分階」。在這些深深之時。」以為與 現几个要將每日至無定之月,或[1/2]開發於月今報片、如 可能,同時可求用心學解之的情報。

对不宜于术的部列联络进行抗维激素治疗

等次2片。每日2里3次[200 300 在餐店以水进至药产。

在有司以永遠至於內。 內國在內國內是有道理與每中止治疗。也不要或小別量。 用級在保護的基本與其他之。 那數的主要。 所數 57年發起而開發所再多數(每次2万,每日2次 (200m)。 因近3-4服數學再多數(每次2万,每日3次 (200m)。 如前37年故前198日以下,包括2次 (200m)。 如前37年故前198日以下,包括3次 (200m)。 如前37年故前198日以下,包括3次 (200m)。 如前37年故前198日以下,包括3次 (200m)。 如前37年故前198日以下,包括3次 (200m)。 如前37年故前198日以下, (200m)。 如前37年故前37年故前37年故前37年故 (200m)。 如前37年故前37年故前37年故 (200m)。 如前37年故 (200m)。

**重約拉女** 封诱妇女不得惊用翩翩坪两拳照片。因此,在开始治疗料必

治疗,只有诺经妇女才是即则开始治疗。在这种情况下,治疗 的第1天将被视为周期的第1天,并按一起情况遵循下述建议。 区库购第1天至第10天(四10天)。每日于银后以水还是经验

お老产品(素型7円や耐和(2番級的反方利用)、以表件必要的確 醋酸环丙孕酮片说明书 學保护并使問題保持穩定。 **遗仔细阅读说明书并在网络报费下使用** 

环丙孕酮内50mg2内。此外,这些妇女还要接受含孕君家-成酒 本的利利,比如,从两项型1页至第21页每天整用1内杂香素-健

學保护學與斯斯學學是 他是用期最合治的的政策未成在歐定时用國命。 引天后命等時末。在此期間会聚生經過已由上一不廣出血 可止時息。便于能计中作用的整件中華后部開一一個聯日的 抵決或情報。与夏万能排列中分類內類合治疗的前40天動裝 對外學與海市的制度可遵定計畫[227]。這许是拍對此是分類 維持的時期就已受援。 未发生的量

作所で割れ 成立になる。 未发生出血 対異併務河區間未发生出血。別必派中止治疗。并在也設用

1912年,每日5次、指述规则32次。随后等的对决。 还有效应引 在他规则时间中的制作的几个是期间。因于该问他对机器是 数据设位证据基础的作用。据不及主受同时制、在序上进行的 的几个同间。相不是主命逐渐恢复。 在男性解入。指数许多编码信息或男子女性望见原刊时间 我见太难测。据数学是解码信息或男子女性望见原刊时间 与其他的情况重复出作规则。其干异性病人,进个时间则可则

群盟河西伊朗内村建教家的长期科制而发生有语源权

女性病人接受联合治疗时,因李仲受到它阿司及于不学状态。

可能会发生乳原保透。 有可能发生疾穷、精力下降。偶尔还会发生短暂的内心不宁

可能发生体重更化。 罕见病例可能发生过敏反应能应症。

部. 超額环內學能并不得在青春期或東於使用。因为不能持餘它 時候與重新和資本數度的內包沒功能被发生不利原理。 治疗期间,应果的检查杯功能、減上限度原功能和红细胞目

在抽受麵樣还可孕酮200~300mg治疗的病人中。曾报告有

图博的开展性,包括高级、开京和开展地、这份位了某些询问 的死亡。大多数据指挥的发生于利利和磁阻性。 每年中国解决。通复工业分为地面的几个特点。或语在 中部分别也是有效。直接只要必要指导电影的经验或证证 证明运动力也。 如果还定产生了并基础。一部的特点使用的 该用类的人类型。 如果还产生的工程,一部的特点使用的 点。在这种情况下,只有证是有效的这种过程,但可不是如果 用某它并回题和一样。一种具有可能的工程如果 用某它并回题和一样。一种具有可能的工程和是一种是 是是一种的工程,并且

结果其对量的2%程乳计分泌存出。

【八皇用符】 藤銀环太早額片不延用于儿童。

[老年期刊] 对君主君者的自己王特克用制。

[四年報告 6.8]

对口斯陸聯邦經歷為素的電臺可能会有型化。

学次意外报用数值于治疗所需剂量的药物后,也不会有急性 中毒的症性。

中旬的成形。 《例理事题》 務理序題 報鑑部所另分開片是一种就是要素制剂。它可称制造散集的作 制改性机体也可产生效量的效散素、并表现出于高高级机构性

毒理研究 **氧次性药类性毒性试验毒钠、甜菜环丙孕酮片的活性或分類** 解环丙孕制可以被归类为实际无毒药物。

全原毒性 在全身影響性和物質發研女中,多次口驅检訊器,未完全自 不耐受的证象,故不禁止治疗剂囊症人体用于规定的适应症 没有进行程能环丙孕酮致被可能性的动物试验研究。

集。包登进一步的检验显示超越环丙华期可以在人员和报子的 肝细胞以及新哲实体人肝细胞中形成DNA加合物(直DNA作复活 性解误。但是在其的肝根胞中未检测剂DNA加合物。

还种ONUSO的物位坚持思露下形成。而这也就应得看的助规 好為分割仍能力整下等计可能发生的。指数时间补助的对应。 有可能或是对达到的,可能使用的对核形。现在为无线性大 起中感的新发生效息。在集年作为实发现的组装至3的特别因 由一个交流是。 五个,但此时间的工程或分别的对外的个过去不是特别解析的 分解的人也对对他因为中国的一种证明的现在形式

孕酮使人体肝脏肿瘤发生率增加。 雌酸环丙孕酮时城内类动物 数种瘤形成的研究中,也沒有提示有明确的致肿瘤形成的可能 性,不过必消记性,性类回解能够促进某些激素依赖性组织和 种瘤的生物。

arri立外。 总的说象。现有的毒理学发现并不反对在人体使用辐散杯两

除军则官强为3.5±1.5ml/min/kg。 關緊汗內學翻遍过多种遊役 代謝,但通時基化和紹合吳信。人為黎中的主義代謝歌電150-

野鄉門學物。 一部分會深以原列的對於一會經歷。大部分所屬以代說物對於 排述。在經濟解除計中的性態的於了。原始即對於明期為为2 。 ,代據物以對於原本與於一學與中也自然自接自然。。即於可求與中的 分分一种以其所的的。因而自然的之事可有明明,所以可能的 但需要然也確認自然中心,但而自然的 便可能可能。

力字。 相反血体(血清)核末处医物的长干泉和及每日有入量,炒订 在重复每日给货期间,把每年两分额的在土满中的蓄积因子为3。 期极开两争码的绝对生物利用或几乎是完全的(剂量的约约)。

[世報] 进光、图明保存。 [白装] 附稿/院/陶乙烯初品包装用复合器。12片/新×2档/曲。

(有效期) 24个月 [执行标准] YSH15852005 [批准文号] 国防准字H20056637

同 学: www.gd:fgy.com. 全国客報告任: 400-027-7353

unknown Aug '19

听说国色比土色纯度高,所以推荐国色25mg/D, 土色50mg/D.....是这样吗

## misaka4e21 御坂0x4e21 limelight sysadmin

Aug '19

不会吧,都是按照有效成分含量来标识的,所以华典、Androcur、Procur 的用量应该是相同的才对(不考虑假药的情况下

unknown Aug '19

这么一说我有点慌,买了一盒土色,吃了十多天没什么感觉Σ(°△°|||){

zeguqi Sep '19

醋酸环丙孕酮,是我买不起的药,我只吃的起螺内酯...

misaka4e21 御坂0x4e21 limelight sysadmin

**Sep '19** 

御坂也只吃得起螺内酯,而且很可能很快就要吃不到了(指处方

SomaleakA9 Hururu Sep '19

不知道土和澳的区别...只用土100

## **Sep 2017**

**13 / 57** Jan 2019

**Dec 2020**