悦可婷/艾悦 (左炔诺孕酮炔雌醚片)

药物 词条

misaka4e21 御坂0x4e21 limelight sysadmin

Aug '18

基本信息

商品名称: 悦可婷、艾悦

通用名称: 左炔诺孕酮炔雌醚片 (Levonorgestrel and quinestrol tablets)

生产企业: 华润紫竹药业有限公司

等效药品: 月悦安(北京紫竹)、晶婷(南京白敬宇)、诺亭妤(华中)



药物类别

孕激素

长效雌激素

有效成分

左炔诺孕酮 (Levonorgestrel)

分子式: C₂₁H₂₈O₂ 分子量: 312.45 g/mol 炔雌醚 (Quinestrol) 分子式: C₂₅H₃₂O₂ 分子量: 364.52 g/mol

包装规格

每盒6片(悦可婷)、5或3片(艾悦)

每片含左炔诺孕酮6mg,炔雌醚3mg

参考价: 平均每片 1~2 元

本品为国家药典规定的通用药品(**2015标准**),有时可找到比悦可婷品牌更低价的等效药品;建议使用通用名查找。

给药途径

口服给药;建议随餐服用,特别是和含油较多的食物同服。

相关药物

本药为多日纳(非处方药)衍生的长效避孕药,副作用相对多日纳较大。

说明书

```
核准日期 2007年04月13日
                                                                       7. 剧避孕药的吸烟妇女并及心血管病(中风、心肌梗塞等)
较不吸烟者多,因此周避孕药妇女应停止吸烟,或吸烟妇女
(特别是年龄超过55~40岁者)不宜原避孕药。
8. 出现了列度战时应停药,怀疑妊娠,血栓栓塞病, 视觉
障碍,原因不明剧烈性头疼或偏头疼,出现高血压,肝功能
  修改日期: 2010年10月01日
修改日期: 2013年12月26日
 悦呵粉。
  左炔诺孕酮炔雌醚片说明书
                                                                       開轉,原因不明期對性头疼或傷头疼。出现高血压,肝功能
异意、精神時態、缺血性心脏病等。
9. 严格按照成定方法服药,漏服药不仅可以发生突破性出
血, 还可导致避孕失致。
10. 服药期限,以连续3-5年为宜,停药现象数月,体检
正常者,可再服用。
【孕妇及哺乳期妇女用药】
孕妇被用,哺乳期妇女服药后可使乳汁减少,故应于产后
学年开始服用。
             请仔细阅读说明书并在医师报导下使用
     通用名称: 左炔诺孕酮炔雌醚片
英文名称: Levonorgestrel and Qu
     汉语拼音: Zuoquenuoyuntong Quecimi Pian
【成份】
本品为复方制剂,其组分为每片含左铁诺孕酮Gmg,快维
                                                                       【儿童用药】
                                                                        【老年用药】
     本品为薄膜农片、除去包衣后呈白色或类白色。
                                                                       尚不明确。
【药物相互作用】
 【适应症】
本品有抑制排卵的作用,为女用长效口服避孕药。
                                                                        上於昨年11.4下四

1. 影响避孕效果的药物,抗菌素类药抑制肠内细菌繁殖
减少激素结合物的分解,减少肠肝循环,诱导肝药酶的药物
如利福平,催眠和抗惊厥药,解热镇痛药,三环类抗抑郁药
 [提格]
 每片含左块诺孕酮6mg,炔雌醚3mg。
【用法用量】
                                                                        於可能下,雖然心能感形。
在計能与本島費學共同代謝酶。
2. 与董争前台并应用,药效更新纳的药物。降压药的降压
效果降低,抗凝药效果解选、排體病(如集岛素及口服障器病)
控制糖尿病的疗效降低,三环类抗抑郁药的效果增强。
 1. 于月经的当天算起。第5天午饭后服药一次,间隔20天服第二次,或月经第5天及第10天各服1片,以后均以第二次服药日期为每月的服药日期,每月服1片,一般在服药后6-12天
  有撤退性出血。
2.原服用短效口服避孕药改服长效避孕药时,可在服完22
                                                                        【药物过量】
                                                                        目前为止未知超剂量的病例。若大量服药、应先进行决胃。
【药理毒理】
快館整(炔雌醇环戊醚)为长效雌激素、口服后经胃肠道吸
  片后的第二天接服长效避孕药1片、以后每月按开始服长效避
   9两的同一日期服药1片
                                                                       快戲幣(快鐵箭环戊酮)为长效雞激素, 口原后经胃肠道吸
收, 贮存于脂肪组织内, 缓慢释放运炔螺醇, 通过抑制丘脑
下部一個体-卵巢轴来按制卵巢排卵, 达到长效避孕作用, 孕
激素与其配伍, 对抑制排卵既有协同作用, 又可使子宫内膜
转化, 呈现分泌现象, 导致撤退性出血, 形成周期性改变,
一月腰而1%, 遵令事可达∞完以上。
周代动力学】
尚不明确。
faran
 【不良反应】
1. 类早孕反应,和短效口服避孕药表现相似,但比较严重。
 1. 关于学校区: 布型以口歐維学的表现相似,包化较广果,
产验室药的别几个周期素就较繁。反应发生时间一般在庭药
后8-12小时,因此将服药时间定于午饭后,使反应高潮给在
熟糖中,可使之减轻。
2. 白唇增多,为长效口服避孕药最常见的不良反应。多发
生在3-6周期之后。
     3. 少数人发生月经过多或闭经。
4. 其他有胃痛、浮肿、乳房胀痛、头痛等。
                                                                        DOM:
                                                                            遮光,密封保存。
 [無限]
                                                                        [包装]
 【环志】
子宫阳虚、乳房醉块及肝胃功能不全者。心血管疾病、血
栓皮、高血压、糖尿病、甲状腺功能亢进、精神病或抑郁症。
多血脂患者禁用。
                                                                            铝塑包装、每板6片、每盒1板。
                                                                        【有效期】
 【注意事項】
1. 本品适用于长期同居夫妇避孕。每月只需服药一次。
                                                                        【执行标准】
                                                                       《中国药典》2010年版二部
【杜准文号】

    本品运用丁尔斯问题大只顺乎, 每月只需要的一次。
    整数產百套条人 费精等下接搜查拥有。
    初次服药后10-15天来一次月经, 开始服药的两次月经期期有些缩短。属于正常现象, 第三次转为正常。
    服药期间有个别人因体内维激素不足而发生用适出血可加度接着耐力, 每天每次1片(0.005~0.01mg)或遵医嘱。
    服药期间定期体检。发现异常及时停药。

                                                                       国药准字H11021378
【生产企业】
                                                                           5. 如爾生育, 应停药或采取其它避孕措施, 半年后再怀
                                                                                       010-62262389 010-62250419(售后服务)
010-65483355-2221(生产)
 6 凡患有急慢性肝炎、肾功能不全、肿瘤、子宫肌瘤、乳
房肺块、糖尿病、血栓性疾病、心脏病、哺乳期妇女、严重高
血压禁用、既往月经不调、有闭经炎者、产后或流产后未恢复
                                                                            传真号码: 010-62219316
网 址: http://www.zizhu-pharm.com.cn
  正常月经者、不宜服用。
                                                                           严禁用于食品、饲料加工、养殖
```

の 多日纳 (左炔诺孕酮炔雌醇片)

Rongrong 非典型Rong布球

Feb '18

药物类别

本品属于雌孕激素复方制剂,其中炔雌醚为长效雌激素。

artoria2e5 怪阿姨 A2 limelight.moe 监察员

Aug '18

炔雌醚(Quinestrol)为炔雌醇(式量 296.4)的 3-环戊醚,相比炔雌醚*(式量 364.5)亲脂性更高,因此半衰期长达五天(每天存量有 13% 转换为炔雌醇),可以像悦可婷里面一样一个月只用一次。类似靠亲脂性延长半衰期的雌激素还有肌肉注射的十一酸雌二醇,可以一个月一针,原本是在没有抗雄的时代用来降低雄激素产生遏制前列腺癌的。十一酸雌二醇现在已经基本停产了。

炔雌醚是炔雌醇的体内前体;各种作用可以参见雌激素条目我对炔雌醇的补充。悦可婷的炔雌醚含量极高,有类似于大剂量炔雌醇的血栓风险。炔雌醇的血栓风险与剂量相关。

另外,由于炔雌醚和炔雌醇都不是雌二醇,你是没有办法通过测量雌激素水平调整剂量的。

过去有以高于正常剂量(每月一粒)1.5 甚至 2 个数量级服用悦可婷进行 HRT 的做法,强烈不推荐日常如此服用。顺性别女性雌激素水平如此之高的情况基本只有怀孕时;孕激素水平则基本没有对应。在此剂量服用雌和孕激素,除了本身就经常发生的头晕呕吐、产前抑郁之外,还有炔雌醚造成的肝病、心血管、静脉血栓风险。除此之外,左炔诺孕酮还有一定程度的雄激素活性,可能加剧情绪爆炸。

高剂量使用悦可婷时,基本不需要使用其他 HRT 药物,原因是高剂量雌激素和孕激素本身就会抑制促性腺激素释放激素的产生,导致睾酮产量下降。前者为抗雄激素尚未开发出时的抗雄方法(前列腺癌、mtf hrt),后者为醋酸环丙孕酮降低睾酮浓度的机理。

▶ 好孩子不该知道的

悦可婷在 MTF HRT 中的作用类似于短效避孕药——可以在紧急时按照正常剂量服用,提供一个雌激素的来源。悦可婷在这方面是非常暴力的东西:

量非常大,大到让你怀疑人生,大到让你呕吐(真的不要几粒一起吃求求你们了) 睾酮克星:在头几天高浓度时可以通过降低 LH 抑制睾酮产生;后面随着浓度降低仍然会通 过增加 SHBG 的产生降低睾酮有效浓度。(但是左炔诺孕酮有一定的雄作用……有些人会因 此继续长毛。)吃了一粒之后头一周基本用不上抗雄;吃了 1/4 粒之后头两天也基本不需 要。

价格低廉

非常长效: 半衰期长达五天, 是懒人的好朋友。如果你不想吐的话, 可以每五天吃 1/4 粒。不过要注意的是, 悦可婷属处方药, 正常情况下你手上不应该买得到这东西。由于众所周知的原因, 如果作为 MTF 的你有多余的悦可婷, 请考虑将其转送给身边的异性恋情侣。真的, 你这辈子用不上超过 12 粒的悦。

Sep 2017

1/3

Sep 2017

Aug 2018