

7

Motivos Para a Sua Taxa de Concepção na IATF Estar Baixa

E o que fazer em cada um — um guia de diagnóstico de campo

Taxa de concepção baixa raramente é um problema só. Quase sempre é uma pilha de problemas pequenos. Cada um tira alguns pontos. Juntos, custam uma safra inteira de bezerros.

Este guia passa pelas sete causas mais comuns, na ordem que um bom diagnóstico segue: do momento da inseminação para trás, até o manejo do rebanho.

Em cada causa você recebe quatro coisas — o que acontece, por que custa prenhez, o que verificar no campo e como resolver.

Leia uma vez antes da estação. Deixe na caminhonete durante a estação.

1 Qualidade do sêmen no momento do uso

O que acontece. O sêmen estava bom no laboratório. Quando chega na vaca, pode não estar mais. A motilidade cai entre o botijão e o trato. Você insemina uma palheta que já perdeu as melhores células e nem fica sabendo.

Por que custa. O laudo do laboratório diz como a partida estava dias atrás, não o que você está colocando na vaca agora. O sêmen na mão do campo tem cerca de quatro vezes mais chance de falhar do que no estabelecimento de processamento — rejeição perto de 8 por cento na fazenda, contra 2 por cento no laboratório (B.K. Stroud, 2012). Cada palheta morta é uma vaca vazia garantida.

O que verificar. Olhe a motilidade no momento do uso, não o rótulo. A motilidade progressiva continua onde deveria depois do descongelamento? Você verifica cada touro, cada partida, ou só confia no papel?

Como resolver. Verifique a qualidade no momento do uso. Uma checagem de campo da motilidade e da motilidade progressiva leva segundos e pega a palheta que ia desperdiçar a inseminação inteira. É exatamente essa lacuna que o MAKSA foi feito para fechar: motilidade e motilidade progressiva no smartphone, no campo, por cerca de cinco reais por teste.

2 Erros de descongelamento e cadeia de frio

O que acontece. Água quente demais. Água fria demais. Palheta parada tempo demais ou tirada cedo demais. Botijão aberto vezes demais. Cada um danifica as células antes do sêmen chegar na vaca.

Por que custa. As células do sêmen são frágeis à temperatura e uma variação pequena faz estrago de verdade. Em um caso documentado, uma variação de 1,5 °C derrubou a taxa de prenhez em nove pontos em 280 vacas (Luciano Penteado). Nove pontos é muita vaca vazia por causa de um erro de descongelamento.

O que verificar. A água do descongelamento está medida, não no chute? Quanto tempo a palheta fica de fato na água? Quantas vezes o botijão é aberto num dia de trabalho? O gargalo fica exposto em algum momento?

Como resolver. Use termômetro, não o dedo. Padronize o tempo de descongelamento. Limite as aberturas do botijão. Depois confirme que o sêmen sobreviveu verificando a motilidade no momento do uso — protocolo mais verificação é melhor que protocolo sozinho.

3 Momento da inseminação

O que acontece. A inseminação cai cedo demais ou tarde demais em relação à ovulação. O protocolo diz uma janela; a realidade no campo escorrega dela.

Por que custa. A fecundação tem uma janela estreita. Se você perde, nem o melhor sêmen do mundo faz prenhez. Nos programas sincronizados o momento é fixado pelo protocolo, então qualquer desvio na execução tira todas as vacas do ponto de uma vez.

O que verificar. Você insemina no horário definido pelo protocolo, ou quando a equipe chega naquele lote? Quanto tempo passa entre a primeira e a última vaca de um grupo grande? O intervalo da última etapa hormonal até a inseminação é o que o protocolo especifica?

Como resolver. Segure a janela do protocolo apertada. Planeje equipe e ordem dos lotes para a última vaca não ficar horas atrás da primeira. Trate o intervalo de tempo como fixo, não flexível.

4 Variação entre inseminadores

O que acontece. Dois inseminadores rodam o mesmo protocolo na mesma fazenda com o mesmo sêmen. Um tira número bom. O outro não. A diferença é a técnica.

Por que custa. Essa é uma das maiores variáveis escondidas do campo. Um estudo encontrou taxas de prenhez variando de 15 por cento a 82 por cento entre inseminadores na mesma operação (Sá Filho, *Theriogenology*, 2009). Isso não é o sêmen. É a mão.

O que verificar. Você acompanha a taxa de concepção por inseminador, não só por fazenda ou por touro? Existe diferença entre o seu melhor e o seu pior? O local de deposição é consistente, ou varia?

Como resolver. Meça por inseminador — você não conserta o que não acompanha. Retreine os de baixo desempenho em deposição e manejo e coloque eles junto do melhor por uma estação. Pequenas correções de técnica recuperam muita prenhez.

15–82%

variação da taxa de prenhez entre inseminadores, mesma operação

Sá Filho, Theriogenology, 2009

5 Adesão ao protocolo e sincronização

O que acontece. Uma etapa hormonal atrasa. Uma dose é pulada. Um intervalo é encurtado porque a agenda apertou. O programa de sincronização só funciona se cada etapa cair na hora.

Por que custa. Esses protocolos são construídos sobre intervalos precisos. Mova uma etapa e a onda folicular inteira se desloca. As vacas ovulam fora do horário e a sua inseminação em tempo fixo não bate mais com a biologia delas.

O que verificar. Cada etapa é dada no dia e na hora exatos? Os intervalos entre etapas são os que o protocolo especifica? Alguém está pulando etapa para economizar uma viagem?

Como resolver. Trate o protocolo como inegociável. Monte o calendário em volta dos intervalos, não da conveniência. Se uma etapa não pode ser dada na hora, o resultado daquele grupo já está comprometido — planeje a mão de obra para isso não acontecer.

6 Condição corporal e nutrição

O que acontece. As vacas entram na estação de monta magras demais ou em balanço energético negativo. O sistema reprodutivo é a primeira coisa que o corpo desliga quando falta energia.

Por que custa. Uma vaca que está perdendo peso é uma vaca que o corpo decidiu que não pode bancar uma prenhez. Escore de condição corporal baixo na inseminação puxa a concepção para baixo por melhor que sejam o sêmen e o momento. Falta de mineral faz o mesmo, de forma silenciosa.

O que verificar. Qual é o escore de condição corporal do grupo na inseminação, não dois meses antes? As vacas estão ganhando, mantendo ou perdendo? O programa de mineral e energia está de fato chegando nos animais?

Como resolver. Acerte a condição corporal antes da estação, não durante. Mire vacas ganhando ou mantendo na inseminação. Feche as faltas de mineral e energia cedo — nutrição demora para corrigir, então comece cedo.

7 Manejo e estresse na inseminação

O que acontece. Manejo bruto. Espera longa no tronco. Calor. Uma vaca estressada no momento da inseminação tem o corpo cheio de hormônios de estresse que trabalham contra a prenhez.

Por que custa. Os hormônios de estresse atrapalham os sinais que sustentam a concepção e o início da gestação, e o estresse térmico por cima disso derruba a fertilidade ainda mais. A vaca que você brigou para colocar no tronco no sol do meio-dia não é a vaca que você quer inseminar.

O que verificar. Quão calmo é o fluxo pelo tronco? Quanto tempo uma vaca espera antes da inseminação? Você está trabalhando no calor do dia? A instalação está causando medo ou machucado?

Como resolver. Trabalhe o gado com calma e no silêncio. Encurte a espera entre a contenção e a inseminação. Passe o trabalho para as partes mais frescas do dia no calor. Manejo bom é de graça e protege tudo o mais que você fez certo.

Juntando tudo

Percorra esses sete na ordem na próxima vez que os seus números decepcionarem. A maioria das estações de concepção baixa é dois ou três desses empilhados, não uma falha grande só.

Dois deles — qualidade do sêmen no momento do uso, e descongelamento e cadeia de frio — se resumem ao que está de fato na vaca no momento da inseminação. Esses são os que você consegue pegar na hora, antes que custem.

Confira a palheta antes que ela vire uma vaca vazia

O MAKSA lê motilidade e motilidade progressiva no smartphone, no campo, validado em r acima de 0,90 contra equipamento CASA de laboratório. Mais de 1.000 testes de campo, mais de 10 países, cinco espécies.

$r > 0,90$

correlação com CASA de laboratório

1.000+

testes de campo

~60s

por análise, na fazenda

Quer os protocolos de campo? Peça o conjunto completo.

Agende uma conversa ↗

avareit.com • WhatsApp +17135849584
