

## Лабораторная работа №10.

### ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ И ОБРАЩЕНИЕ МАТРИЦ МЕТОДОМ ЖОРДАНА-ГАУССА

**Цель работы:** приобретение и закрепление практических навыков при вычислении определителей и обращении невырожденных квадратных матриц.

**Задание.** Применяя метод полного исключения Жордана-Гаусса, вычислить определитель матрицы  $A$  и найти обратную для неё матрицу  $A^{-1}$ .

Используя определение обратной матрицы, сделать проверку полученного результата.

#### *Варианты заданий к лабораторной работе №10*

##### Вариант №1

$$A = \begin{pmatrix} 0,64 & -0,83 & 4,20 \\ 0,58 & -0,43 & 1,45 \\ 0,86 & 0,77 & 0,88 \end{pmatrix}$$

##### Вариант №2

$$A = \begin{pmatrix} 0,62 & -0,44 & -0,86 \\ 0,83 & 0,42 & -0,56 \\ 0,58 & -0,37 & 0,87 \end{pmatrix}$$

##### Вариант №3

$$A = \begin{pmatrix} 2,18 & 1,72 & -0,93 \\ 1,42 & 0,18 & 1,12 \\ 0,92 & -1,14 & -2,53 \end{pmatrix}$$

##### Вариант №4

$$A = \begin{pmatrix} 4,24 & 2,73 & -1,55 \\ 2,34 & 1,27 & 3,15 \\ 3,05 & -1,05 & -0,63 \end{pmatrix}$$

##### Вариант №5

$$A = \begin{pmatrix} 1,06 & 0,34 & 1,26 \\ 2,54 & -1,16 & 0,55 \\ 1,34 & -0,47 & -0,83 \end{pmatrix}$$

##### Вариант №6

$$A = \begin{pmatrix} 0,34 & 0,71 & 0,63 \\ 0,71 & -0,65 & -0,18 \\ 1,17 & -2,35 & 0,75 \end{pmatrix}$$

##### Вариант №7

$$A = \begin{pmatrix} 3,01 & -0,14 & -0,15 \\ 1,11 & 0,13 & -0,75 \\ 0,17 & -2,11 & 0,71 \end{pmatrix}$$

##### Вариант №8

$$A = \begin{pmatrix} 0,43 & 1,24 & -0,58 \\ 0,74 & 0,83 & 1,17 \\ 1,43 & -1,58 & 0,83 \end{pmatrix}$$

Вариант №9

$$A = \begin{pmatrix} 0,95 & 0,72 & -1,14 \\ 0,63 & 0,24 & 0,38 \\ 1,23 & -1,08 & -1,16 \end{pmatrix}$$

Вариант №10

$$A = \begin{pmatrix} 0,21 & -0,18 & 0,75 \\ 0,13 & 0,75 & -0,11 \\ 3,01 & -0,33 & 0,11 \end{pmatrix}$$

Вариант №11

$$A = \begin{pmatrix} 1,26 & -2,34 & 1,17 \\ 0,75 & 1,24 & -0,48 \\ 3,44 & -1,85 & 1,16 \end{pmatrix}$$

Вариант №12

$$A = \begin{pmatrix} 1,24 & 0,62 & -0,95 \\ 2,15 & -1,18 & 0,57 \\ 1,72 & -0,83 & 1,57 \end{pmatrix}$$

Вариант №13

$$A = \begin{pmatrix} 0,46 & 1,72 & 2,53 \\ 1,53 & -2,32 & -1,83 \\ 0,75 & 0,86 & 3,72 \end{pmatrix}$$

Вариант №14

$$A = \begin{pmatrix} 3,75 & -0,28 & 0,17 \\ 2,11 & -0,11 & -0,12 \\ 0,22 & -3,17 & 1,81 \end{pmatrix}$$

Вариант №15

$$A = \begin{pmatrix} 0,73 & 1,24 & -0,38 \\ 1,25 & 0,66 & -0,78 \\ 0,75 & 1,22 & -0,83 \end{pmatrix}$$

Вариант №16

$$A = \begin{pmatrix} 1,73 & -0,83 & 1,82 \\ 0,27 & 0,53 & -0,64 \\ 0,56 & -0,48 & 1,95 \end{pmatrix}$$

Вариант №17

$$A = \begin{pmatrix} 2,47 & 0,65 & -1,88 \\ 1,34 & 1,17 & 2,54 \\ 0,86 & -1,73 & -1,08 \end{pmatrix}$$

Вариант №18

$$A = \begin{pmatrix} 0,13 & -0,14 & -2,00 \\ 0,75 & 0,18 & -0,77 \\ 0,28 & -0,17 & 0,39 \end{pmatrix}$$

Вариант №19

$$A = \begin{pmatrix} 0,32 & -0,42 & 0,85 \\ 0,63 & -1,43 & -0,58 \\ 0,84 & -2,23 & -0,52 \end{pmatrix}$$

Вариант №20

$$A = \begin{pmatrix} 3,15 & -1,72 & -1,23 \\ 0,72 & 0,67 & 1,18 \\ 2,57 & -1,34 & -0,68 \end{pmatrix}$$

Вариант №21

$$A = \begin{pmatrix} 1,24 & -0,87 & -3,17 \\ 2,11 & -0,45 & 1,44 \\ 0,48 & 1,25 & -0,63 \end{pmatrix}$$

Вариант №22

$$A = \begin{pmatrix} 0,43 & 0,63 & 1,44 \\ 1,64 & -0,83 & -2,45 \\ 0,58 & 1,55 & 3,18 \end{pmatrix}$$

Вариант №23

$$A = \begin{pmatrix} 0,92 & -0,83 & 0,62 \\ 0,24 & -0,54 & 0,43 \\ 0,73 & -0,81 & -0,67 \end{pmatrix}$$

Вариант №24

$$A = \begin{pmatrix} 0,62 & 0,56 & -0,43 \\ 1,32 & -0,88 & 1,76 \\ 0,73 & 1,42 & -0,34 \end{pmatrix}$$

Вариант №25

$$A = \begin{pmatrix} 2,55 & -0,78 & 0,47 \\ -1,01 & -1,61 & -0,39 \\ 2,02 & 1,18 & 0,89 \end{pmatrix}$$

**Отчет по лабораторной работе** должен содержать:

- тему лабораторной работы, полный текст задания и исходные данные в соответствии с номером варианта;
- расширенную матрицу на каждом шаге метода полного исключения Жордана-Гаусса;
- проверку полученного решения;
- выводы по работе.

**Пример 10.** Применяя метод полного исключения Жордана-Гаусса, вычислить определитель матрицы  $A$  и найти обратную для неё матрицу  $A^{-1}$ :

$$A = \begin{pmatrix} 2,74 & -1,18 & 3,17 \\ 1,12 & 0,83 & -2,16 \\ 0,18 & 1,27 & 0,76 \end{pmatrix}.$$

Вычисление определителя матрицы  $A$  на основе метода исключений Гаусса сводится к использованию таких преобразований матрицы  $A$ , которые приводят её к треугольному виду, не изменяя при этом её определитель. В этом случае определитель матрицы  $A$  будет равен произведению элементов, лежащих на главной диагонали полученной таким образом квадратной матрицы треугольного вида:  $\det A = (-1)^p a_{11} a_{22}^{(1)} a_{33}^{(2)} \dots a_{nn}^{(n-1)}$ , где  $p$  - число перестановок строк.

Вычисление обратной матрицы  $A^{-1}$  можно свести к одновременному решению трех систем линейных алгебраических уравнений, у

которых матрица коэффициентов совпадает с матрицей  $A$ , а правыми частями являются столбцы единичной матрицы.

Применим метод полного исключения Жордана-Гаусса к расширенной матрице  $[A \mid E]$ , состоящей из матрицы  $A$  и единичной матрицы  $E$ . В результате преобразований, реализующих метод Жордана-Гаусса, расширенная матрица приводится к виду:  $[E \mid A]$ .

Сформируем расширенную матрицу:

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 2,74 & -1,18 & 3,17 & 1 & 0 & 0 \\ 1,12 & 0,83 & -2,16 & 0 & 1 & 0 \\ 0,18 & 1,27 & 0,76 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Используя линейные преобразования над строками расширенной матрицы, не изменяющие определитель матрицы  $A$ , получим во второй и третьей строках первого столбца нули (т.е. исключим неизвестную  $x_1$  из второго и третьего уравнений в каждой из систем):

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 2,7400 & -1,1800 & 3,1700 & 1,0000 & 0,0000 & 0,0000 \\ 0,0000 & 1,3123 & -3,4558 & -0,4088 & 1,0000 & 0,0000 \\ 0,0000 & 1,3475 & 0,5518 & -0,0657 & 0,0000 & 1,0000 \end{array} \right).$$

Теперь получим нули в первой и третьей строках второго столбца расширенной матрицы (исключим неизвестную  $x_2$  из первого и третьего уравнений):

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 2,7400 & 0,0000 & 0,0627 & 0,6325 & 0,8992 & 0,0000 \\ 0,0000 & 1,3123 & -3,4558 & -0,4088 & 1,0000 & 0,0000 \\ 0,0000 & 0,0000 & 4,1002 & 0,3540 & -1,0268 & 1,0000 \end{array} \right).$$

Так как после описанных преобразований матрица  $A$  (первые три столбца расширенной матрицы) имеет верхний треугольный вид, то

определитель матрицы  $A$  равен произведению элементов, расположенных на главной диагонали:

$$\det A = 2,7400 \cdot 1,3123 \cdot 4,1002 = 14,743.$$

И, наконец, получим нули в первой и второй строках третьего столбца расширенной матрицы:

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 2,7400 & 0,0000 & 0,0000 & 0,6270 & 0,9149 & -0,0153 \\ 0,0000 & 1,3123 & 0,0000 & -0,1104 & 0,1346 & 0,8428 \\ 0,0000 & 0,0000 & 4,1002 & 0,3540 & -1,0268 & 1,0000 \end{array} \right).$$

Теперь, разделив первую строку расширенной матрицы на элемент  $a_{11} = 2,7400$ , вторую строку на  $a_{22}^{(1)} = 1,3123$ , а третью – на элемент  $a_{33}^{(2)} = 4,1002$ , получаем расширенную матрицу вида  $[E \mid A]$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1,0000 & 0,0000 & 0,0000 & 0,2288 & 0,3339 & -0,0056 \\ 0,0000 & 1,0000 & 0,0000 & -0,0841 & 0,1025 & 0,6422 \\ 0,0000 & 0,0000 & 1,0000 & 0,0863 & -0,2504 & 0,2439 \end{array} \right).$$

Отсюда следует, что обратная матрица  $A^{-1}$  имеет вид:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0,2288 & 0,3339 & -0,0056 \\ -0,0841 & 0,1025 & 0,6422 \\ 0,0863 & -0,2504 & 0,2439 \end{pmatrix}.$$

Проверка полученного результата выполняется на основе определения обратной матрицы и заключается в проверке тождества:  $A^{-1}A = AA^{-1} = E$ .

Действительно, получаем:

$$\begin{aligned}
A^{-1}A &= \begin{pmatrix} 0,2288 & 0,3339 & -0,0056 \\ -0,0841 & 0,1025 & 0,6422 \\ 0,0863 & -0,2504 & 0,2439 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2,74 & -1,18 & 3,17 \\ 1,12 & 0,83 & -2,16 \\ 0,18 & 1,27 & 0,76 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 1,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 1,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 1,000 \end{pmatrix}; \\
AA^{-1} &= \begin{pmatrix} 2,74 & -1,18 & 3,17 \\ 1,12 & 0,83 & -2,16 \\ 0,18 & 1,27 & 0,76 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,2288 & 0,3339 & -0,0056 \\ -0,0841 & 0,1025 & 0,6422 \\ 0,0863 & -0,2504 & 0,2439 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 1,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 1,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 1,000 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

### Контрольные вопросы

1. В чем заключается метод исключения неизвестных Гаусса?
2. Чему равно количество арифметических операций, требуемых при вычислении определителя  $n$ -ого порядка на основе его формального определения?
3. В чем заключается вычисление определителя квадратной матрицы на основе метода исключений Гаусса?
4. Чему равен определитель квадратной матрицы треугольного вида?
5. Чему равно количество арифметических операций, выполняемых при вычислении определителя  $n$ -ого порядка на основе метода Гаусса?
6. Каким образом обращение матрицы сводится к решению систем линейных алгебраических уравнений?
7. В чем заключается метод полного исключения Жордана-Гаусса?
8. Чему равно количество арифметических операций, выполняемых при обращении квадратной матрицы  $n$ -ого порядка на основе метода Гаусса?