

24% 玉净酮·禾封嗪悬浮剂

低毒

总有效成分含量：24% 玉净酮10% 禾封嗪14% 剂型：悬浮剂

产品性能

本品为两种虚构活性成分复配的选择性苗后除草剂。药剂经杂草茎叶吸收后抑制其生长，按标签推荐方法使用，可用于防除玉米田一年生禾本科杂草。

使用范围和使用方法

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量）	施用方式
玉米田	一年生禾本科杂草	稀释600倍液	茎叶喷雾

使用技术要求

- 于玉米3-5叶期、杂草2-4叶期施药，对杂草茎叶均匀喷雾；避开玉米心叶。
- 每季最多使用1次，不得重复施用或自行增加浓度。
- 配药前充分摇匀。先加约一半清水，再加入量取好的药剂，搅匀后补足清水。
- 大风天或预计1小时内降雨时请勿施药，避免药液漂移至小麦、蔬菜等邻近敏感作物。

注意事项

- 本品仅用于玉米田一年生禾本科杂草，不得用于小麦田，不得在玉米5叶期后使用。
- 本品不能与有机磷类杀虫剂混用。
- 配药和施药时穿长袖防护服、长裤和胶靴，佩戴防护手套、口罩和护目镜。
- 施药期间不得饮水、进食或吸烟；施药后及时清洗身体、防护用具和工作服。
- 药液、清洗液和废弃包装不得污染水域和土壤，禁止在水体中清洗施药器具。
- 未用完的制剂放回原包装密封保存，不得转装入饮料或食品容器。
- 使用过的包装妥善收集，不得重复使用、改作其他用途或随意丢弃。
- 儿童、孕妇及哺乳期妇女不得接触本品。

中毒急救措施

使用中或使用后如感觉不适，应立即停止工作并携带本标签就医。皮肤接触用大量清水和肥皂冲洗；眼睛溅入用流动清水冲洗至少15分钟；吸入时转移到空气流通处；误食时立即漱口，不得自行引吐。无专用解毒剂，对症治疗。


储存和运输方法

加锁存放于阴凉、干燥、通风、防雨处，远离火源和热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到之处，不得与食品、饮料、粮食、种子和饲料混合储运。运输时防止日晒、雨淋、倾倒和包装破损。

实验虚构登记号：EXP-PD-A0823 产品标准号：LAB/FIC-A-2026 生产许可证号：EXP-XK-A0823

净含量：200毫升 生产日期及批号：见封口 质量保证期：2年

生产者：原野标签研究实验室（虚构机构） 电话：000-00000000（不可拨打）



实验追溯码

穿防护服	佩戴口罩	戴护目镜	佩戴手套	施药后清洗	远离儿童	勿污染水体
------	------	------	------	-------	------	-------

除 草 剂